

ABSTRAK

Pengaruh Obesitas dan Menyusui Terhadap Resiko Kanker Payudara
di poli Onkologi Satu Atap (POSA) RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Ris Marissa

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata tingkat obesitas para responden diukur berdasarkan Body Mass Index (BMI)-nya adalah sebesar 31,80. tingkat obesitas (BMI) tertinggi pada responden tersebut adalah 33,33 (responden nomor 5) yang terendah adalah 30,02 (responden nomor 6). Untuk variabel menyusui, pada pertanyaan tentang lama menyusui yang terbanyak (5 orang atau 45,45%) mengaku menyusui anaknya selama 18 – 24 bulan, pada pertanyaan tentang waktu pertama kali menyusui, yang terbanyak (5 orang atau 45,45%) mengaku menyusui 1 – 6 jam setelah kelahiran anaknya, dan pada pertanyaan tentang waktu terakhir kali menyusui, yang terbanyak (9 orang atau 81,82%) mengaku telah lebih dari 5 tahun sejak terakhir kali menyusui anaknya. Sedangkan tentang resiko kanker payudara dilihat berdasarkan stadium kanker payudara yang diderita para responden, sebagian besar responden (7 orang atau 63,64%) kanker payudara yang dideritanya baru memasuki stadium I, sedangkan sisanya (4 orang atau 36,36%) kanker payudara yang diderita berada stadium II.