

DENTURE , PARTIAL FIXED

KK

K6 34/03

Afi
d

**DISTRIBUSI FREKUENSI KLASIFIKASI
KENNEDY PADA PEMAKAI GIGITIRUAN
SEBAGIAN LEPASAN DI KLINIK
PROSTODONSIA PERIODE 1998-2001**

SKRIPSI



Oleh :

HASTIN AFITRI
029812586



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**DISTRIBUSI FREKUENSI KLASIFIKASI KENNEDY
PADA PEMAKAI GIGITIRUAN SEBAGIAN
LEPASAN DI KLINIK PROSTODONSLA
PERIODE 1998-2001**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
Pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh :

HASTIN AFITRI
029812586



Menyetujui :

Pembimbing I

Handwritten signature of Pembimbing I.

Prof. Dr. Arifzan Razak, drg. MSc. Sp Pros.
NIP. 130 238 902

Pembimbing II

Handwritten signature of Pembimbing II.

Adi Subianto, drg. MS. Sp Pros.
NIP. 130 815 366

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB 6

KESIMPULAN

Hasil penelitian survei pada penderita pemakai gigitiruan sebagian lepasan di klinik Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Periode 1998-2001 menunjukkan bahwa dari 111 penderita terdapat 84 penderita yang memenuhi syarat penelitian yang terdiri dari tahun ajaran 1998-1999 (semester gasal dan semester genap) sebanyak 54 penderita sedangkan pada tahun 2000-2001 (semester gasal) sebanyak 30 penderita. Dan 24 penderita lainnya tidak memenuhi syarat penelitian karena tidak ada data mengenai umur penderita, ada mahasiswa yang tidak ada pasien, serta tidak ada kontrol kedua.

Maka dapat diketahui distribusi frekuensi pemakai gigitiruan sebagian lepasan berdasarkan atas klasifikasi Kennedy terbanyak pada rahang atas adalah klas III modifikasi 1 sebesar 30 %, kemudian klas III modifikasi 2 dan klas IV masing-masing sebesar 20%. Sedangkan yang tersedikit klas I, klas II modifikasi 2, klas II modifikasi 3 masing-masing sebesar 10 % dari total 10 penderita. Dan pada rahang bawah distribusi frekuensi dari 17 penderita pemakai gigitiruan sebagian lepasan berdasarkan atas klasifikasi Kennedy terbanyak pada klas I yaitu sebesar 47,06%, klas III modifikasi I sebesar 35,29% dan yang tersedikit terdapat pada klas II modifikasi 2 dan klas III masing-masing sebesar 11,76% dan 5,88%. Sedangkan distribusi frekuensi klasifikasi Kennedy pada rahang atas dan bawah terbanyak terdapat pada klas III pada rahang atas sebesar 13,16%, dan klas III modifikasi 2 sebesar 11,40%, kemudian yang tersedikit klas I modifikasi 2 dan klas IV masing-masing sebesar 0,88%. Untuk rahang bawah yang terbanyak pada klas III modifikasi 1 sebesar 16,67%, klas II modifikasi 1 sebesar

13,16% dan yang tersedikit terdapat pada klas I modifikasi 1 dan klas II modifikasi 3 yang masing-masing sebesar 1,75%.

Ditinjau dari usia penderita terbanyak pada usia dewasa (36-55 tahun) sebesar 46,42% dari 39 penderita dari total 84 penderita. Dan frekuensi kunjungan penderita terbanyak pada wanita sebesar 71,72% dari 60 penderita dibanding laki-laki yaitu sebesar 28,57% dari 24 penderita dari total 84 penderita yang memenuhi syarat penelitian.