


# OVOZOA

Departemen Reproduksi Veteriner  
Fakultas Kedokteran Hewan Unair



# OVOZOA

## Journal of Animal Reproduction

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#) [ANNOUNCEMENTS](#)

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

## EDITORIAL TEAM

### EDITOR IN CHIEF

Prof. dr. Imam Mustofa, drh., M.Kes, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

### SECTION EDITOR

SUZANITA UTAMA M.Phil., PhD., drh, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Erma Safitri, drh. M.Si, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tita Damayanti Lestari, drh. M.Sc, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Rimayanti drh. M.Kes, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

### SUBSCRIPTION MANAGER

Prof. Dr. Pudji Srianto, drh M.Kes, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. Ismudiono drh. M.S, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Masud Hariadi, drh., Ph.D., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. MITSUHIRO TAKAGI (PHD,DVM) , Veterinary Theriogenology, Yamaguchi University Joint Faculty of Veterinary Medicine. Yamaguchi, Japan

Ir. R. Mulyoto Pangestu, M.Rep.Sc, Ph.D, Indonesia

### REVIEWER

Prof. Dr. Sri Pantja Madyawati, drh., M.Si, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. drh. Muhammad Agil, MSc., Agr, Dipl. ACCM, Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Dr. drh. Yudi, M.Si., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. Dr. drh. Tongku Nizwan Siregar, M.P., University of Syah Kuala Aceh, Indonesia

Dr. drh. Dasrul, M.Si., University of Syah Kuala Aceh, Indonesia

Dr. drh. Cut Nila Thasmi, M.S., Indonesia

Dr. drh. Juli Melia, M.Si., Indonesia

Prof. Dr. drh. Tjok Gde Oka Pemayun, M.S., Udayana University, Denpasar-Bali, Indonesia

Dr. drh. I Gusti Ngurah Bagus Trilaksana, M.Kes., Udayana University, Denpasar Bali, Indonesia

Dr. drh. Desak Nyoman Dewi Indira Laksmi, M.Biomed., Udayana University, Denpasar Bali, Indonesia

Dr. Drh. Wayan Bebas, M.Kes., Indonesia

Dr. drh. Miarsono Sigit, MP, Indonesia

Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES, Brawijaya University, Malang, Indonesia

Prof. Dr. Drh. Arief Boediono, PhD., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Dr. Drh. Agik Suprayogi, MSc., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Dr. drh. Ligaya ITA Tumbelaka. Sp.M.P, M.Sc., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, M.P., Ph.D., Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. Dr. drh. Mohamad Agus Setiadi, Bogor Agriculture Institute, Indonesia

Prof. Dr. Suherni Susilowati, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. Wurlina drh., M.S, Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Prof. Dr. Herry Agoes Hermadi, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Abdul Samik, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tjuk Imam Restiadi, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tatik Hernawati, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

Dr. Tri Wahyu Suprayogi, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia

#### People

Contact

Editorial Team

Reviewers

#### Instruction for Author

Guide for authors

Online Submission

Download Documents

#### Journal Policy

Focus and Scope

Section Policies

Publication Frequency

Publication Ethics

Indexing

Article Processing Charge

Peer Reviewers Process

Open Access Statement

Archiving

Plagiarism Screening

History

Copyright

old website

#### OPEN JOURNAL SYSTEMS

#### Journal Help

#### USER

Username

Password

Remember me

#### NOTIFICATIONS

[View](#)

[Subscribe](#)

#### JOURNAL CONTENT

Search



Dr. Hermin Ratnani, drh., M.Kes., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia  
Dr. Budi Utomo, drh., M.Si., Departemen Reproduction Veteriner, Faculty of Veterinary Medicine University Airlangga, Indonesia  
Prof. drh. Aris Junaldi, Ph.D., Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia  
Dr. drh. Surya Agus Prihatno, M.P., Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia  
Dr. drh. Asmarani Kusumawati, M.P., Gajah Mada University, Yogyakarta, Indonesia  
Prof. Dr. drh. Iman Supriatna, Bogor Agriculture Institute, Indonesia  
Prof. drh. Bambang Purwantara, M.Sc, Ph.D., Bogor Agriculture Institute, Indonesia  
Prof. Graeme Martin, Faculty of Science, UWA School of Agriculture and Environment., Australia

88002032

[View My Stats](#)

Ovozoa: Journal of Animal Reproduction by Unair is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah  
**Universitas Airlangga**  
copyright©2017 Template PPJPI

Search Scope

All

Search

Browse

[By Issue](#)[By Author](#)[By Title](#)[Other Journals](#)

FONT SIZE

INFORMATION

[For Readers](#)[For Authors](#)[For Librarians](#)

# OVOZOA

## Journal of Animal Reproduction

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > Vol 8, No 2 (2019)

### VOL 8, NO 2 (2019)

#### JURNAL OVOZOA : JOURNAL OF ANIMAL REPRODUCTION

#### TABLE OF CONTENTS

##### ORIGINAL ARTICLE

##### HUBUNGAN ANTARA BODY CONDITION SCORE (BCS) DENGAN PRODUKSI SUSU SAPI PERAH FRIESIAN HOLSTEIN (FH)

PDF  
89-93

[doi](#) 10.20473/ovz.v8i2.2019.89-93

Melsa Netika, Roesno Darsono, Budi Utomo, Imam Mustofa, Ismudiono Ismudiono, Tri Wahyu Suprayogi

##### HUBUNGAN ANTARA UMUR DENGAN CALVING INTERVAL, DAYS OPEN, DAN SERVICE PER CONCEPTION SAPI FRIESIAN HOLSTEIN (FH)

PDF  
94-99

[doi](#) 10.20473/ovz.v8i2.2019.94-99

Hanifah Muslimah Ananda, Wurfina Wurfina, Nove Hidayati, Mas'ud Hariadi, Abdul Samik, Tjuk Imam Restiadi

##### PENGARUH EKSTRAK DELIMA MERAH (*Punicagranatum L.*) TERHADAP PENINGKATAN PERSENTASE KAPASITASI DAN REAKSI AKROSOM SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (*Rattus norvegicus*)

PDF  
100-104

[doi](#) 10.20473/ovz.v8i2.2019.100-104

Baktiar Budi Satrio, Mas'ud Hariadi, Retno Sri Wahjuni, Budi Utomo, Sri Agus Sudjarwo, Tita Damayanti L

##### KORELASI ANTARA LINGKAR DADA, PANJANG BADAN DAN TINGGI GUMBA TERHADAP VOLUME SEMEN DAN KONSENTRASI SPERMATOZOA SAPI MADURA

PDF  
105-109

[doi](#) 10.20473/ovz.v8i2.2019.105-109

Dilla Aranda Mayola, Rimayanti Rimayanti, Sunaryo Hadi Warsito, Suzanita Utama, Hana Eliyani, Erma Saffitri

##### PERANAN VITAMIN B12 DALAM PENGECER SUSU SKIM KUNING TELUR TERHADAP MOTILITAS DAN VIABILITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDIPOST THAWING

PDF  
110-115

[doi](#) 10.20473/ovz.v8i2.2019.110-115

Mirza Asafaizh Arini, Tri Wahyu Suprayogi, Sunaryo Hadi Warsito, Trilas Sardjito, Suherni Susilowati, Indah Norma Triana

##### PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK TEH HIJAU (*Camellia sinensis*) DALAM BAHAN PENGECER SUSU SKIM TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI YANG DISIMPAN PADA SUHU DINGIN

PDF  
116-121

[doi](#) 10.20473/ovz.v8i2.2019.116-121

Maulinda Agchirilila Vladika, Sunaryo Hadi Warsito, Suherni Susilowati, Tatik Hernawati, Rochmah Kurnijasanti, Tjuk Imam Restiadi

##### PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK TEH HIJAU (*Camellia sinensis*) DALAM BAHAN PENGECER SUSU SKIM KUNING TELUR TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA DOMBA

PDF

#### People

Contact

Editorial Team

Reviewers

#### Instruction for Author

Guide for authors

Online Submission

Download Documents

#### Journal Policy

Focus and Scope

Section Policies

Publication Frequency

Publication Ethics

Indexing

Article Processing Charge

Peer Reviewers Process

Open Access Statement

Archiving

Plagiarism Screening

History

Copyright

old website

#### OPEN JOURNAL SYSTEMS

#### Journal Help

#### USER

Username

Password

Remember me

#### NOTIFICATIONS

View

Subscribe

#### JOURNAL CONTENT

Search

## SAPUDI YANG DISIMPAN PADA SUHU DINGIN

122-  
126

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.122-126

Wahyu Retno Swari, Emy Koestanti Sabdoningrum, Wurlina Wurlina, Suherni Susilowati, Rochmah Kurnijasanti, Erma Safitri

PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK TEH HIJAU (*Camellia sinensis*) DALAM BAHAN PENGECER KUNING TELUR SITRAT TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI YANG DISIMPAN PADA SUHU DINGINPDF  
127-  
131

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.127-131

Itrah Khoirunnisa, Suherni Susilowati, Lilik Maslachah, Tri Wahyu Suprayogi, Rochmah Kurnijasanti, Hermin Ratnani

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK RUMPUT KEBAR (*Biophytum petersianum*) TERHADAP DIAMETER DAN TEBAL EPITEL TUBULUS SEMINIFERUS MENCIT (*Mus musculus*) YANG DIPAPAR 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINPDF  
132-  
138

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.132-138

Aldis Ingrid Rusyawardani, Widjiati Widjiati, Suzanita Utama, Chairul Anwar, Epy Muhammad Luqman, Lilik Maslachah

PENGARUH PENGECER KUNING TELUR AYAM DENGAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP INTEGRITAS MEMBRAN PLASMA DAN ABNORMALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI  
PENGARUH PENGECER KUNING TELUR AYAM DENGAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP INTEGRITAS MEMBRAN PLASMA DAN ABNORMALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDIPDF  
139-  
143

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.139-143

Mayrena Ayu Cesaria, A.T.Soelih Estoepongastie, Suherni Susilowati, Tatik Hernawati, Sri Pantja Madyawati, Indah Norma Triana

## CASE REPORT

## DAMPAK PEMBERIAN ROTI AFKIR TERHADAP EFISIENSI REPRODUKSI SAPI PERAH Friesian Holstein DI WILAYAH KERJA KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR, PASURUAN

PDF  
144-  
148

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.144-148

Ricko Nurdianto S., Sri Hidanah, Sri Pantja Madyawati, Abdul Samik, wurlina wurlina, Tri Wahyu Suprayogi

## PERBANDINGAN BODY CONDITION SCORE, SERVICES PER CONCEPTION, CALVING INTERVAL, DAN DAYS OPEN SAPI FRIESIAN HOLSTEIN (FH) DI KEMITRAAN GREENFIELD DENGAN KUD TANI WILIS SENDANG

PDF  
149-  
153

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.149-153

Aghid Cahya P., Sri Mulyati, Suwarno Suwarno, Imam Mustofa, Pudji Srianto, Budi Utomo

## PENGARUH pH LENDIR MUKOSA VAGINA SAAT BIRAH TERHADAP PERSENTASE KEBUNTINGAN (Conception Rate) PADA SAPI PERAH DI KUD TANI WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN KSU TUNAS SETIA BARU KABUPATEN PASURUAN

PDF  
154-  
158

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.154-158

Andaru Rizki, Pudji Srianto, Endang Suprihati, Trilas Sardjito, Ismudiono Ismudiono, Mohammad Anam Al Arif

## CONCEPTION RATE DAN SERVICE PER CONCEPTION PADA SAPI BALI HASIL INSEMINASI BUATAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017

PDF  
159-  
163

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.159-163

Asih Deskayanti, Trilas Sardjito, Agus Sunarso, Pudji Srianto, Tri Wahyu Suprayogi, Herry Agoes Hermadi

## PERSENTASE KEJADIAN KAWIN BERULANG SAPI PERAH YANG TELAH DI IB (INSEMINASI BUATAN) TINGKAT PETERNAK DESA NYAWANG KIDUL DI KUD TANI WILIS KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG

PDF  
164-  
168

doi: 10.20473/ovz.v8i2.2019.164-168

Arda Wahyu Setyadi, Pudji Srianto, Oky Setyo Widodo, Wurlina Wurlina, Abdul Samik, Tjuk Imam

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

FONT SIZE

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians



Restiadi

**HUBUNGAN MORFOMETRI AMBING TERHADAP PRODUKSI SUSU KUDA DI DAERAH BIMA NUSA TENGGARA BARAT**

PDF  
169-  
174

 10.20473/ovz.v8i2.2019.169-174

*Mujahid Mujahid, Imam Mustofa, Benjamin Chr Tehupuring, Tjuk Imam Restiadi, Hana Eliyani, Hermin Ratnani*

00002031

[View My Stats](#)



Ovozoa: Journal of Animal Reproduction by Unair is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah  
**Universitas Airlangga**  
copyright©2017 Template PPJPI

**KORELASI ANTARA LINGKAR DADA, PANJANG BADAN DAN TINGGI GUMBA TERHADAP VOLUME SEMEN DAN KONSENTRASI SPERMATOZOA SAPI MADURA**

**THE CORRELATION BETWEEN HEART GIRTH, BODY LENGTH AND WITHER'S HEIGHT WITH SEMEN VOLUME AND SPERM CONCENTRATION OF MADURA BULLS**

**Dilla Aranda Mayola<sup>1)</sup>, \*Rimayanti<sup>2)</sup>, Sunaryo Hadi Warsito<sup>3)</sup>, Suzanita Utama<sup>4)</sup>, Hana Eliyani<sup>5)</sup>, Erma Safitri<sup>6)</sup>**

<sup>1)</sup>Student, <sup>2,4,6)</sup>Departement of Veterinary Reproduction, <sup>3)</sup>Departement of Animal Husbandry, <sup>5)</sup>Departement of Veterinary Anatomy

Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University

\*Corresponding author: email: rima\_irmansyah@yahoo.com; dillamayola1122@gmail.com

**ABSTRACT**

The aim of this research was to know the correlation between heart girth, body length, and wither's height with semen volume and sperm concentration of Madura Bulls. Ten Madura bulls aged three to four years from Madura were measured. Variables observed were heart girth, body length, wither's height, semen volume and sperm concentration. Data were analyzed by multiple *linear* regression analysis. The result of this research showed that there was no correlation between heart girth, body length, and wither's height with semen volume  $Y = -25,212 + 0,190 X_1 + (-0,131) X_2 + 0,136 X_3$ , so as there was no correlation between heart girth, body length and wither's height with sperm concentration  $Y = 8739,559 + (-36,663) X_1 + (-19,714) X_2 + 6,2960 X_3$ . And than was no correlation between semen volume and sperm concentration  $Y = 7,303 + (-0,002) X_1$ .

**Keywords** : Madura bulls, correlation, heart girth, semen volume, sperm concentration.

**Pendahuluan**

Madura merupakan wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap populasi sapi potong di Jawa Timur yakni sekitar (21%). Madura ditetapkan sebagai wilayah tertutup, yaitu wilayah yang dilarang untuk dilakukannya perkawinan silang dengan pejantan ternak sapi potong yang berasal dari luar Madura. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kemurnian sapi Madura sebagai salah satu plasma nutfah sapi lokal Indonesia (Siswijono dkk., 2013).

Sapi Madura merupakan salah satu bangsa sapi di Indonesia yang memiliki berbagai keunggulan genetik selain itu juga memiliki kinerja reproduksi yang lebih baik dibandingkan dengan Bos taurus, lebih tahan terhadap panas dan penyakit caplak (Hartatik dkk., 2009). Keberadaan sapi Madura di Pulau asalnya tidak hanya dipergunakan sebagai ternak potong saja. Adat istiadat, budaya dan kesenian yang sangat dilestarikan di pulau ini menjadikan

sapi Madura sebagai lambang masyarakat Madura terutama dalam kebudayaan serta kesenian (Wulandari, 2015).

Inseminasi buatan (IB) merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak secara kuantitatif dan kualitatif dengan membuat semen beku yang berasal dari pejantan unggul (Toelihere, 1993). Menurut Budi dan Setiadi (2004), perbaikan mutu genetik sapi Madura melalui program perkawinan secara Inseminasi Buatan memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan mutu genetik sapi Madura.

Hingga saat ini perkembangan program perkawinan secara Inseminasi Buatan di kalangan peternak Madura masih sangat lambat, serta tidak didukung oleh ketersediaan pejantan unggul sapi Madura di Balai Inseminasi Buatan (BIB) atau Dinas Peternakan di pulau Madura yang belum memadai. Salah satu kunci penting keberhasilan program perkawinan dengan inse-

minasi buatan adalah tersedianya sapi pejantan dengan kualitas semen unggul yang dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis semen (Sumeidiana, 2009).

Penilaian terhadap kualitas mikroskopis semen dilakukan di laboratorium apabila tempat penampungan dan laboratorium berjarak dekat. Namun apabila jarak tempat penampungan semen dan laboratorium pengujian jauh, maka penilaian kualitas mikroskopis semen diperlukan alat-alat yang harus dibawa di lokasi penampungan. Kerumitan prosedur tahapan pelaksanaan seleksi tersebut merupakan suatu kendala yang menyebabkan pelaksanaan seleksi tidak efisien karena membutuhkan waktu pengujian serta seleksi menjadi tidak praktis (Saputra dkk, 2017), sehingga untuk mengetahui kualitas semen pejantan yang baik diperlukan teknik lain yaitu dengan melalui ukuran lingkaran dada, panjang badan dan tinggi gumba yang diperkirakan memiliki hubungan yang positif terhadap kualitas semen pejantan sapi Madura. Keadaan ini tampaknya sesuai dengan pendapat Frandson (1992) dan Wijaya (1992) bahwa kualitas semen dari seekor pejantan unggul dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, bangsa dan ukuran tubuh. Ukuran tubuh seperti lingkaran dada, panjang badan dan tinggi gumba dapat digunakan untuk menaksir berat badan sapi berdasarkan rumus Schoorl, Lambourne, Winter dan Denmark (Ni'am dkk., 2012). Berat badan yang dapat diwakili dengan pengukuran lingkaran dada dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan hewan termasuk pertumbuhan badan dan reproduksinya (Fourie dkk., 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya korelasi antara lingkaran dada, panjang badan dan tinggi gumba terhadap volume dan konsentrasi spermatozoa sapi Madura. Sehingga nantinya pelaksanaan seleksi terhadap kualitas semen yang dimiliki pejantan dapat dilakukan hanya dengan melalui ukuran lingkaran dada, panjang badan dan tinggi gumba sebagai standar dalam seleksi yang digunakan untuk mengetahui kualitas semen pada pejantan sapi Madura secara langsung.

## Metode Penelitian

Hewan penelitian yang digunakan adalah 10 ekor sapi Madura jantan berumur 3 sampai 4 tahun dan berat badan berkisar 250 kg sampai 350 kg dalam kondisi sehat. Sapi Madura yang digunakan milik UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan Madura Pamekasan. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari vaselin, NaCl fisiologis, air panas dan kapas. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pita ukur merk *Animeter* yang digunakan untuk mengukur lingkaran dada, tongkat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang badan dan tinggi gumba, *spektrofotometer* merk *Minitube* untuk mengetahui konsentrasi spermatozoa, kuvet, vagina buatan khusus untuk sapi lengkap dengan selongsong karet dan tabung gelas berskala untuk menampung semen dan pipet.

## Analisis Data

Data yang diperoleh yaitu lingkaran dada, panjang badan dan tinggi gumba, serta volume semen dan konsentrasi spermatozoa disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis dengan regresi *linear* berganda dan korelasi menggunakan program *SPSS*.

## Hasil Dan Pembahasan

Hasil pengukuran sapi Madura dalam penelitian ini menunjukkan lingkaran dada ( $160,60 \pm 7,24$ ) cm; panjang badan ( $132,65 \pm 5,61$ ) cm; tinggi gumba ( $125,45 \pm 4,47$ ) cm; volume semen ( $5,05 \pm 2,32$ ) ml dan konsentrasi spermatozoa ( $1026,30 \pm 374,92$ ) juta/ml.

### A. Hasil Analisis Korelasi antara Lingkaran Dada, Panjang Badan dan Tinggi Gumba dengan Volume Semen

Hasil analisis regresi *linear* berganda dan korelasi menunjukkan bahwa antara volume semen tidak berkorelasi nyata dengan lingkaran dada ( $p = 0,262$ ), panjang badan ( $p = 0,451$ ) dan tinggi gumba ( $p = 0,554$ ) dan nilai konstanta sebesar  $-25,212$  sehingga dirumuskan:  $Y = -25,212 + 0,190 X_1 - 0,131 X_2 + 0,136 X_3$ . Hasil korelasi ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan lingkaran dada, panjang badan dan tinggi gumba tidak diikuti dengan pe-



ningkatan volume semen. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh musim. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari dengan volume semen 5,05 ml dimana pada bulan tersebut sedang mengalami musim hujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sapi tidak merasa haus sehingga konsumsi air menurun. Apabila konsumsi air menurun maka sekresi dari kelenjar asesorius akan menurun yang diikuti dengan penurunan plasma semen sehingga mempengaruhi volume semen. Hal ini sesuai dengan pendapat Khairi, dkk (2014) bahwa semakin tinggi curah hujan maka volume semen yang dihasilkan semakin rendah, begitu juga sebaliknya semakin rendah curah hujan volume semen yang dihasilkan semakin tinggi, sedangkan menurut Koivisto *et al.*, (2009) bahwa musim dapat berpengaruh terhadap kualitas semen lebih dari 2%.

Nutrisi makanan yang rendah juga menjadi faktor yang mempengaruhi tidak adanya korelasi antara lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba terhadap volume semen. Menurut Hariadi, dkk (2011) kekurangan pakan menyebabkan penurunan sekresi testosteron diikuti penurunan kelenjar asesoris sehingga plasma semen yang dihasilkan menurun. Apabila plasma semen menurun maka akan mempengaruhi volume semen. Seekor sapi harus mendapatkan cukup pakan yang meliputi hijauan 10% dari BB dan juga konsentrat 1-2% dari BB. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi yaitu lingkungan. Pada saat pengambilan semen sapi terdapat banyak orang disekitarnya, jumlah orang yang terlalu banyak akan mempengaruhi kondisi sapi menjadi stress sehingga produksi semen tidak maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Erlisa (2013) yang menunjukkan bahwa saat pengambilan semen diharapkan hewan pada kondisi yang tenang agar produksi semen yang dihasilkan maksimal selain itu jumlah orang diharapkan tidak terlalu banyak karena dapat mempengaruhi kondisi hewan menjadi stres. Rata-rata volume semen sapi adalah 4 ml (3-7 ml), selain itu sapi mempunyai volume semen rendah (Susilowati dkk., 2010).

## **B. Hasil Analisis Korelasi antara Lingkar Dada, Panjang Badan dan Tinggi**

### **Gumba dengan Konsentrasi Spermatozoa**

Hasil analisis regresi *linear* berganda dan korelasi menunjukkan bahwa antara konsentrasi spermatozoa tidak berkorelasi nyata dengan lingkar dada ( $p = 0,062$ ), panjang badan ( $p = 0,288$ ) dan tinggi gumba ( $p = 0,791$ ) dan nilai konstanta sebesar 8739,559 sehingga dirumuskan:  $Y = 8739,559 + (-36,663) X_1 + (-19,714) X_2 + 6,2960 X_3$ . Hasil korelasi ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba tidak diikuti dengan peningkatan konsentrasi spermatozoa. Hal ini mungkin disebabkan oleh pakan. Nutrisi makanan yang terkandung didalam hijauan, tepung ikan dan konsentrat yang diberikan untuk pakan sapi masih rendah, hal ini terbukti setelah dilakukan uji analisis proksimat yang didapatkan hasil belum sesuai dengan SNI. Kurangnya pakan akan menyebabkan hipofungsi kelenjar hipofisa anterior diikuti menurunnya sekresi hormon gonadotropin (FSH dan LH) sehingga hormon testosteron menurun. Apabila hormon testosteron menurun maka proses spermatogenesis akan menurun dan akan menyebabkan menurunnya jumlah spermatozoa yang dihasilkan (Hariadi dkk., 2011). Sesuai dengan pendapat Djanuar (1985) bahwa hormon testosteron yang tinggi dapat meningkatkan konsentrasi spermatozoa dalam semen dan apabila hormon testosteron rendah maka dapat menurunkan konsentrasi spermatozoa. Fungsi hormon testosteron memegang peranan penting didalam proses spermatogenesis yaitu pada saat mulai terjadi aktivitas organ reproduksi jantan yang berupa aktivitas proses pembentukan spermatozoa.

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi yaitu lingkungan. Apabila jumlah orang yang terlalu banyak pada saat pengambilan semen sapi, maka akan mempengaruhi kondisi sapi menjadi stress sehingga produksi semen tidak maksimal. Pada saat pengambilan semen diharapkan hewan pada kondisi yang tenang agar produksi semen yang dihasilkan maksimal selain itu jumlah orang diharapkan tidak terlalu banyak karena dapat mempengaruhi kondisi hewan menjadi stress (Erlisa, 2013).

Jumlah spermatozoa setiap unit volume semen sapi bervariasi mulai dari nol sampai tiga miliar ( $3000 \times 10^6$ ) spermatozoa setiap ml. Konsentrasi spermatozoa yang berderajat tinggi biasanya berkisar dari  $2000 \times 10^6$  sampai  $2200 \times 10^6$  spermatozoa (Salisbury dan Vandenmark, 1985). Sesuai dengan pendapat Djanuar (1985) yang menyatakan bahwa konsentrasi pada umumnya sejalan dengan perkembangan seksual dan kedewasaan ternak, kualitas pakan, pengaruh kesehatan alat reproduksi, dan besar testis, selain itu dipengaruhi juga oleh faktor keturunan, musim, dan perbedaan tempat geografis.

### C. Hasil Analisis Korelasi antara Volume Semen dengan Konsentrasi Spermatozoa

Hasil analisis regresi *linear* berganda dan korelasi menunjukkan bahwa volume semen terhadap konsentrasi spermatozoa tidak berkorelasi nyata, masing-masing dengan angka signifikansi 0,316 dan nilai konstanta sebesar 7,303 sehingga dirumuskan:  $Y = 7,303 + (-0,002) X_1$ . Hasil korelasi ini tidak signifikan artinya setiap kenaikan satu satuan konsentrasi spermatozoa tidak diikuti dengan peningkatan volume semen. Hal ini mungkin terjadi karena semen sapi terdiri dari dua bagian yaitu spermatozoa dan plasma semen. Apabila volume semen mengalami peningkatan belum tentu diikuti juga peningkatan jumlah spermatozoa dimungkinkan jumlah plasma semen yang meningkat dan bertambah banyak sedangkan spermatozoannya tidak, sesuai dengan pendapat Toelihere (1993) yang menyatakan sapi cenderung mempunyai volume semen dengan konsentrasi spermatozoa yang rendah dan plasma semen yang tinggi atau sebaliknya. Volume rendah tidak merugikan, tetapi bila disertai dengan konsentrasi spermatozoa yang rendah akan membatasi jumlah spermatozoa yang tersedia.

Volume semen yang rendah dipengaruhi oleh musim. Pada saat penelitian terjadi hujan sehingga konsumsi air menurun diikuti menurunnya sekresi kelenjar termasuk kelenjar asesorius pada sapi. Apabila sekresi dari kelenjar asesorius menurun maka menyebabkan menurunnya plasma semen. Curah hujan mempengaruhi volume semen, apabila curah hujan tinggi

maka volume semen yang dihasilkan semakin rendah (Khairi dkk, 2014). Demikian pula konsentrasi spermatozoa yang mungkin disebabkan oleh pakan, kurangnya pakan akan menyebabkan hormon testosteron menurun. Apabila hormon testosteron menurun maka proses spermatogenesis akan menurun sehingga menyebabkan menurunnya jumlah spermatozoa yang dihasilkan (Hariadi dkk., 2011). Menurut pendapat Djanuar (1985) bahwa hormon testosteron yang tinggi dapat meningkatkan konsentrasi spermatozoa dalam semen dan apabila hormon testosteron rendah maka dapat menurunkan konsentrasi spermatozoa dan selain itu juga ada faktor lingkungan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa Lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba tidak memiliki korelasi terhadap volume semen sapi Madura, demikian pula lingkar dada, panjang badan dan tinggi gumba juga tidak memiliki korelasi terhadap konsentrasi spermatozoa sapi Madura selain itu volume semen tidak memiliki korelasi terhadap konsentrasi spermatozoa sapi Madura.

### Daftar Pustaka

- Budi, S.W. dan B. Setiadi. 2004. Potensi dan Keragaman Sumberdaya Genetik Sapi Madura. Lokakarya Sapi Potong. 45.
- Djanuar, 1985. Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 33-34.
- Erlisa, L. 2013. Korelasi Antara Berat Badan dengan Panjang Badan, Tinggi Badan, Lingkar Dada, Lingkar Scrotum, Volume dan Kualitas Semen pada Kambing Peranakan Ettawah (PE) [Skripsi]. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Fourie, P.J., FWC. Neser, J.J. Olivier and C. Van Der Westhuesin. 2002. Relationship Between Production Performance, Visual Appraisal and Body Measurements of Young Dorper Rams. South African Journal of Animal Science. South Africa. 32: 4.

- Frandsen, R.D. 1992. Anatomi dan Fisiologi Ternak Edisi ke-4. Diterjemahkan oleh Srigandono, B dan Praseno, K. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 34-40.
- Hariadi, H.M, H.S, Hardjopranto, Wurlina, H.A. Hermadi, B.Utomo, Rimayanti, I.N. Triana, H. Ratnani. 2011. Buku Ajar Ilmu Kemajiran Pada Ternak. Airlangga University Press. Surabaya. 63.
- Hartatik, T., A.M, Dhany., S.M.W, Tri., dan B. Endang. 2009. Karakteristik dan Kinerja Induk Sapi Silangan Limosin-Madura dan Madura di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Buletin Peternakan. 33: 143-147.
- Khairi, F., A. Mukhtiani dan Y. S. Ondho. 2014. Pengaruh Suplementasi Vitamin E, Mineral Selenium dan Zink terhadap Konsumsi Nutrien, Produksi dan Kualitas Semen Sapi Simmental. Agripet. 14: 6-16.
- Koivisto M.B., M. T. Costa, S. H. Perri and W. R. R. Vicente. 2009. The Effect of Season on Semen Characteristics and Freezability in Bos Indicus and Bos Taurus Bulls in the Southeastern Region of Brazil. *Reproduction Domestic Animal*. 44: 587-592.
- Ni'am, H.U.M., Purnomoadi, A. dan Dartosukarno, S. 2012. Hubungan Antara Ukuran-Ukuran Tubuh Dengan Bobot Badan Sapi Bali Betina Pada Berbagai Kelompok Umur. *Animal Agriculture Journal*. 1: 541 – 556.
- Salisbury, G.W. dan N.L. Vandemark. 1985. Fisiologi Reproduksi dan Inseminasi Buatan pada Sapi. Gajah Mada University Press. 200-222, 826.
- Saputra, D.J., M. N. Ihsan dan N. Isnaini. 2017. Korelasi antara Lingkar Skrotum dengan Volume, Konsentrasi dan Motilitas Spermatozoa Pejantan Sapi Bali. Universitas Brawijaya.
- Siswijono, S.B., V.M.A. Nurgiartiningih, dan Hermanto. 2013. Pengembangan Model Kelembagaan Konservasi Sapi Madura. Universitas Brawijaya.
- Sumeidiana. I.K. 2009. Pengaruh Lingkar Scrotum dan Volume Testis terhadap Volume Semen dan Konsentrasi Sperma Pejantan Simental, Limousine dan Brahman. Seminar Nasional Ternologi Peternakan dan Veteriner 2009. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro, Semarang. 71.
- Toelihere, M.R. 1993. Inseminasi Buatan pada Ternak. Cetakan 3. Angkasa. Bandung. 48-50,55-89.
- Wijaya, I.N.S. 1992. Pengaruh Musim dan Umur Terhadap Kualitas dan Kuantitas Air Mani Sapi Friesian Holstein di Balai Inseminasi Buatan Singosari. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Surabaya. 82.
- Wulandari. 2015. Karakteristik Performans Sapi Madura Karapan di Kabupaten Sumenep pada Kelompok Umur Berbeda [Skripsi]. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 87.