


JURNAL MEDIK VETERINER



Indahgusti, Pratiwi et al., 2018, p.02, <https://doi.org/10.30605/jmv.v1i3.1077>





HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > About the Journal > **Editorial Team**

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Faisal Fikri, drh., M.Vet., (SCOPUS ID: 57214252104), Universitas Airlangga, Indonesia

EDITORIAL ASSISTANT

Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, drh., M.Si., (SCOPUS ID: 57207820067), Universitas Airlangga, Indonesia

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. Shekhar Chhetri, DVM, M.Sc., (SCOPUS ID: 6505691555), Royal University of Bhutan, Bhutan
 Agus Purnomo, drh., M.Sc., (SCOPUS ID: 57213936338), Universitas Gadjah Mada, Indonesia
 Etsuko Hashimoto, DVM., (SCOPUS ID: 36894155900), Azabu University, Japan
 Ahmad Kurniawan, drh., (SCOPUS ID: 57210255339), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Indonesia
 Parthiban Sivamurthy, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 6503892550), Tamilnadu Veterinary and Animal Science University, India
 Lalu Faisal Fajri, drh., M.Vet., BP3TR Disnakeswan Nusa Tenggara Barat, Indonesia
 Assylkhanov Darkhan, DVM., Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan
 Ali Ahmad Alsahami, DVM., MVM., (SCOPUS ID: 57216196150), Universiti Putra Malaysia, Malaysia
 Syakirah Azmey, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 57215684050), Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam

ADMINISTRATION AND INFORMATION SYSTEM

Choirun Nisa, SIIP., Center of Library and Information System, Universitas Airlangga, Indonesia

JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:



Editorial Office

Jurnal Medik Veteriner
 Kampus PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga
 Jalan Wijaya Kusuma No.113, Giri, Banyuwangi, 68425
 Email: jmv@psdku.unair.ac.id
 Telp: 0333-417788



pISSN 2615-7497 ; eISSN 2581-012X



Policies

Focus and Scope

Online Submission

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Ethics

Copyright Notice

Publication Frequency

Open Access Policy

Archiving

Plagiarism Screening

Publication Fee

People

Editorial Board

Peer Reviewers

Contact

Professional Collaboration



Agreement Document

Template

Original Research
in English

Original Research
in Bahasa

Case Report Community
Empowerment
in English

Case Report Community
Empowerment
in Bahasa

Download
Letter of Originality

Reference Management Tools



HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS


[Home](#) > [Archives](#) > **Vol 1, No 3 (2018)**

VOL 1, NO 3 (2018)


OKTOBER

TABLE OF CONTENTS

FRONT MATTER

Front Cover, Editorial Board, Peer Reviewers, Acknowledgments  PDF
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama i-iv

BACK MATTER

Indexing, Subscribed Form, Guidelines for Author, Back Cover  PDF
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama v-ix

ORIGINAL RESEARCH

Pengaruh Substitusi Tepung Buah Hala (*Pandanus tectorius*) dalam Pelet Terhadap Konsumsi Bahan Kering dan Bobot Kelinci Pedaging  PDF
 57-61

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.57-61
Adyayutti Wijang Saraswati, Mohammad Anam Al Arif, Prima Ayu Wibawati, Ratna Damayanti, Bodhi Agustono, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

Kualitas Semen Segar Sapi Rambon Banyuwangi Dalam Pengencer Tris Kuning Telur Dan Susu Skim Kuning Telur  PDF
 62-67

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.62-67
Ainun Merta Safitri, Trilas Sardjito, Prima Ayu Wibawati, Imam Mustofa, Amung Logam Saputro, Ragil Angga Prastiya

Pengaruh Ekstrak Kulit dan Jus Buah Delima Putih (*Punica granatum L.*) Terhadap Titer Antibodi Ayam Kampung Super yang Divaksin Newcastle Disease  PDF
 68-73

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.68-73
Anisia Rahmawati, Nanik Sianita Wijaya, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Jola Rahmahani, Aditya Yudhana, Maya Nurwartanti Yunita

Isolasi dan Identifikasi Cemaran Bakteri *Escherichia Coli* pada Telur Penyus Lekang (*Lepidochelys olivacea*) yang Gagal Menetas di Sarang Semi Alami Pantai Boom Banyuwangi  PDF
 74-79

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.74-79
Bhima Rochman Satya Haprabu, Hardany Primarizky, Prima Ayu Wibawati, Wiyanto Haditanojo

Studi Morfometrik pada Os Scapula Hewan Kelinci New Zealand White (*Oryctolagus cuniculus*)  PDF
 87-92

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.87-92
Erwan Budi Hartadi, Winda Kusuma Dewi, Nadiya Listyasari, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

Policies

[Focus and Scope](#)

[Online Submission](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Ethics](#)

[Copyright Notice](#)

[Publication Frequency](#)

[Open Access Policy](#)

[Archiving](#)

[Plagiarism Screening](#)

[Publication Fee](#)

People

[Editorial Board](#)

[Peer Reviewers](#)

[Contact](#)

Professional Collaboration



[Agreement Document](#)

Template

[Original Research
in English](#)

[Original Research
in Bahasa](#)

[Case Report Community
Empowerment
in English](#)

[Case Report Community
Empowerment
in Bahasa](#)

[Download
Letter of Originality](#)

Reference Management Tools

Efektifitas Daya Pisah Electric Separating Sperm (ESS) terhadap Spermatozoa Kromosom X dan Y pada Kambing Sapera

PDF
93-98

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.93-98

Fahlevi Laliyah, Pudji Srianto, Amung Logam Saputro, Sri Pantja Madyawati, Bodhi Agustono, Ragil Angga Prastiya

Prevalensi Infeksi Toxocara Cati pada Kucing Peliharaan di Kecamatan Banyuwangi

PDF
99-104

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.99-104

Fifi Anik Suroiyah, Poedji Hastutiek, Aditya Yudhana, Agus Sunarso, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Ratih Novita Praja

Persentase Motilitas dan Viabilitas Spermatozoa Kambing Sapera dalam Pengencer Tris Kuning Telur dan Susu Skim Kuning Telur Before Freezing

PDF
105-112

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.105-112

Herlina Masyitoh, Tri Wahyu Suprayogi, Ratih Novita Praja, Pudji Srianto, Sri Pantja Madyawati, Amung Logam Saputro

Analisis Kelayakan Usaha Secara Finansial dan Efisiensi Produksi di Peternakan Sapi Perah PT. Fructi Agri Sejati Kabupaten Jombang

PDF
113-119

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.113-119

Khafisah Khafisah, Sunaryo Hadi Warsito, Ragil Angga Prastiya, Trilas Sardjito, Amung Logam Saputro, Bodhi Agustono

Pengaruh Pemberian Ekstrak Kedelai (Glycine max) Terhadap Jumlah Pertumbuhan Folikel Ovarium Mencit (Mus musculus)

PDF
120-127

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.120-127

Nugraheni Anggara Pramesti, Tjuk Imam Restiadi, Aditya Yudhana, Tatik Hernawati, Iwan Sahrial Hamid, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

Pengaruh Ekstrak Buah Pare (Momordica charantia) Terhadap Titer Antibodi Ayam Broiler yang Divaksin Newcastle Disease

PDF
128-133

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.128-133

Siti Komariyah, Jola Rahmahani, Bodhi Agustono

Efektifitas Sugar Dressing (100% Gula) dalam Meningkatkan Kepadatan Kolagen pada Proses Penyembuhan Luka Bakar Buatan pada Kulit Tikus Putih (Rattus norvegicus) Jantan

PDF
134-141

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.134-141

Angela Swasti Ivanalee, Ira Sari Yudaniyanti, Maya Nurwartanti Yunita, Nusdianto Triakoso, Iwan Sahrial Hamid, Amung Logam Saputro

Deteksi Antibodi Brucella pada Sapi Perah di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Metode Rose Bengal Test (RBT)

PDF
142-147

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.142-147

Welyanto Kurniawan Dwi, Wiwiek Tyasningsih, Ratih Novita Praja, Iwan Sahrial Hamid, Suryanie Sarudji, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

CASE REPORT

Laporan Kasus: Otitis Eksterna dan Auricular Hematoma (Othematoma) pada Anjing Samoyed

PDF
80-86

doi 10.20473/jmv.vol1.iss3.2018.80-86

Devi Nur Islami, Cytra Meyliana Surya Dewi, Nadia Marva Triana, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

 **grammarly**

 **MENDELEY**

 **EndNote**
...Bibliographies Made Easy™

Plagiarism Detection



USER

Username

Password

Remember me

Login

CITATION ANALYSIS

Cited by SCOPUS

Cited by Google Scholar

Semua Sejak 2015

Kutipan 105 105

indeks-h 6 6

indeks-i10 1 1

NOTIFICATIONS

View

Subscribe

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

[By Issue](#)

[By Author](#)

[By Title](#)

[Other Journals](#)

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

KEYWORDS

Banyuwangi

Escherichia coli Newcastle

Disease Peranakan Etawah

anjing ayam buras before

freezing helminthiasis kambing

Sapera kepadatan

kolagen kolagen kolesterol

kualitas spermatozoa luka bakar

mencit penyembuhan luka

prevalensi probiotik sapi

perah susu skim kuning telur

Pengaruh Pemberian Ekstrak Kedelai (*Glycine max*) Terhadap Jumlah Pertumbuhan Folikel Ovarium Mencit (*Mus musculus*)

(THE EFFECT OF SOYBEAN EXTRACT (*Glycine max*) ON TOTAL GROWTH OF OVARIAN FOLLICLES IN MICE (*Mus musculus*))

Nugraheni Anggara Pramesti^{1*}, Tjuk Imam Restiadi², Aditya Yudhana³, Tatik Hernawati², Iwan Sahrial Hamid⁴, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama⁵

¹Bachelor of Veterinary Medicine,

²Department of Veterinary Reproduction,

³Department of Veterinary Parasitology,

⁴Department of Basic Veterinary Science,

⁵Department of Veterinary Anatomy,

Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga,

UNAIR C-Campus Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 60115

Telp. (031)5993016, Fax. (031)5993015

*Corresponding author: nugraheni.anggara.p-2014@fkh.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kedelai (*Glycine max*) terhadap jumlah pertumbuhan folikel ovarium pada mencit (*Mus musculus*). Sampel terdiri dari 20 ekor mencit yang secara acak dibagi menjadi lima kelompok. Kelompok kontrol (K) tidak diberi ekstrak kedelai. Kelompok P1 diberi ekstrak kedelai dengan dosis 0,05 mg/kgBB. Kelompok P2 diberi ekstrak kedelai dengan dosis 0,010 mg/kgBB. Kelompok P3 diberi ekstrak kedelai dengan dosis 0,015 mg/kgBB. Kelompok P4 diberikan ekstrak kedelai dengan dosis 0,020 mg/kgBB. Ekstrak kedelai diberikan selama 14 hari. Analisis data menggunakan uji One Way ANOVA dan dilanjutkan dengan uji *Honestly Significant Difference* (HSD). Hasil penelitian menunjukkan kelompok kontrol (K) memiliki perbedaan signifikan dengan kelompok P1, P2, P3 dan P4. Hasil rata-rata jumlah folikel primer tertinggi terdapat pada perlakuan 4 (P4) dengan dosis 0,020 mg/kgBB dan jumlah rata-rata folikel sekunder tertinggi pada perlakuan 3 (P3) dengan dosis 0,015 mg/kgBB. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak kedelai yang diberikan pada mencit betina dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan folikel ovarium dan jumlah rata-rata folikel tertinggi adalah pada perlakuan 3 (P3) dengan dosis 0,015 mg/kgBB.

Kata kunci: ekstrak kedelai, folikel, ovarium, mencit

Abstract

This study aimed to determine the effect of soybean extracts (*Glycine max*) on the the total number of ovarian follicles growth in mice (*Mus musculus*). The sample consisted of 20 mice were randomly divided into five groups. The control group (K) was not given the soybean extract. P1 group was given soybean extract with dose 0.05 mg/kgBW. P2 group was given soybean extract with dose of 0.010 mg/kgBW. P3 group was given soybean extract with the dose of 0,015 mg/kgBW. P4 group given soybean extract with dose of 0,020 mg/kgBW. The soybean extracts conducted for 14 days. Data analysis used One Way ANOVA and continued by *Honestly Significant Difference* (HSD). The results showed the control group (K) has significant difference with P1, P2, P3 and P4 group. The results of the average number of primary follicles were highest for treatment 4 (P4) with dose of 0,020 mg/kgBW and the average number of secondary follicles were highest in treatment 3 (P3) at a dose of 0.015 mg/kgBW. It can be concluded that soybean extract in female mice can increase the number of ovarian follicles and the highest average number of follicles was on treatment 3 (P3) with dose 0.015 mg/kgBW.

Key words: soybean extract, follicle, ovary, mice

PENDAHULUAN

Kedelai merupakan tanaman polong-polongan yang banyak dijumpai di beberapa

negara. Masyarakat biasanya mengenal kedelai karena kandungan gizinya. Kedelai memiliki beberapa komponen kandungan gizi diantaranya adalah protein dan minyak nabati (Aldillah, 2014). Kedelai memiliki senyawa yang

mempunyai aktivitas estrogenik yang disebut dengan fitoestrogen. Senyawa tersebut strukturnya mirip dengan estrogen alami, seperti 17β -estradiol (Novarro, 2005). Isoflavon merupakan salah satu golongan dari fitoestrogen. Isoflavon dapat ditemukan pada tanaman leguminosa, seperti kedelai, semua olahan padi, kentang, buah dan sayur (Whitten and Patisaul, 2001).

Hasil penelitian dari Sartini dkk (2014) menunjukkan bahwa kadar isoflavon pada kedelai yang paling tinggi adalah kedelai yang tanpa dihilangkan kulit arinya dan diekstraksi menggunakan cairan penyari metanol dengan kadar isoflavon sebesar 15,9%. Struktur kimia isoflavon yang merupakan senyawa fitoestrogen memiliki kemiripan dengan hormon estrogen, sehingga dapat berikatan dengan reseptor estrogen endogen. Ikatan ini dapat memberikan aktivitas fisiologis sebagai hormon estrogen (Thomsen *et al.*, 2006; Purnama dan Samik, 2014).

Hormon estrogen tersebut disekresikan oleh sel-sel techa iterna folikel ovarium (Feradis, 2010). Hormon estrogen berpengaruh terhadap masa pubertas pada hewan betina. Pubertas hewan betina akan menunjukkan gejala birahi dimana pada saat hewan betina mengalami birahi atau estrus hewan tersebut akan mengovulasikan sel telur. Pertumbuhan folikel ovarium akan dipengaruhi oleh hormon gonadotropin seperti Folicle Stimulating Hormone (FSH) dan Luteinizeing Hormon (LH) dan hormon estrogen yang akan memberikan feedback positif pada hipotalamus.

Isoflavon pada kedelai memiliki kandungan yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian pada bidang reproduksi untuk melihat pengaruh isoflavon terhadap jumlah pertumbuhan folikel ovarium.

METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan 20 ekor mencit galur Swiss yang berumur 3,5-4 minggu dengan berat badan antara 20-25 gram dan tidak ada abnormalitas atau sehat. Kebutuhan nutrisi

mencit perhari adalah protein 20-25%, lemak 5-12%, serat kasar 2,5 % dan karbohidrat 45-60 %. Pakan yang diberikan dari PT Charoen Pokphand® dengan jenis pellet. Minum diberikan ad libitum. Kandang dan alas kandang yang digunakan adalah serbuk kayu steril. Tempat pakan dan minum yang digunakan juga dalam keadaan steril.

Perlakuan

Prosedur penelitian dilakukan dengan uji kode etik hewan coba di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga kemudian dilakukan persiapan dan penyesuaian hewan coba selama tujuh hari. Pengamatan siklus birahi pada mencit dilakukan dengan swab atau ulas vagina dengan cara flushing dengan cairan NaCl fisiologis 0,9% dan diwarnai dengan larutan giemmsa serta diamati di bawah mikroskop. Ekstraksi dilakukan dengan merendam 2 kg serbuk simplisia biji kedelai dengan 4 liter etanol 96%. Ekstraksi kedelai berlangsung selama 2 hari kemudian disaring agar mendapatkan filtratnya. Filtrat dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu $\pm 70^{\circ}\text{C}$.

Dosis ekstrak kedelai pada penelitian ini adalah (P1) 0,005 mg/kgBB, (P2) 0,010 mg/kgBB, (P3) 0,015 mg/KgBB, (P4) 0,020 mg/kgBB. Pemberian ekstrak kedelai pada mencit dilakukan secara peroral dengan menggunakan sonde lambung. Ekstrak kedelai dilarutkan dengan larutan CMC-Na untuk memudahkan ekstrak masuk ke dalam lambung mencit. Perlakuan dilakukan selama 14 hari

Mencit betina dikorbankan pada hari ke 15 dengan cara dislokasi leher kemudian dilakukan pembedahan untuk mengambil jaringan ovarium. Pengamatan jumlah folikel dilakukan dengan pengambilan ovarium kemudian dibuat sediaan histologi.

Pengamatan

Jumlah pertumbuhan folikel ovarium diamati di bawah mikroskop trinokuler Nikon® Eclipse E200 dengan perbesaran 100 kali. Pengamatan dilakukan dengan melihat jumlah folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel de Graaf ovarium. Pengamatan dilakukan dengan memeriksa

seluruh lapangan pandang pada masing-masing preparat. Perhitungan jumlah folikel dilakukan pada kedua ovarium kanan dan kiri kemudian dirata-ratakan. Hasil perhitungan dari pengamatan kemudian dianalisis statistik.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis statistik Uji *One Way Anova* (Analysis of Variance) untuk mengetahui perbedaan pengaruh dari beberapa perlakuan. Jika terdapat perbedaan

maka dilakukan uji *Honestly Significant Difference* (HSD).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji *One Way* ANOVA untuk jumlah folikel ovarium mencit menunjukkan adanya perbedaan yang nyata ($p < 0,05$). Uji *Honestly Significant Difference* (HSD) digunakan untuk mengetahui perbedaan dari setiap kelompok perlakuan.

Tabel 1. Rata-rata jumlah folikel pada tiap kelompok perlakuan

Perlakuan	Jumlah Rata-rata		Mean±SD
	Folikel Ovarium Kiri	Folikel Ovarium Kanan	
K	5,25	5,75	5,50 ^a ±0,408
P1	12,25	12,25	12,25 ^b ±0,866
P2	16,25	16,25	16,50 ^c ±0,288
P3	20,25	19,25	19,75 ^d ±0,288
P4	24,5	24	23,50 ^e ±1,190

Keterangan: superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil berbeda nyata ($p < 0,05$)



Gambar 1. Gambaran histopatologi ovarium pada masing-masing perlakuan dengan pertumbuhan folikel pada bagian korteks

Hasil uji *Honestly Significant Difference* (HSD) menunjukkan kelompok kontrol (K) memiliki perbedaan jumlah folikel ovarium yang signifikan terhadap kelompok P1, P2, P3 dan P4 ($p < 0,05$). Kelompok perlakuan 1 (P1) memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok K,

P2, P3 dan P4 ($p < 0,05$). Kelompok perlakuan 2 (P2) memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok K, P1, P3 dan P4 ($p < 0,05$). Kelompok perlakuan 3 (P3) memiliki perbedaan yang signifikan terhadap kelompok K, P1, P2 dan P4 ($p < 0,05$).

Grafik perbandingan jumlah rata-rata folikel primer, sekunder, tersier dan *de Graaf* antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menunjukkan terdapat perbedaan pada jumlah folikel primer dan sekunder. Kelompok kontrol (K) memiliki jumlah rata-rata folikel primer dan sekunder yang lebih rendah dari kelompok perlakuan P1, P2, P3 dan P4 dengan jumlah rata-rata folikel primer 2,5 dan rata-rata jumlah folikel sekunder 2,5. Kelompok P1 memiliki jumlah rata-rata folikel primer 4,5 dan jumlah rata-rata folikel sekunder 5,25. Kelompok P2 memiliki jumlah rata-rata folikel primer 6,25 dan jumlah rata-rata folikel sekunder 10. Kelompok P3 memiliki jumlah rata-rata folikel primer mengalami penurunan yakni 5,75 dan jumlah rata-rata folikel sekunder mengalami peningkatan yakni 12,25. Kelompok P4 memiliki jumlah rata-rata folikel primer 11 dan jumlah rata-rata folikel sekunder 10,75. Hasil rata-rata jumlah folikel tersier dan folikel *de Graaf* pada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan tidak berbeda nyata. Rata-rata jumlah folikel primer yang tertinggi adalah hasil dari perlakuan 4 (P4) dengan dosis 0,020 mg/kgBB. Rata-rata jumlah folikel sekunder yang tertinggi ditunjukkan pada grafik perlakuan 3 (P3) dengan dosis P3 0,015 mg/kgBB dengan jumlah rata-rata folikel 12,25.

Kedelai merupakan salah satu tanaman yang mengandung isoflavon. Isoflavon dalam tanaman kedelai dapat berikatan dengan reseptor estrogen yang ada di dalam tubuh (El-Shelmy, 2011). Struktur kimia isoflavon pada kedelai memiliki kemiripan dengan hormon estrogen yaitu 17β -estradiol. Reseptor estrogen dalam tubuh dapat berikatan dengan senyawa isoflavon sehingga dapat memberikan aktivitas fisiologis sebagai hormon estrogen (Thomsen *et al.*, 2006; Purnama *et al.*, 2017). Pemberian estrogen dosis tinggi pada tikus (50-100 μ g) menghambat ovulasi (menghambat pengeluaran *Folicle Stimulating Hormone* dan *Luteinizing Hormone*) dan pemberian dosis rendah (kurang dari 50 μ g) meningkatkan sekresi FSH dan LH (Sarwono, 1994 dalam Limbong, 2003). Hasil penelitian Prabowo (2014) pemberian ekstrak kedelai dengan dosis 7,5 mg/ 200 gramBB tikus dapat meningkatkan jumlah folikel ovarium.

Pemberian dosis diatas 7,5 mg/ 200 gramBB tikus menyebabkan penurunan jumlah folikel ovarium tikus. Hal tersebut terjadi akibat sekresi hormon gonadotropin dan GnRH dihambat oleh pemberian senyawa fitoestrogen.

Perkembangan folikel ovarium dipengaruhi oleh hormon estrogen, hormon estrogen dihasilkan oleh sel *techa interna* dari folikel ovarium. Perkembangan serta pematangan folikel dan sekresi estrogen dikendalikan oleh hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin dari hipofisis diantaranya adalah hormon *Follicle Stimulating Hormone* (FSH) dan *Luteinizing Hormone* (LH). Estrogen yang disekresikan oleh ovarium akan memicu pelepasan hormon LH untuk mengovulasikan oosit pada fase estrus. LH berfungsi untuk merangsang korpus luteum sedangkan estrogen mempengaruhi sekresi hormon gonadotropin melalui umpan balik positif pada hipotalamus (McGee and Aaron, 2000).

Reseptor estrogen spesifik, sehingga hanya dapat mengikat molekul yang memiliki struktur yang mirip dengan hormon estrogen. Fitoestrogen merupakan senyawa yang mirip dengan hormon estrogen sehingga dapat berikatan dengan reseptor estrogen pada tubuh. Molekul estrogen akan mengikat resptor membentuk ikatan *ligand-hormone receptor*. Pengikatan tersebut dimungkinkan karena molekul estrogen memiliki bentuk atau struktur yang mirip untuk berikatan. Ikatan tersebut akan merangsang proses seluler tubuh yang spesifik sehingga terjadi pengaktifan gen spesifik untuk memicu pembentukan protein agar proses metabolisme sel berlangsung (Eddy, 2006 dalam Rejeki, 2017). Reseptor estrogen (ER) dalam ovarium terdapat pada inti sel granulosa, sel epitel germinal, sel interstitial dan sel *techa* dari folikel primer, sekunder dan folikel yang matang (Cheng *et al.*, 2002).

Perkembangan folikel sekunder terjadi akibat pengaruh pemberian ekstrak kedelai yang memiliki kandungan fitoestrogen. Perbedaan yang tidak nyata pada jumlah rata-rata folikel tersier dan folikel *de Graaf* terjadi pada semua kelompok, baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Perkembangan folikel

tersier dan folikel *de Graaf* tidak memiliki perbedaan yang nyata dapat diakibatkan oleh adanya atresia (kerusakan) folikel dan pengaruh dari respon masing-masing hewan coba itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pertumbuhan folikel selaras dengan penelitian Prabowo (2014) pemberian ekstrak kedelai dengan dosis 7,5 mg/ 200 gramBB tikus dapat meningkatkan jumlah folikel ovarium.

KESIMPULAN

Pemberian ekstrak kedelai (*Glycine max*) pada mencit betina (*Mus musculus*) dapat meningkatkan jumlah folikel ovarium. Rata-rata jumlah folikel yang tertinggi adalah pada perlakuan 3 (P3) dengan dosis 0,015 mg/kgBB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga atas izin yang diberikan dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldillah, R. 2014. Analisis Produksi Dan Konsumsi Kedelai Nasional. [Tesis] Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor. Hal.9-30.
- Blackburn, S.T. 2013. Maternal, Fetal, & Neonatal Physiology, A Clinical Perspective, 4th Edition. Philadelphia (USA): Elsevier Inc. p29-53.
- Bolla, K.N. 2015. Soybean Consumption And Health Benefits. *Int J Sci Tech Res*, 4: 50-3.
- Bustamam, N. 2008. Fitoestrogen dan kesehatan tulang. *Bina Widya*, 19(3): 146-150.
- Byers, S.L., M.V. Wiles, S.L. Dunn, and R.A. Taft. 2012. Mouse estrous cycle identification tool and images. *PLoS one*, 7(4): 1-4.
- Cheng, G., Z. Weihua, S. Makinen, S. Makela, S. Saji, M. Warner, G. Jan-Ake, dan O. Hovatta. 2002. A role for the androgen receptor in follicular atresia of estrogen receptor beta knockout mouse ovary. *Biol Repro*, 66(1): 77-84.
- El-Shemy, H.A. 2011. Soybean and nutrition. Tech. Publish, Rijeka, Croatia, 2: 72-85.
- Feradis. 2010. Reproduksi Ternak. Bandung: Alfabeta. Hal.33-74.
- Ganong, W.F. 2003. Fisiologi Kedokteran. Ed ke-20. Widjakusumah HM, penerjemah: Djauhari, editor. Jakarta: EGC. Terjemahan dari medical physiology. Hal.165-176.
- Gueven, A., and D. Knorr. 2011. Isoflavonoid production by soy plant callus suspension culture. *J Food Engine*, 103(3): 237-243.
- Gupta, C., D. Prakash, and S. Gupta. 2016. Phytoestrogens as pharma foods. *Adv Food Technol Nutr Sci Open J*, 2(1): 19-31.
- Hafez, E.S.E., M.R. Jainudeen, and Y. Rosnina. 2000. Hormones, growth factors, and reproduction. *Reproduction in farm animals*. Lippincott, Williams and Wilkins, Baltimore, MA, USA. p33-54.
- Haliza, W., Endang, Y. dan Thahir, R. 2007. Pemanfaatan Kacang-kacangan Lokal sebagai Substitusi Bahan Baku Tempe dan Tahu. *Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian*, 3: 1-8.
- Indriani, Ghina. 2014. Peran Pemberian Ekstrak Tempe terhadap Kinerja Reproduksi Tikus Betina Usia Lepas Sapih. [Skripsi]. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Hal.2-5.
- Ismudiono, P. S., H. Anwar, S.P. Madyawati, A. Samik, & E. Safitri. 2010. Fisiologi

- Reproduksi pada Ternak. Bagian Reproduksi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Surabaya. Hal.55-56.
- Laurence, D.R., and Bacharach, A.L. 1964. Evaluation of drug activities: pharmacometrics. New York: Academic press. 1: 183-205.
- Leung, P.C., and E.Y. Adashi. 2003. The ovary. Elsevier. (Second edition.). p111-439.
- Lewis, V. 2007. Reproductive Endocrinology and Infertility. Landes Bioscience. p4-9.
- Limbong, T. 2003. Pengaruh Ekstrak Etanol Kulit batang Pakettu (*Ficus superba* Miq) Terhadap Folikulogenesis Ovarium Mencit (*Mus musculus*): Penelitian Eksperimental Laboratoris [Disertasi] Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Hal.6-60.
- Lohmiller, J.J., and S.P. Swing. 2006. Reproduction and breeding. The Laboratory Rat. 2nd Ed. Elsevier Academic Press, London, UK. p153.
- Mateos-Apricio, I., C.A. Redondo, M.J. Villanueva-Suarez, and M.A. Zapata-Revilla. 2008. Soybean, a promising health source. *Nutricion hospitalaria*, 23(4): 305-312.
- Marquez, R.S., H. Hernandez, J.A. Flores, G. Munoz, M. Gerardo, G. Duarte, J. Vielma, and J.A. Delgadillo. 2012. Effects of phytoestrogens on mammalian reproductive physiology. *Trop Subtrop Agroecosys*, 15(1): 129-145.
- McGee, E. A., and J.W.H. Aaron. 2000. Initial and Cyclic Recruitment of Ovarian Follicles. *Endocrine rev*, 21(2): 200-214.
- Mitchell, J. H., E. Cawood, D. Kinniburgh, A. Provan, A.R. Collins, and D.S. Irvine. 2001. Effect of a phytoestrogen food supplement on reproductive health in normal males. *Clin Sci*, 100(6): 613-618.
- Muhiddin, S.T. 2013. Peran Ekstrak Tempe pada Masa Prapubertas terhadap Kinerja Reproduksi Tikus Betina *Rattus norvegicus*. [Skripsi] Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Hal.2-9.
- Mujic, I., E. Sertovic, S. Jokic, Z. Saric, V. Alibabic, S. Vidovic, and J. Zivkovic. 2011. Isoflavone content and antioxidant properties of soybean seeds. *Croatian J Food Sci Tech*, 3(1): 16-20.
- Mulyati, B. 2016. Studi Komputasi Interaksi Isoflavon dengan Reseptor Estrogen β Menggunakan Metode Oniom. *EduChemia. Jurnal Kimia dan Pendidikan*, 1(2): 137-148.
- Murkies, A.L., G. Wilcox, and S.R. Davis. 1998. Phytoestrogens. *J Clin Endocrinol Metab*, 83(2): 297-303.
- Novarro, M.C. 2005. Mecanismo de acción de las isoflavonas. *Gineología y Obstetricia Clínica*, 6: 159-165.
- Naya, M., and I. Masanao, I. 2013. Recent Advances on Soybean Isoflavone Extraction and Enzymatic Modification of Soybean Oil. Soybean-Bio-Active Compounds. *In Tech Chapter*, 19: 430-452.
- Pavlik, R., G. Wypior, S. Hect, P. Papadopoulos, M. Kupka, C. Thaler, I. Wiest, A. Pestka, K. Friese, and U. Jeschke. 2011. Induction of G protein-coupled estrogen receptor (GPER) and nuclear steroid hormone receptors by gonadotropins in human granulosa cells. *Histochem Cell Biol*, 136(3): 289.
- Pelletier, G., and M. El-Alfy. 2000. Immunocytochemical localization of estrogen receptors α and β in the human reproductive organs. *J Clin Endocrinol Metab*, 85(12): 4835-4840.

- Prabowo, H.A. 2014. Pengaruh Pemberian Ekstrak Kedelai (*Glycine max, L.*) terhadap Jumlah Folikel Ovarium pada Tikus Putih (*Rattus norvegicus, L.*). Diss. Universitas Yogyakarta. Hal.1-6.
- Primiani, C.N. 2013. Potensi Tepung Tempe sebagai Estrogen Alami terhadap Uterus Mencit Premenopause. *Sains Matematika*, 1(2): 47-51.
- Purnama, M.T.E., & A. Samik. 2014. Potensi Mycotoxin Binders Terhadap Gambaran Histopatologi Neoplasia Kelenjar Mammae Mencit (*Mus musculus*) Bunting yang Terpapar Zearalenon. *Veterinaria*, 7(1).
- Purnama, M.T.E., I. Mustofa, T.W. Suprayogi, A. Samik, R.A. Prastiya, & A.L. Saputro. 2017. Aluminosilikat Berpotensi Menekan Gangguan Reproduksi Mikotoksin Zearalenon Berdasarkan Pengamatan Jumlah Folikel dan Ekspresi Caspase-9 Ovarium. *Jurnal Veteriner*, 18(2): 175-180.
- Rejeki, R.T., H. Tri, dan Sukiya. 2017. Pengaruh Ekstrak Daun Kenari (*Canarium indicum, L.*) terhadap Perkembangan Folikel Ovarium Tikus Putih Betina (*Rattus norvegicus, L.*). *Biologi-SI*, 6(3): 194-203.
- Ruggiero, R.J., and F.E. Likis. 2002. Estrogen: physiology, pharmacology, and formulations for replacement therapy. *J Midwifery Women's Health*, 47(3): 130-138.
- Saeed, N.A.H.A.A., I.M. Al-Kadmy, L.J. Ibraheem, H.F.D. Al-Lami, & S.N. Aziz. 2017. The effect of Soybean (*Glycine max*) Aqueous Extract on Ovarian Structure in White Female Rats. *Mintage J Pharm Med Sci*, 21-22.
- Safrida. 2008. Perubahan Kadar Hormon Estrogen pada Tikus yang Diberi Tepung Kedelai dan Tepung Tempe. [Tesis] Bogor Institut Pertanian Bogor. Hal.32-56.
- Sartini, M.N. Djide, dan A.D. Permana. 2014. Ekstraksi Isoflavon Kedelai dan Penentuan Kadarnya Secara Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC). *Sainsmat*, 3(2): 130-134.
- Sarwono. 1994. Ilmu Kandungan. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawihardjo. Jakarta. Hal.544-643.
- Scudamore, C.L. 2014. A Practical Guide to the Histology of the Mouse. John Wiley & Sons. p109-120.
- Sherwood, L. 2001. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem. Brahm, penerjemah; Santoso BI, editor. Jakarta: EGC. Terjemahan dari: Human Physiology: from cells to systems. p196-210.
- Sitasiwi, A.J. 2008. Hubungan Kadar Hormon Estradiol 17- β dan Tebal Endometrium Uterus Mencit (*Mus musculus L.*) selama Satu Siklus Estrus. *Anatomi Fisiologi*, 16(2): 38-45.
- Stormshak, F. 2005. Comparative endocrinology. Endocrinology. Humana Press. p149-150.
- Suarsana, I.N., D.I.N. Sadra, I.W. Gorda, dan P.B. Pontjo. 2011. Tepung Tempe Kaya Isoflavon Meningkatkan Kadar Kalsium, Posfor dan Estrogen Plasma Tikus Betina Normal. *Jurnal Veteriner*, 12(3): 229-234.
- Tempfer, C.B., E.K. Bentz, S. Leodolter, G. Tscherne, F. Reuss, H.S. Cross, & J.C. Huber. 2007. Phytoestrogens in clinical practice: a review of the literature. *Fertility and sterility*, 87(6): 1243-1249.
- Thomsen, A.R., K. Almstrup, J.E. Nielsen, I.K. Sorensen, O.W. Petersen, H. Leffers, & V.M. Breinholt. 2006. Estrogenic effect of soy isoflavones on mammary gland

- morphogenesis and gene expression profile. *Toxicol Sci*, 93(2): 357-368.
- Treuting, P.M., S.M. Dintzis, and K.S. Montine. (Eds.). 2017. *Comparative Anatomy and Histology: A Mouse, Rat, and Human Atlas*. Academic Press. Hal.303-330.
- Urasopon, N., Y. Hamada, K. Asaoka, U. Pongmali, & S. Malaivijitnond. 2008. Isoflavone content of rodent diets and its estrogenic effect on vaginal cornification in *Pueraria mirifica*-treated rats. *Sci Asia*, 34(4): 371-376.
- Whitten, P.L., and H.B. Patisaul. 2001. Cross-species and interassay comparisons of phytoestrogen action. *Environment Health Perspectives*, 109 Suppl 1(5): 71-73.
- Winarsi, H. 2010. *Protein Kedelai dan Kecambah Manfaatnya bagi Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisius. Hal.16-25.



**KOMISI ETIK PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
*Animal Care and Use Committee (ACUC)***

**KETERANGAN KELAIKAN ETIK
“ ETHICAL CLEARENCE ”**

No : 4.KE.004.04.2018

**KOMISI ETIK PENELITIAN (ANIMAL CARE AND USE COMMITTEE)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA,
TELAH MEMPELAJARI SECARA SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG
DIUSULKAN, MAKA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :**

PENELITIAN BERJUDUL : Pengaruh Pemberian Ekstrak Kedelai (Glycine max)
Terhadap Jumlah Pertumbuhan Folikel Ovarium Mencit
(Mus musculus)

PENELITI UTAMA : Iwan Sahrial Hamid

UNIT/LEMBAGA/TEMPAT PENELITIAN : Program Studi
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

DINYATAKAN : LAIK ETIK

Surabaya, April 2018

Mengetahui
Dekan FKH-Unair,

Prof. Dr. Pudji Srianto, M.Kes., drh.
NIP. 195601051986011001

Ketua,

Dr. Nusdianto Triakoso, M.P.,Drh.
NIP. 196805051997021001