


OVOZOA

Departemen Reproduksi Veteriner
Fakultas Kedokteran Hewan Unair





























VOL 8, NO 2 (2019)

OVOZOA : JOURNAL OF ANIMAL REPRODUCTION

TABLE OF CONTENTS

ORIGINAL ARTICLE

- | | | |
|---|--|---|
|  | HUBUNGAN ANTARA BODY CONDITION SCORE (BCS) DENGAN PRODUKSI SUSU SAPI PERAH FRIESIAN HOLSTEIN (FH) |  |
| | | 89-93 |
|  | 10.20473/ovz.v8i2.2019.89-93 | |
|  | Melsa Netika, Roesno Darsono, Budi Utomo, Imam Mustofa, Ismudiono Ismudiono, Tri Wahyu Suprayogi | |
|  | HUBUNGAN ANTARA UMUR DENGAN CALVING INTERVAL, DAYS OPEN, DAN SERVICE PER CONCEPTION SAPI FRIESIAN HOLSTEIN (FH) |  |
| | | 94-99 |
|  | 10.20473/ovz.v8i2.2019.94-99 | |
|  | Hanifah Muslimah Ananda, Wurlina Wurlina, Nove Hidajati, Mas'ud Hariadi, Abdul Samik, Tjuk Imam Restiadi | |
|  | PENGARUH EKSTRAK DELIMA MERAH (Punicagranatum L.) TERHADAP PENINGKATAN PERSENTASE KAPASITASI DAN REAKSI AKROSOM SPERMATOZOA TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) |  |
| | | 100-104 |
|  | 10.20473/ovz.v8i2.2019.100-104 | |
|  | Baktiar Budi Satrio, Mas'ud Hariadi, Retno Sri Wahjuni, Budi Utomo, Sri Agus Sudjarwo, Tita Damayanti L | |
|  | KORELASI ANTARA LINGKAR DADA, PANJANG BADAN DAN TINGGI GUMBA TERHADAP VOLUME SEMEN DAN KONSENTRASI SPERMATOZOA SAPI MADURA |  |
| | | 105-109 |
|  | 10.20473/ovz.v8i2.2019.105-109 | |
|  | Dilla Aranda Mayola, Rimayanti Rimayanti, Sunaryo Hadi Warsito, Suzanita Utama, Hana Eliyani, Erma Safitri | |
|  | PERANAN VITAMIN B12 DALAM PENGECER SUSU SKIM KUNING TELUR TERHADAP MOTILITAS DAN VIABILITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDIPOST THAWING |  |
| | | 110-115 |
|  | 10.20473/ovz.v8i2.2019.110-115 | |
|  | Mirza Asafaizh Arini, Tri Wahyu Suprayogi, Sunaryo Hadi Warsito, Trilas Sardjito, Suherni Susilowati, Indah Norma Triana | |
|  | PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK TEH HIJAU (Camellia sinensis) DALAM BAHAN PENGECER SUSU SKIM TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI YANG DISIMPAN PADA SUHU DINGIN |  |
| | | 116-121 |
|  | 10.20473/ovz.v8i2.2019.116-121 | |
|  | Maulinda Agchirilia Vladika, Sunaryo Hadi Warsito, Suherni Susilowati, Tatik Hernawati, Rochmah Kurnijasanti, Tjuk Imam Restiadi | |
|  | PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK TEH HIJAU (Camellia sinensis) DALAM BAHAN PENGECER SUSU SKIM KUNING TELUR TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI YANG DISIMPAN PADA SUHU DINGIN |  |
| | | 122-126 |

People

Contact

Editorial Team

Reviewers

Instruction for Author

Guide for authors

Online Submission

Download Documents

Journal Policy

Focus and Scope

Section Policies

Publication Frequency

Publication Ethics

Indexing

Article Processing Charge

Peer Reviewers Process

Open Access Statement

Archiving

Plagiarism Screening

History

Copyright

old website

Tools




grammarly



OPEN JOURNAL SYSTEMS

Journal Help

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.122-126

 Wahyu Retno Swari, Emy Koestanti Sabdoningrum, Wurlina Wurlina, Suherni Susilowati, Rochmah Kurnijasanti, Erma Safitri

 **PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK TEH HIJAU (*Camellia sinensis*) DALAM BAHAN PENGECER KUNING TELUR SITRAT TERHADAP KUALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI YANG DISIMPAN PADA SUHU DINGIN**



127-131

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.127-131

 Itrah Khoirunnisa, Suherni Susilowati, Lilik Maslachah, Tri Wahyu Suprayogi, Rochmah Kurnijasanti, Hermin Ratnani

 **PENGARUH PENGECER KUNING TELUR AYAM DENGAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP INTEGRITAS MEMBRAN PLASMA DAN ABNORMALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI**
PENGARUH PENGECER KUNING TELUR AYAM DENGAN AIR KELAPA MUDA TERHADAP INTEGRITAS MEMBRAN PLASMA DAN ABNORMALITAS SPERMATOZOA DOMBA SAPUDI



139-143

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.139-143

 Mayrena Ayu Cesaria, A.T.Soelih Estoepongastie, Suherni Susilowati, Tatik Hernawati, Sri Pantja Madyawati, Indah Norma Triana


CASE REPORT

 **DAMPAK PEMBERIAN ROTI AFKIR TERHADAP EFISIENSI REPRODUKSI SAPI PERAH Friesian Holstein DI WILAYAH KERJA KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR, PASURUAN**



144-148

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.144-148


 Ricko Nurdianto S., Sri Hidanah, Sri Pantja Madyawati, Abdul Samik, wurlina wurlina, Tri Wahyu Suprayogi

 **PERBANDINGAN BODY CONDITION SCORE, SERVICES PER CONCEPTION, CALVING INTERVAL, DAN DAYS OPEN SAPI FRIESIAN HOLSTEIN (FH) DI KEMITRAAN GREENFIELD DENGAN KUD TANI WILIS SENDANG**



149-153

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.149-153

 Aghid Cahya P., Sri Mulyati, Suwarno Suwarno, Imam Mustofa, Pudji Srianto, Budi Utomo

 **PENGARUH pH LENDIR MUKOSA VAGINA SAAT BIRAH TERHADAP PERSENTASE KEBUNTINGAN (Conception Rate) PADA SAPI PERAH DI KUD TANI WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN KSU TUNAS SETIA BARU KABUPATEN PASURUAN**



154-158

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.154-158


 Andaru Rizki, Pudji Srianto, Endang Suprihati, Trilas Sardjito, Ismudiono Ismudiono, Mohammad Anam Al Arif

 **CONCEPTION RATE DAN SERVICE PER CONCEPTION PADA SAPI BALI HASIL INSEMINASI BUATAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017**



159-163

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.159-163


 Asih Deskayanti, Trilas Sardjito, Agus Sunarso, Pudji Srianto, Tri Wahyu Suprayogi, Herry Agoes Hermadi

 **PERSENTASE KEJADIAN KAWIN BERULANG SAPI PERAH YANG TELAH DI IB (INSEMINASI BUATAN) TINGKAT PETERNAK DESA NYAWANG KIDUL DI KUD TANI WILIS KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG**



164-168

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.164-168

 Arda Wahyu Setyadi, Pudji Srianto, Oky Setyo Widodo, Wurlina Wurlina, Abdul Samik, Tjuk Imam Restiadi

 **HUBUNGAN MORFOMETRI AMBING TERHADAP PRODUKSI SUSU KUDA DI DAERAH BIMA NUSA TENGGARA BARAT**



169-174

doi 10.20473/ovz.v8i2.2019.169-174

 Mujahid Mujahid, Imam Mustofa, Benjamin Chr Tehupuring, Tjuk Imam Restiadi, Hana Eliyani, Hermin Ratnani

USER

Username

Password

Remember me

Login

NOTIFICATIONS

[View](#)

[Subscribe](#)

[View My Stats](#)



Ovozoa: Journal of Animal Reproduction by Unair is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).



This journal is supported by



Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Universitas Airlangga
copyright@2017 Template PPJPI

HUBUNGAN ANTARA *BODY CONDITION SCORE* (BCS) DENGAN PRODUKSI SUSU SAPI PERAH FRIESIAN HOLSTEIN (FH)

CORRELATION BETWEEN *BODY CONDITION SCORE* (BCS) WITH MILK PRODUCTION OF FRIESIAN HOLSTEIN (FH) DAIRY CATTLE

Melsa Netika¹⁾, Roesno Darsono²⁾, *Budi Utomo³⁾, Imam Mustofa⁴⁾, Ismudiono⁵⁾,
Tri Wahyu Suprayogi⁶⁾

¹⁾Student, ²⁾ Departement of Veterinary Pathology, ^{3,4,5,6)}Department of Veterinary Reproduction
Faculty of Veterinary Medicine, Airlangga University

*Corresponding author: email:budi_reprovvet@yahoo.com;netikamelsa@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research was to observe the Body Condition Score (BCS) and milk production of Friesian Holstein (FH) dairy cattles. 144 of dairy cattles divided into 3 groups based on BCS 1-9 scale. The results showed that $Y = 6.62 + 5.54X - 5.78X^2$. Coefficient of determination (R^2) of 20.6 this mean any increase in milk production by 20.6% is affected by BCS. It can be concluded that there is a correlation between Body Condition Score (BCS) and milk production. The higher BCS (BCS 7-8) the lower milk production, while in ideal BCS production (5-6) the production of milk is optimize.

Keywords: Body Condition Score, Milk Production.

Latar Belakang

Susu juga merupakan produk hewani yang sangat digemari semua kalangan. Kon-sumsi susu masyarakat Indonesia dari 6,8 liter per tahun, pada tahun 2005 meningkat menjadi 7,7 liter per tahun pada tahun 2008 (se-tara dengan 25 gram per hari) (Dirjen Bina Produksi Peternakan, 2008).

Peningkatan konsumsi susu tidak diikuti dengan tersedianya pasokan susu dari dalam negeri. Industri susu di Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan susu nasional sekitar 39,8% dari permintaan yang ada, dan sisa kebutuhan susu 60,2% masih dipenuhi oleh susu impor (Setyawan dkk., 2005). Produksi susu di Indonesia tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 15%. Penurunan produksi susu tersebut salah satunya disebabkan oleh produktivitas sapi perah yang rendah (Dirjen PPHP, 2014).

Produksi susu adalah bagian dari re-produksi karena mekanisme pembentukan susu seperti mammogenesis, laktogenesis dan galaktopoesis terjadi setelah sapi induk bereproduksi. Bobot badan juga berpengaruh terhadap reproduksi ternak seperti kesuburan, kebuntingan, proses kelahiran dan laktasi (Susilorini dkk., 2007). Apabila ternak mempunyai bobot badan yang melebihi bobot badan yang ideal, ternak tersebut akan mengalami penurunan produktivitas dan penya-

kit metabolisme lainnya, sebaliknya apabila ternak memiliki bobot badan kurang dari bobot badan ideal akan berdampak pada sistem reproduksinya (Budiawan dkk., 2015). Faktor lingkungan yang memberikan kontribusi terhadap produksi susu yang dihasilkan sapi perah salah satunya adalah pakan (Mukhtar, 2006). *Body Condition Score* adalah metode pengukuran terhadap keefektifan sistem pemberian pakan pada sapi perah, tujuannya adalah untuk mengetahui pencapaian standar kecukupan cadangan lemak tubuh yang akan mempengaruhi efisiensi reproduksi, sedangkan efisiensi reproduksi sapi perah akan berpengaruh terhadap produksi susu (Sarjowardojo dan Sarwiyono., 2013).

Produksi susu pada Body Condition Score (BCS) yang ideal dalam hasil pene-litiannya adalah kurang lebih 20,16 liter per hari yang menggunakan sistem penilaian BCS 1 sampai dengan 5 (Komala., 2015). Kondisi BCS yang ideal menghasilkan produksi susu yang optimal, namun kenyataan yang ada di peternakan sapi perah terdapat BCS yang kurang dari ideal dan melebihi ideal, sehingga untuk memperoleh tingkat produksi susu yang optimal diperlukan penilain BCS yang sesuai. Kuantitas dan kualitas susu yang rendah pada sapi perah diakibatkan pemberian

pakan nutrisi yang dibutuhkan ternak untuk memproduksi susu kurang maksimal, dan juga pakan yang berlebih dapat mempengaruhi hasil produksi susu yang dihasilkan (Syarifuddin, 2017). Hal tersebut telah menjadi masalah selama ini. Keadaan ini diperkirakan sebagai akibat dari adanya keterbatasan pengetahuan peternak dalam menentukan BCS yang ideal dalam menghasilkan produksi susu yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian mengenai produksi susu pada sapi perah Friesian Holstein (FH) berdasarkan perbedaan *Body Condition Score* (BCS). Diharapkan data yang diperoleh dapat menjadi indikator peningkatan produksi pada periode selanjutnya.

Materi dan Metode

Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di peternak kemitraan PT Greenfields Indonesia di wilayah kecamatan Wagir, kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2017. Materi yang digunakan adalah pengambilan data catatan reproduksi yang berasal dari sampel sapi Friesian Holstein.

Penelitian menggunakan metode survei. Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan serta wawancara secara langsung dengan peternak dengan cara memberikan kuisioner. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari catatan reproduksi dengan metode pengambilan sampel dengan sengaja (*purposive random sampling*) yaitu data ternak sapi perah yang telah produktif atau sudah pernah beranak. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan BCS kurang dari 5, BCS 5 sampai 6, dan BCS lebih dari 6. Pada masing-masing kelompok dilakukan pengambilan 10 sapi secara acak untuk diukur BCS dan produksi susunya.

Produksi Susu Harian

Produksi susu yang dihasilkan dilakukan melalui pemerahan pada pagi hari dan sore hari. Rata-rata produksi susu per hari berdasarkan catatan peternak, yaitu rata-rata selama masa laktasi

***Body Condition Score* (BCS)**

Pengukuran BCS dilakukan pada pertengahan laktasi. Evaluasi dengan BCS efektif untuk mengukur sejumlah energi metabolik yang disimpan sebagai lemak subkutan dan otot pada ternak. *Body Condition Scoring* (BCS) atau skor kondisi tubuh merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kegemukan seekor ternak sapi (Gafar, 2007). Kisaran angka untuk menilai yaitu 1-9, berdasarkan bentuk dan konformasi tubuh. Nilai kondisi tubuh yang didasarkan pada estimasi visual timbunan lemak tubuh di bawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang punggung, tulang rusuk dan pinggul. Seekor sapi dalam kondisi 'kurus' (BCS 1-4) berbentuk sudut dan tulang dengan sedikit lemak di tulang punggung, tulang rusuk, kait, dan pin. Tidak ada lemak yang terlihat di sekitar kepala ekor atau Sandung lamur. Sapi dalam kondisi 'ideal' (BCS 5-7) memiliki penampakan keseluruhan yang baik. Sapi dengan BCS 6 atau 7 terlihat berdaging dan tulang rusuk tidak lagi terlihat. Dan juga terdapat lemak di sekitar kepala ekor dan di Sandung lamur. Sapi dengan BCS 8 sampai 9 yang terlalu gemuk dan berotot dengan struktur tulang yang tersembunyi dari pandangan atau sentuhan (Ensminger dan Tyler, 2006).

Analisis Data

Data dalam penelitian ini disusun dalam tabel rataan dan simpangan baku. Untuk menguji hubungan antara BCS terhadap produksi susu sapi perah maka dilakukan dengan analisis regresi. BCS berfungsi sebagai variabel bebas sedangkan variabel terikat adalah produksi susu sapi perah Friesian Holstein (FH). Uji untuk mengetahui linearitasnya menggunakan analisis *one way Analysis Of Variance* (*one-way ANOVA*)

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui rata-rata produksi susu sapi perah Friesian Holstein (FH) antara BCS 3 sampai 4, BCS 5 sampai 6 dan BCS 7 sampai 8 berbeda (Lampiran 4). *Body Condition Score* (BCS) dengan produksi susu sapi perah Friesian Holstein (FH) terdapat hubungan kuadrat sebesar 20,6% artinya sebanyak 20,6 % perubahan produksi susu disebabkan oleh *Body Condition Score* (BCS). Analisis regresi dapat dilihat dalam Lampiran 3. Antara *Body Condition Score*

(BCS) dengan produksi susu yang dihasilkan terdapat perbedaan yang nyata ($p < 0.05$) Rata-rata produksi susu disajikan pada Tabel 1.

Hubungan tersebut ditunjukkan secara matematis hubungan antara *Body Condition Score* (BCS) dengan produksi susu sapi perah Friesian Holstein (FH) ditunjukkan dengan persamaan :

$$Y = 6.62 + 5.54x - 5.78x^2$$

Keterangan :

Y= Produksi susu sapi perah

X= Body condition Score (BCS)

Produksi susu pada sapi perah Friesian Holstein (FH) akan terjadi peningkatan pada setiap kenaikan *Body Condition Score* (BCS). Produksi susu akan mengalami penurunan setelah *Body Condition Score* (BCS) berada pada titik tertentu yaitu setelah BCS 6. Sedangkan pada BCS yang kurang dari ideal akan terjadi produksi susu yang kurang


optimal. Kurva hubungan antara BCS dengan produksi susu digambarkan menggunakan *curve expert* 1.4 dapat dilihat pada gambar 1. *Body Condition Score* (BCS) dengan produksi susu sapi perah Friesian Holstein (FH) terdapat hubungan kuadrat sebesar 20,6% artinya sebanyak 20.6 % perubahan produksi susu disebabkan oleh *Body Condition Score* (BCS). Produksi susu pada sapi perah Friesian Holstein (FH) akan terjadi peningkatan pada *Body Condition Score* (BCS) yang ideal. Produksi susu akan mengalami penurunan setelah BCS berada pada titik tertentu yaitu setelah BCS 6. Sedangkan pada BCS yang kurang dari ideal akan terjadi produksi susu yang kurang optimal.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa sapi perah dengan BCS kurang dari ideal (3-4) memproduksi susu kurang optimal, pada sapi perah dengan BCS ideal (5-6) produksi

Tabel 1. Rata-rata produksi susu pada sapi perah dikemitraan PT Greenfield berdasarkan pengelompokan BCS.

Perlakuan	Produksi susu \pm SD (liter/hari)
BCS 3 – 4	20,20 ^a \pm 3,85
BCS 5 – 6	20,90 ^a \pm 7,37
BCS 7 – 8	15,60 ^b \pm 1,34

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang menunjukkan perbedaan yang nyata ($p < 0.05$)



Gambar 1. Grafik Rata-rata Produksi Susu Sapi Perah Friesian Holstein (FH) berdasarkan perbedaan BCS.

susu tinggi sedangkan pada sapi perah dengan BCS melebihi ideal (7-8) produksi susu yang dihasilkan sangat rendah. Penelitian sebelumnya, juga menyatakan bahwa Body Condition Score yang ideal menghasilkan produksi susu yang optimal sekitar 18,49 liter per hari dibanding dengan BCS kurang ideal maupun melebihi ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tubuh sapi dewasa yang ideal berkaitan erat dengan produksi susu optimal. Sapi dewasa yang berada pada kondisi tubuh terlalu gemuk atau terlalu kurus akan menurunkan produksi susu (Sukandar dkk., 2009).

Pengaruh *Body Condition Score* (BCS) terhadap produksi susu yang dihasilkan oleh sapi perah pada penelitian ini menunjukkan nilai *Body Condition Score* (BCS) yang ideal menghasilkan produksi susu yang optimal. Hal ini disebabkan karena kenyataan di wilayah kemitraan yang menunjukkan BCS rata-rata hewan ternaknya berada di kisaran 5 dan 6. Nilai BCS 5 dan 6 menggambarkan sudah baiknya tampilan produktivitas di wilayah tersebut yang artinya nutrisi yang diberikan untuk ternak sapi di daerah tersebut sudah tercukupi.

Tubuh yang kurus menandakan bahwa ternak tersebut kekurangan pakan dan menyebabkan terlambat birahi pada ternak akibat kerja fisiologis dalam tubuh yang kurang baik (Suharto, 2003). Sapi perah yang sedang laktasi akan memerlukan protein yang tinggi, hal ini dikarenakan sapi terus menerus mensekresikan protein dalam bentuk susu. Sehingga perlu pakan dengan kandungan nutrisi yang baik untuk memenuhi kebutuhan pokok ternak itu sendiri dan produksi (Yusuf, 2000).

Energi tubuh yang cukup, digunakan untuk memproduksi Luteinizing Hormone (LH), yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel (mengaktifkan fungsi ovarium) sehingga terjadi estrus post-partus. Dengan kata lain apabila cadangan energi rendah maka estrus post-partus akan lama sehingga mengganggu produktivitas sapi perah (Budiawan, 2015). Sejumlah cadangan lemak tubuh dikumpulkan saat awal laktasi yang menurunkan cadangan lemak tubuh selama satu sampai dua minggu setelah beranak, sampai pengembalian kondisi tubuh terjadi. Perubahan BCS akan mempengaruhi puncak produksi susu dan bentuk kurva produksi susu (Domeq, dkk. 1997).

Kegemukan pada sapi dapat menyebabkan penimbunan lemak pada saluran reproduksi terutama ovarium yang dapat menyebabkan gangguan siklus birahi pada sapi perah. Akibat lain yang dapat ditimbulkan dari kegemukan adalah tingkat kebuntingan yang rendah, distokia, abortus, dan retensio secundinae. Hal tersebut dapat mengganggu siklus reproduksi pada sapi perah akibatnya produksi susu yang dihasilkan juga akan berkurang (Bearden *et al*, 2004). Kegemukan pada sapi perah tidak akan meningkatkan produktivitas tetapi akan meningkatkan penyakit metabolisme dan gangguan reproduksi pada sapi perah. Oleh karena itu, BCS dapat digunakan untuk memonitoring sejumlah cadangan lemak tubuh selanjutnya dapat dipakai untuk menduga keseimbangan energi sapi laktasi. (Mao, dkk. 2004).

Jadi, terdapat hubungan antara *Body Condition Score* (BCS) dengan produksi susu sapi perah Freisian Holstein (FH) berdasarkan kelompok *Body Condition Score* (BCS). Semakin tinggi nilai BCS maka produksi susu semakin menurun. Pada BCS yang rendah produksi susu yang dihasilkan juga kurang maksimal. Namun pada BCS yang ideal (BCS 5 sampai 6) produksi susu yang dihasilkan optimal.

Kesimpulan

Produksi susu tidak meningkat atau mengalami penurunan pada titik tertentu yaitu pada BCS lebih dari 6 (7-8). Pada BCS kurang dari ideal (BCS 3 – 4) produksi susu yang dihasilkan kurang optimal dibanding dengan BCS yang ideal (5 - 6). Semakin tinggi nilai *Body Condition Score* (BCS) maka produksi susu yang dihasilkan sapi perah tersebut akan semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bearden, J.H and S.T. Willard. 2004. Applied Animal., J.W. Fuquay, Reproduction. 6th Ed. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River. New Jersey.
- Budiawan A., M.N. Ihsan dan Wahjuningsih S. 2015. Hubungan Body Condition Score Terhadap Service Per Conception dan Calving Interval Sapi Potong Peranakan Ongole di Kecamatan Barat Kabupa-ten Lamongan. Jurnal Tropical animal Husbandry. 16(1): 34-40.
- Dirjen Bina Produksi Peternakan. 2008. Statistik Produksi Ternak Direktorat

- Jendral Bina Produksi Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Domeq, J.J., A.L. Skidmore, J.W. Lloid and J.B. Kaneene. 1997. Relationship between body condition score and milk yield in a large dairy herd of high yielding Holstein cows. *J. Dairy Sci.* 80: 101 – 112.
- Ensminger, M. E. dan H.D. Tyler. 2006 *Dairy Cattle Science*. 4th Ed. Danville. The Interstate Printers and Publisher, Inc. 54-63.
- Gafar I.B. 2007. Diktat Ilmu Tilik Sapi Potong. Fakultas Peternakan Universitas Udayana, Denpasar. 102-105.
- Irawan, F. 2010. Korelasi Produksi Susu dengan Status Fisiologis Sapi FH (Fries Holland) pada Saat Laktasi di UPTD Ruminansia Besar Dinas Peternakan Kabupaten Kampar [Skripsi] Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Uni-versitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru.
- Komala I., I.Arifiantini, C.Sumantri dan L.I.T.A. Tumbelaka. 2015. Hubungan Produksi Susu Berdasarkan Grade MPPA dengan Performa Reproduksi. 3(1): 33-39.
- Mao I.L., K. Sloniewski, P. Madsen, J.Jensen. 2004. Change In Body Condition Score An In Its Genetic Variation During Lactation. *J. Liv. Prod Sci.* 89: 55–65.
- Mukhtar A, 2006. Ilmu Produksi Ternak Perah. Surakarta LPP UNS dan UNS Press. Surakarta. 56-63.
- Sarjowardojo P., dan Sarwiyono. 2013. Pengaruh Body Condition Score Sapi Perah Friesian Holstein Bunting Tua terhadap Jumlah dan Kadar Protein Kolostrum. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
- Setyawan, H., S. I. Santoso dan Mukson. 2005. Analisa Finansial Usaha Peternakan Sapi Perah pada Tingkat Perusahaan Peternakan. *J. Animal Production* 7(1): 40-45.
- Suharto, K.2003. Penampilan Potensi Reproduksi Sapi Perah Freisian Holstein Akibat Pemberian Kualitas Ransum Berbeda dan Infusi Larutan Iodium Povidon 1% Intra Uterin. Tesis Program Studi Magistter Ilmu Ternak Universitas Diponegoro. Semarang.