

ABSTRAK

Rangga Bagus Logistiko Bramasta

Email : ramleey2017@gmail.com

Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Surabaya

Pendahuluan Defisit Perawatan Diri Merupakan bentuk dari gejala yang sering dialami oleh klien dengan Skizofrenia, gejala yang paling sering timbul adalah kehilangan kemauan, pada gangguan negatifnya skizofrenia berupa defisit perawatan diri. **Metode** penelitian yang digunakan yakni studi kasus dengan melakukan asuhan keperawatan meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian berfokus pada penerapan Strategi Pelaksanaan (SP) pada kedua klien dengan diagnosa skizofrenia dengan masalah defisit perawatan diri di Puskesmas Nelayan Gresik. **Hasil** dari penelitian pada kedua klien defisit perawatan diri selama diberikan tindakan keperawatan menggunakan terapi generalis, timbul beberapa perbedaan diantara kedua klien dari kriteria hasil yang dicapai, pada klien 1 masalah lebih cepat teratasi namun pada klien terdapat hambatan komunikasi yang menyebabkan sulit tercapainya SP yang diberikan pada klien. **Simpulan** Evaluasi yang didapatkan penulis setelah dilakukan tindakan terapi generalis pada kasus pertama dapat teratasi sampai tiga hari dengan tiga kali pertemuan. sedangkan pada klien 2 setelah dilakukan terapi generalis selama tiga hari, klien hanya sampai pada SP 1 binahubungan saling percaya dan mulai sanggup untuk memulai tindakan mandi dalam perawatan diri. Dari dilakukannya tindakan tersebut hal yang perlu diperhatikan yakni, klien butuh bantuan motivasi dari keluarga agar klien menjadi lebih sering dan lebih terjamin keberhasilan perawatan klien defisit perawatan defisit perawatan diri.

Kata Kunci : Skizofrenia, Gangguan Penurunan Kemauan, Defisit Perawatan Diri

ABSTRACT

Rangga Bagus Logistiko Bramasta

Email : ramleey2017@gmail.com

Program Studi Diploma III Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Surabaya

Introduction Self-Care Deficit Is a form of symptom that is often experienced by clients with schizophrenia, the most common symptom is loss of will, the negative disorder of schizophrenia is self-care deficit. The research **Method** used is a case study by conducting nursing care including assessment, diagnosis, intervention, implementation, and evaluation. The research subject focuses on the implementation of the Implementation Strategy (SP) on both clients with a diagnosis of schizophrenia with self-care deficit problems at the Gresik Nelayan Health Center. **The results** of the research on both clients of self-care deficits while being given nursing actions using generalist therapy, some differences arise between the two clients from the criteria for the results achieved, on client 1 the problem is resolved more quickly but on the client there are communication barriers that make it difficult to achieve the SP given to the client. **Conclusion** **The evaluation** obtained by the author after the generalist treatment was carried out in the first case could be resolved in three days with three meetings. while on client 2 after general therapy for three days, the client only arrived at SP 1 of mutual trust and began to be able to start bathing in self-care. From doing these actions, the thing that needs to be considered is that the client needs motivational assistance from the family so that the client becomes more frequent and more assured of successful treatment of the client's self-care deficit.

Kata Kunci : Schizophrenia, Impaired Willpower, Self-Care Deficit