

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN DENGAN MASALAH RISIKO PERFUSI SEREBRAL TIDAK EFEKTIF PADA DIAGNOSA MEDIS CVA DI RUANG EDELWEIS RSUD IBNU SINA GRESIK

Penelitian Studi Kasus di Wilayah Kerja RSUD Ibnu Sina Gresik

Oleh: Anisa Firda Afina

Pendahuluan: *cerebrovascular accident* (CVA) adalah kondisi kedaruratan ketika terjadi defisit neurologis akibat dari penurunan tiba-tiba aliran darah ke area otak yang terokalisasi. CVA dapat iskemik (ketika suplai darah ke bagian otak tiba-tiba terganggu oleh trombus, embolus, atau stenosis pembuluh darah), atau hemoragik (ketika pembuluh darah mengalami ruptur, darah meluber kedalam ruang di sekitar neuron). Peningkatan tekanan darah yang abnormal seringkali ditemukan pada pasien *cerebrovascular accident* (CVA). **Metode:** penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan. Subjek pada penelitian ini berjumlah 5 pasien CVA dengan masalah keperawatan risiko perfusi serebral tidak efektif di Ruang Edelweis RSUD Ibnu Sina Gresik. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. **Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian pada lima klien ditemukan diagnosa keperawatan risiko perfusi serebral tidak efektif ditandai dengan Hipertensi. Pada 5 klien ditemukan perbedaan dari keluhan maupun hasil evaluasi antara 3 klien dan 2 klien. 3 klien memiliki keluhan utama sakit kepala dan 2 klien mengalami penurunan kesadaran. **Diskusi:** Adanya faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan asuhan keperawatan dengan masalah risiko perfusi serebral tidak efektif yaitu dengan mengatur posisi kepala pasien pada posisi headup 30°.

Kata kunci: CVA, Risiko Perfusi Serebral Tidak Efektif

ABSTRACT

NURSING CARE OF PATIENTS WITH PROBLEMS OF CEREBRAL PERFUSION RISK IN EFFECTIVE CVA MEDICAL DIAGNOSIS IN THE ROOM EDELWEIS IBNU SINA GRESIK

Reaserch On Case in the Working Area of RSUD Ibnu Sina Gresik

By: Anisa Firda Afina

Introduction: Cerebrovascular accident (CVA) is an emergency condition when a neurological deficit occurs as a result of a sudden decrease in blood flow to a localized area of the brain. CVA can be ischemic (when the blood supply to part of the brain is suddenly interrupted by a thrombus, embolus, or stenosis of a blood vessel), or hemorrhagic (when a blood vessel ruptures, blood overflows into the space around the neuron). An abnormal increase in blood pressure is often found in cerebrovascular accident (CVA) patients. **Methods:** The research design used in this case study is descriptive research, namely clients who experience CVA with problems at risk of ineffective cerebral perfusion in the Edelweiss Room of RSUD Ibnu Sina Gresik. The number of research subjects were 5 clients with nursing problems and the same medical diagnosis. **Results:** Based on the results of the study on five clients, it was found that the nursing diagnosis of cerebra perfusion risk was ineffective, characterized by hypertension. On 5 clients found differences in complaints and evaluation result between 3 clients and 2 clients. 3 clients had a chief complaint of headache and 2 clients had decreased consciousness. **Discussion:** There are factors that can affect the success of nursing care with the problem of ineffective cerebral perfusion risk, namely by adjusting the patient's head position in a 30° head-up position.

Keywords: CVA, Risk of Ineffective Cerebral Perfusion