


Volume: 2, Nomor: 2, Oktober 2019

p-ISSN: 2615-7497, e-ISSN: 2581-012X

JURNAL MEDIK VETERINER

Tersertifikasi oleh Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia dengan Nomor: 28/E/KPT/2019, berlaku sejak 26 September 2019



Indonesian Journal of Veterinary Medicine, 2019, 2(2): 1-10.



KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
dengan
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
(PDH)



[HOME](#)[ABOUT](#)[LOGIN](#)[REGIS](#)

Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah

Universitas Airlangga

copyright © 2017 Template PPJPI

[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Faisal Fikri, drh., M.Vet., (SCOPUS ID: 57214252104), Universitas Airlangga, Indonesia

EDITORIAL ASSISTANT

Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, drh., M.Si., (SCOPUS ID: 57207820067), Universitas Airlangga, Indonesia

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dr. Shekhar Chhetri, DVM, M.Sc., (SCOPUS ID: 6505691555), Royal University of Bhutan, Bhutan
Agus Purnomo, drh., M.Sc., (SCOPUS ID: 57213936338), Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Etsuko Hashimoto, DVM., (SCOPUS ID: 36894155900), Azabu University, Japan
Ahmad Kurniawan, drh., (SCOPUS ID: 57210255339), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Indonesia
Parthiban Sivamurthy, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 6503892550), Tamilnadu Veterinary and Animal Science University, India

Lalu Faisal Fajri, drh., M.Vet., BP3TR Disnakeswan Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Assylkhanov Darkhan, DVM., Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan

Ali Ahmad Alsahami, DVM., MVM., (SCOPUS ID: 57216196150), Universiti Putra Malaysia, Malaysia

Syakirah Azmey, DVM., M.Sc., (SCOPUS ID: 57215684050), Universiti Brunei Darussalam, Brunei Darussalam

ADMINISTRATION AND INFORMATION SYSTEM

Choirun Nisa, SIIP., Center of Library and Information System, Universitas Airlangga, Indonesia

JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:



Editorial Office

Jurnal Medik Veteriner

Kampus PSDKU Banyuwangi Universitas Airlangga
Jalan Wijaya Kusuma No.113, Giri, Banyuwangi, 68425
Email: jmv@psdku.unair.ac.id
Telp: 0333-417788



pISSN 2615-7497 ; eISSN 2581-012X



[View My Stats](#)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

Plagiarism Detection



USER

Username Password Remember me

CITATION ANALYSIS

Cited by SCOPUS

Cited by Google Scholar

Semua Sejak 2015

Kutipan 82 82

indeks-h 5 5

indeks-i10 1 1

NOTIFICATIONS

[View](#)[Subscribe](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

[By Issue](#)[By Author](#)[By Title](#)[Other Journals](#)

INFORMATION

[For Readers](#)[For Authors](#)[For Librarians](#)

KEYWORDS

Banyuwangi

Escherichia coli Newcastle Disease Peranakan Etawah anjing ayam buras before freezing helminthiasis kambing Sapera kepadatan kolagen kolagen kolesterol kualitas spermatozoa luka bakar mencit penyembuhan luka prevalensi probiotik sapi perah susu skim kuning telur tris kuning telur

FLAG COUNTER

Visitors

| | | | |
|--|---------|--|----|
| | 20, 201 | | 52 |
| | 1, 920 | | 34 |
| | 108 | | 25 |
| | 64 | | 25 |
| | 54 | | 24 |

Pageviews: 88, 759





HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS

Home > Archives > Vol 2, No 2 (2019)

VOL 2, NO 2 (2019)

OKTOBER

TABLE OF CONTENTS

FRONT MATTER

Front Cover, Editorial Board, Peer Reviewers, Acknowledgments
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

PDF
I-IV

BACK MATTER

Indexing, Subscribed Form, Guidelines for Author, Back Cover
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

PDF
V-IX

ORIGINAL RESEARCH

Deteksi Mastitis Subklinis Pada Kambing Peranakan Etawah di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi

PDF
72-75

doi: 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.72-75

Adelita Putri Sevitarsari, Mustofa Helmi Effendi, Prima Ayu Wibawati

Isolasi dan Identifikasi Staphylococcus aureus pada Susu Kambing Peranakan Etawah Penderita Mastitis Subklinis di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi

PDF
76-82

doi: 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.76-82

Laila Nur Hayati, Wiwiek Tyasningsih, Ratih Novita Praja, Sri Chusniati, Maya Nurwartanti Yunita, Prima Ayu Wibawati

Isolasi dan Identifikasi Salmonella pada Daging Sapi di Rumah Potong Hewan Banyuwangi

PDF
83-88

doi: 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.83-88

Dwi Putri Indriyani, Wiwiek Tyasningsih, Ratih Novita Praja

Isolasi dan Identifikasi Aeromonas hydrophila pada Ikan Lele (Clarias gariepinus) Pertambakan Muara Jambi, Provinsi Jambi

PDF
89-95

doi: 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.89-95

Titis Wulandari, Agustin Indrawati, Fachriyan Hasmi Pasaribu

Deteksi Helminthiasis pada Kuda di Kelompok Kesenian Jaran Kencak Desa Patoman, Banyuwangi

PDF
96-100

doi: 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.96-100

Nadya Amanda Chaerunissa, Vivi Oktaviana, Agus Sunarso, Aditya Yudhana, Kusnoto Kusnoto

Pengaruh Perbedaan Waktu Ekuilibrasi Sebelum Pembekuan Terhadap Kualitas Spermatozoa Sapi Rambon Banyuwangi Menggunakan Pengencer Tris Kuning Telur

PDF
101-107

doi: 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.101-107

Firman Setyawan, Tri Wahyu Suprayogi, Ragil Angga Prastiya, Tjuk Imam Restiadi, Amung Logam Saputro, Bodhi Agustono

Prevalensi Haemonchiasis Pada Kambing Peranakan Etawah di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi

PDF
108-111

Policies

Focus and Scope

Online Submission

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Ethics

Copyright Notice

Publication Frequency

Open Access Policy

Archiving

Plagiarism Screening

Publication Fee

People

Editorial Board

Peer Reviewers

Contact

Professional Collaboration



Agreement Document

Template



Reference Management Tools



doi 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.108-111

Khoirul Arifin, Kusnoto Kusnoto, Aditya Yudhana, Agus Sunarso, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Ratih Novita Praja

Deteksi Residu Antibiotik Oksitetrasiklin pada Susu Kambing Peranakan Etawah di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi dengan Uji BioassayPDF
112-118**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.112-118

Ratna Ajeng Prameswari, Suryanie Sarudji, Ratih Novita Praja, Wiwiek Tyasningsih, Maya Nurwartanti Yunita, Aditya Yudhana

Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) Secara Topikal Efektif pada Kepadatan Kolagen Masa Penyembuhan Luka Insisi Tikus PutihPDF
119-126**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.119-126

Ricky Eka Sucita, Iwan Sahrial Hamid, Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama

Efek Antidiabetik Ekstrak Daun Gendola (Basella rubra L.) Terhadap Kadar Gula Darah Tikus PutihPDF
127-132**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.127-132

Angelica Diana Vita, Nurmawati Fatimah, Sri Murtiwi

Pengukuran Kadar Hormon Progesteron dan Deteksi Birahi pada Sapi Perah yang Disinkronisasi dengan CIDR (Controlled Internal Drug Release)PDF
133-139**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.133-139

Oky Setyo Widodo, Pudji Srianto, Shelly Wulandari

CASE REPORT

Laporan Kasus: Amblyomma sp. pada Ular Sanca Kembang (Python reticulatus) di Banyuwangi Reptile CommunityPDF
140-144**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.140-144

Wahyu Dwi Katmono, Shabrina Fauzia Prayoga, Vivi Oktaviana, Faisal Fikri

Laporan Kasus: Tindakan Enukleasi Bulbi Akibat Ophtal Myasis pada Anjing PomeranianPDF
145-151**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.145-151

Suryaningrum Suryaningrum, Faisal Fikri

Laporan Kasus: Infeksi Cacing Oxyuris spp. pada Iguana Hijau (Iguana iguana)PDF
152-157**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.152-157

Vivi Oktaviana, Aditya Yudhana, Nadya Amanda

Case Report: Canine Toxication Food AllergicPDF
158-161**doi** 10.20473/jmv.vol2.iss2.2019.158-161

Albiruni Haryo

JURNAL MEDIK VETERINER (JMV) INDEXED BY:



Editorial Office

Plagiarism Detection



USER

Username Password Remember me

Login

CITATION ANALYSIS

Cited by SCOPUS

Cited by Google Scholar

Semua Sejak 2015

Kutipan 82 82

indeks-h 5 5

indeks-i10 1 1

NOTIFICATIONS

View

Subscribe

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

KEYWORDS

Banyuwangi

Escherichia coli Newcastle Disease Peranakan Etawah anjing ayam buras before freezing helminthiasis kambing Saperap kepadatan kolagen kolagen kolesterol kualitas spermatozoa luka bakar menciit penyembuhan luka prevalensi probiotik sapi perah susu skim kuning telur tris kuning telur

FLAG COUNTER

Visitors

| | | | |
|--|--------|--|----|
| | 20,201 | | 52 |
| | 1,920 | | 34 |
| | 108 | | 25 |
| | 64 | | 25 |
| | 54 | | 24 |

Pageviews: 88,759

FLAG counter

CURRENT ISSUE

Deteksi Residu Antibiotik Oksitetrasiklin pada Susu Kambing Peranakan Etawah di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi dengan Uji Bioassay

Detection of Oxytetracycline Antibiotic Residues on Etawah Crossbreed Goat in Kalipuro Village, Banyuwangi with Bioassay Test

Ratna Ajeng Prameswari^{1*}, Suryanie Sarudji², Ratih Novita Praja², Wiwiek Tyasningsih², Maya Nurwartanti Yunita³, Aditya Yudhana⁴

¹Bachelor of Veterinary Medicine, ²Department of Veterinary Microbiology, ³Department of Veterinary Pathology, ⁴Department of Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga, UNAIR C- Campus Mulyorejo, Surabaya, East Java, Indonesia 60115
Telp. (031)5993016, Fax. (031)5993015
*Corresponding author: deepra.ajeng@gmail.com

Abstrak

Oksitetrasiklin diketahui sebagai salah satu antibiotik yang sering digunakan dalam menangani kasus mastitis pada hewan ternak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk mengetahui ada atau tidaknya residu oksitetrasiklin pada susu kambing Peranakan Etawah (PE) di Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi. Sampel susu di koleksi kemudian dilakukan pengujian residu antibiotik dengan metode uji bioassay menggunakan bakteri standar *Bacillus cereus* ATCC 11778. Penelitian yang dilakukan pada 26 sampel susu yang di ambil secara acak berasal dari ternak kambing perah PE di dapatkan hasil yang negatif. Hal ini di tunjukkan dengan tidak terbentuknya zona hambat di sekitar well yang diisi sampel susu. Berbeda dengan kontrol positif oksitetrasiklin dengan konsentrasi 1 µg/ml yang menghasilkan zona hambatan sekitar 18 mm. Dapat disimpulkan bahwa 100% dari 26 jumlah sampel susu kambing PE yang di ambil secara acak dan di periksa dari Kelurahan Kalipuro, Banyuwangi tidak mengandung residu antibiotik oksitetrasiklin.

Kata kunci: oksitetrasiklin, Peranakan Etawah, residu antibiotik, susu kambing, uji bioassay

Abstract

*Oxytetracycline are known as one of the antibiotics that are often used in handling mastitis cases in livestock. This study was a descriptive study to determine the presence or absence of oxytetracycline residues in the milk of Etawah crossbreed (PE) goats in Kalipuro Village, Banyuwangi. The milk samples in the collection were then tested for antibiotic residues using the bioassay screening method using the standard bacterium *Bacillus cereus* ATCC 11778. Research conducted on 26 milk samples taken randomly from PE were obtained negative results. This is indicated by the absence of inhibition zones around the well filled with milk samples. In contrast to positive oxytetracycline control with a concentration of 1 µg/ml which produces a zone of resistance of about 18 mm. It can be concluded that the samples of PE goat milk taken randomly in Kalipuro village, Banyuwangi were not contain antibiotic residues, especially oxytetracycline antibiotics.*

Key words: antibiotic residue, bioassay test, Etawah crossbreed, goat's milk, oxytetracycline

Received: 19 April 2019

Revised: 29 Mei 2019

Accepted: 14 Juli 2019

PENDAHULUAN

Residu antibiotika merupakan senyawa asal dan atau metabolitnya yang terdapat dalam jaringan produk hewani dan termasuk juga hasil uraian lainnya dari suatu antibiotika. Residu

antibiotika berbahaya apabila ditinjau dari sisi kesehatan manusia, selain itu juga memberikan dampak terhadap beberapa produk hasil olahan susu tertentu. Bahaya potensial residu antibiotika yang terkandung dalam pangan asal hewan secara umum dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu

aspek toksikologis, aspek mikrobiologis, dan aspek imunopatologis. Residu antibiotik ditinjau dari sisi teknologi pengolahan produk hewan terutama susu, yaitu adanya residu antibiotika dapat menghambat proses fermentasi yang menggunakan mikroba dalam pengolahannya (Ningrum, 2011). Batas maksimum residu yang telah ditetapkan oleh SNI (2000) tentang batas cemaran dan residu antibiotika pada susu yaitu 0.05 mg/kg.

Residu antibiotika termasuk salah satu bahaya kimia yang menjadi permasalahan dalam mewujudkan produk hewan yang berkualitas tinggi. Produk hewan yang baik akan memiliki nilai jual atau ekonomi yang lebih tinggi dan mampu bersaing dalam dunia perdagangan secara luas. Produk hewan termasuk susu saat ini merupakan bahan makanan bergizi tinggi yang dikonsumsi tidak lagi terbatas pada jumlah atau kuantitas, tetapi juga lebih mempertimbangkan aspek mutu atau kualitasnya (Dewi dkk, 2014). Aspek kesehatan hewan dalam pemanfaatan sumber daya ternak lokal juga menjadi tidak kalah penting mengingat penyakit pada hewan dapat ditularkan ke manusia melalui konsumsi susu dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap susu semakin tinggi (Suwito dkk., 2014).

Susu dapat mengandung residu antibiotik diperkirakan sebagai akibat pengobatan pada hewan yang mengalami penyakit mastitis. Hal ini disebabkan karena prevalensi kasus mastitis masih sangat tinggi di Indonesia. Mastitis disebabkan oleh beberapa kuman yang terkait dengan sanitasi kandang maupun kondisi ternak yang kurang baik (Bahri dkk, 2005). Adanya residu antibiotika ini dapat meningkatkan bahaya resistensi bakteri, yang dapat terjadi pada intestinal manusia dalam jangka waktu tertentu. Ketidakseimbangan mikrobiota yang terjadi, dapat mengarah pada terjadinya proliferasi dari bakteri berbahaya dan patogen oportunistik. Kejadian yang lebih buruk yaitu apabila bakteri dalam usus telah resisten, kemudian berkembang biak dengan jumlah yang cukup banyak, maka penyakit-penyakit yang disebabkan karena bakteri tersebut akan dapat menyebabkan kematian karena tidak dapat diobati (Ben, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah uji bioassay yang bersifat deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah susu kambing Peranakan Etawah (PE) yang berasal dari Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi sejumlah 26 sampel. Sampel kemudian dibawa untuk dilakukan uji lebih lanjut di Laboratorium Instrument PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi.

Pelaksanaan pengujian dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan yang telah dilakukan proses sterilisasi menggunakan metode sterilisasi basah (autoklaf) maupun sterilisasi kering (oven). Selain alat dan bahan perlu juga disiapkan kultur bakteri *Bacillus cereus* ATCC 11778 sebagai bakteri standar pengujian residu antibiotik secara Bioassay (SNI, 2000). Pada penelitian ini bakteri yang digunakan berasal dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Bakteri tersebut telah dibuat suspensi dengan konsentrasi standar bakteri untuk pengujian yaitu antara 10^5 - 10^8 sel. Tahap selanjutnya yaitu membuat media MHA berisi kultur bakteri pada cawan Petri dengan metode tuang. Setelah itu dibuatlah *well* atau sumuran pada cawan media. Kemudian setiap *well* diisi dengan larutan sampel sebanyak 100 μ l dengan menggunakan mikropipet. Lalu menempatkan masing – masing cawan Petri pada bidang datar dalam temperatur ruang selama satu jam. Setiap sampel minimal dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali (triplo). Kemudian diinkubasikan dalam inkubator bersuhu 30°C selama 16 jam sampai 18 jam (Pikeemat, 2009).

Keberadaan residu antibiotika diketahui dengan cara mengamati sampel uji setelah diinkubasikan selama 18 jam. Pengamatan berfokus pada ada atau tidaknya zona hambat pertumbuhan bakteri *Bacillus cereus* ATCC 11778 di sekitar *well* yang berisi sampel susu yang menandakan adanya residu antibiotik yang terkandung pada sampel susu.

Data yang diperoleh dari penelitian bersifat kualitatif. Hasil yang didapat disajikan dalam

bentuk tabel. Kemudian dihitung persentase keberadaan residu antibiotik oksitetrasiklin dari semua sampel yang diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan yaitu 100% dari 26 sampel susu kambing PE di kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi menunjukkan hasil negatif residu antibiotik oksitetrasiklin. Hal ini didapatkan berdasarkan pengamatan, yaitu tidak adanya zona hambat pertumbuhan bakteri *Bacillus cereus* ATCC 11778 sebagai bakteri standar pengujian residu antibiotik oksitetrasiklin pada sekeliling *well* yang berisi sampel susu. Hasil negatif juga didapatkan pada penelitian terdahulu mengenai residu antibiotik pada susu di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor (Detha, 2017).

Perbedaan yang sangat jelas terlihat antara sampel yang tidak terbentuk zona hambat, dengan kontrol positif oksitetrasiklin ($1\mu\text{g/ml}$). Zona hambatan yang dibentuk oleh kontrol positif dari penelitian ini yaitu memiliki diameter sebesar ± 18 mm.

Tabel 1 memuat data hasil pengamatan zona hambat yang terbentuk dari 26 sampel yang di ambil oleh peneliti. Dari data di atas dapat di ketahui bahwa semua sampel menunjukkan hasil yang negatif. Untuk kontrol positif yang menggunakan antibiotik oksitetrasiklin dengan konsentrasi $1\mu\text{g/ml}$ menunjukkan zona hambatan sebesar 18 mm (Gambar 1).

Residu antibiotik pada produk pangan asal hewan merupakan permasalahan yang tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi hampir di semua negara. Beberapa peneliti mengemukakan banyaknya penemuan residu antibiotik yang terdapat dalam bahan pangan, khususnya pangan asal hewan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya residu antibiotika dalam bahan pangan asal hewan. Antibiotik merupakan obat yang sering digunakan dalam bidang peternakan, termasuk hewan ternak penghasil susu. Residu antimikroba saat ini merupakan zat penghambat yang paling sering ditemukan dalam susu, memiliki efek yang tidak

diinginkan pada kualitas susu, teknologi pengolahan susu, kualitas produk olahan susu dan permasalahan kesehatan bagi manusia (Panigrahi *et al.*, 2017).

Upaya untuk menghindari risiko potensial yang terkait dengan residu obat pada makanan, kontrol kehadiran antibiotik dalam susu dan produk lain yang berasal dari hewan telah diatur secara hukum di beberapa negara. Pusat Administrasi Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk Medis Veteriner (*Food and Drug Administration Center for Veterinary Medicine*, United States), telah menetapkan toleransi jumlah keberadaan residu antibiotik dan tingkat aman residu antibiotik dalam susu untuk melindungi konsumen (Quintanilla *et al.*, 2019).


Indonesia menetapkan batasan minimum residu antibiotika sesuai dengan yang telah tercantum di dalam SNI-01-6366-2000. Batasan toleransi yang di izinkan terdapat dalam produk susu menurut SNI untuk antibiotik jenis oksitetrasiklin yaitu 0.05 mg/kg.

Oksitetrasiklin merupakan antibiotik golongan tetrasiklin dengan aktivitas spektrum luas, secara ekstensif digunakan dengan tujuan pengobatan pada manusia dan secara intensif digunakan dalam mendukung sistem peternakan dan budidaya perairan. Terapi yang efektif sesuai standar yang di tetapkan oleh NCCLS (*National Committee for Clinical Laboratory Standarts*) yaitu apabila penggunaan oksitetrasiklin dengan konsentrasi pada plasma diatas $4\mu\text{g/ml}$, untuk mencapai target bakteri tidak resisten pada oksitetrasiklin. Pada terapi dengan dosis 20 mg/kg, konsentrasi oksitetrasiklin maksimum pada serum dapat mencapai 4.10 $\mu\text{g/ml}$ untuk sapi, sedangkan untuk hewan lainnya puncak konsentrasi dan waktu paruh dari oksitetrasiklin di darah dapat dicapai 4-16 jam dan 21-63 jam setelah pemberian. Konsentrasi oksitetrasiklin pada plasma dapat terjaga pada ataupun diatas 0.5 $\mu\text{g/ml}$ (konsentrasi hambatan minimum) untuk kurang lebih selama 6 hari (Chi *et al.*, 2014).

Residu antibiotik masuk kedalam tubuh melalui sebuah mekanisme yang berhubungan dengan aktivitas absorpsi suatu antibiotika di dalam tubuh. Antibiotik masuk ke dalam tubuh

Tabel 1. Hasil pengamatan pengujian residu antibiotik oksitetrasiklin terhadap 26 sampel

| Nomor Sampel | Pengamatan | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|
| | Zona hambat (mm) | Keterangan |
| 1 | - | Negatif |
| 2 | - | Negatif |
| 3 | - | Negatif |
| 4 | - | Negatif |
| 5 | - | Negatif |
| 6 | - | Negatif |
| 7 | - | Negatif |
| 8 | - | Negatif |
| 9 | - | Negatif |
| 10 | - | Negatif |
| 11 | - | Negatif |
| 12 | - | Negatif |
| 13 | - | Negatif |
| 14 | - | Negatif |
| 15 | - | Negatif |
| 16 | - | Negatif |
| 17 | - | Negatif |
| 18 | - | Negatif |
| 19 | - | Negatif |
| 20 | - | Negatif |
| 21 | - | Negatif |
| 22 | - | Negatif |
| 23 | - | Negatif |
| 24 | - | Negatif |
| 25 | - | Negatif |
| 26 | - | Negatif |
| Kontrol + | 18 mm | Konsentrasi oksitetrasiklin 1µg/ml |
| Jumlah sampel positif | | 0/26 |



Gambar 1. Sampel susu setelah inkubasi dan kontrol positif oksitetrasiklin

hewan umumnya karena pernah dilakukan tindakan pengobatan terhadap hewan tersebut, untuk mengatasi suatu penyakit infeksi tertentu. Antibiotik yang masuk ke dalam tubuh akan di

metabolisme di dalam tubuh melalui ginjal maupun hepar. Antibiotik kemudian di distribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah dalam tubuh. Antibiotik oksitetrasiklin

merupakan antibiotik yang dapat dengan mudah di distribusikan ke hampir seluruh organ dan jaringan. Antibiotik golongan tetrasiklin termasuk oksitetrasiklin dapat didistribusikan melalui transplasenta, masuk pada sistem sirkulasi fetus dan dapat didistribusikan melalui susu. Konsentrasi antibiotik pada susu menunjukkan kadar yang lebih tinggi dibanding pada serum ketika kelenjar mammae atau ambing sedang mengalami inflamasi atau peradangan (Plumb, 2009; Pradika *et al.*, 2019).

Residu antibiotik yang masuk ke dalam tubuh akan berinteraksi dengan mikrobiom yang memiliki bermacam-macam mikroorganisme yang berhabitat di dalam tubuh manusia. Asupan harian residu antibiotika yang berasal dari lingkungan sebagian besar akan masuk ke dalam saluran gastrointestinal, dimana diperkirakan 800-100 bakteri yang berbeda dan lebih dari 7000 strain yang berbeda hidup di dalamnya (Jernberg *et al.*, 2010). 95% dari jumlah mikroba tersebut merupakan bakteri yang menguntungkan, dan beberapa lainnya adalah bakteri berbahaya dan patogen oportunistik. Terdapat keseimbangan mikro-ekologi antara bakteri tersebut dan tubuh manusia sepanjang waktu. Penelitian observasi, klinik dan epidemiologi menemukan adanya peningkatan paparan antibiotik berkaitan kuat dengan perubahan komposisi mikrobiom di dalam intestinal (Fikri *et al.*, 2018).

Hal ini dapat meningkatkan bahaya resistensi bakteri, yang dapat terjadi pada intestinal manusia dalam jangka waktu yang panjang. Terjadinya ketidakseimbangan mikrobiota, dapat mengarah pada terjadinya proliferasi dari bakteri berbahaya dan patogen oportunistik, lebih jauh lagi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti pseudomembranous colitis, kelainan intestin dan kanker kolorektal. Kejadian yang lebih buruk yaitu apabila bakteri dalam usus telah resisten, kemudian berkembang biak dengan jumlah yang cukup banyak, maka penyakit – penyakit yang di sebabkan karena bakteri tersebut akan dapat menyebabkan kematian karena tidak dapat diobati (Ben, 2018).

Bahaya residu antibiotika ini tentu dapat dihindari dan dikendalikan, dengan cara memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya (Fikri *et al.*, 2018). Sebagai pengendalian jangka panjang untuk mencegah terjadinya residu antibiotik dalam pangan asal hewan, Nisha (2008) menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu, memunculkan kesadaran individual maupun kelompok masyarakat mengenai permasalahan ini melalui edukasi oleh petugas veteriner, organisasi, literatur, dan instansi pemerintahan, melakukan uji cepat (*rapid screening metode*) untuk menganalisa adanya residu antibiotik dan penentuan kelayakan makanan berdasarkan batas maksimum residu yang telah di tentukan, pemrosesan pada susu dapat membantu menginaktivasi antibiotik. Seperti proses pendinginan maupun pasteurisasi, untuk menginaktivasi antibiotik, dapat menggunakan arang atau karbon aktif, resin dan iradiasi sinar ultraviolet, mencegah adanya penggunaan antibiotik secara tidak rasional dalam praktik veteriner di lapangan, menciptakan sebuah uji yang sederhana dan ekonomis yang dapat dilakukan di lapangan untuk mengidentifikasi adanya residu obat pada produk pangan asal hewan, pengawasan secara luas dan survey berkala residu mikrobial pada jaringan hewan yang dapat atau biasa di konsumsi dan susu.

KESIMPULAN

Pengujian residu oksitetrasiklin dengan metode screening test menunjukkan tidak ditemukan pada susu kambing PE yang berasal dari kelurahan Kalipuro, Banyuwangi. Sebanyak 100% dari 26 sampel yang di periksa menunjukkan hasil yang negatif terhadap adanya residu antibiotik oksitetrasiklin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Airlangga PSDKU Banyuwangi atas dukungan fasilitas sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah

bekerjasama sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., Masbulan, E., Kusumaningsih, A. 2005. Proses praproduksi sebagai faktor penting dalam menghasilkan produk ternak yang aman untuk manusia. *J. Litbang. Pertanian*, 24(1), 27-35.
- Ben, Y., Fu, C., Hu, M., Liu, L., Wong, M. H., Zheng, C. 2018. Human health risk assessment of antibiotic resistance associated with antibiotic residues in the environment: A review. *Environmental research*.
- Budiarsaha, I., Utama, I.K. 2014. Efisiensi Produksi Susu Kambing Peranakan Etawah. *JITV.*, 19(3).
- Chi, Z., Liu, R., You, H., Ma, S., Cui, H., Zhang, Q. 2014. Probing the in vitro cytotoxicity of the veterinary drug oxytetracycline. *PLoS one*, 9(7), e102334.
- Detha, A. 2014. Pengujian Residu Antibiotik Pada Susu. *J. Kajian Vet.*, 2(2), 203-208.
- Dewi, A.A.S., Widdhiasmoro, N.P., Nurlatifah, I., Riti, N., Purnawati, D. 2014. Residu Antibiotika pada Pangan Asal Hewan, Dampak dan Upaya Penanggulangannya. *BBVet Denpasar*.
- Fikri, F., Purnama, M.T.E., Saputro, A.L., Hamid, I.S. 2018. Identifikasi *Escherichia coli* dan *Salmonella spp* pada Karkas Sapi di Rumah Potong Hewan di Banyuwangi dan Resistensi Terhadap Antibiotika. *J. Sain Vet.*, 36(1), 123-128.
- Ferichani, M., Darsono, D., Supanggyo, S. 2017. Inovasi Produk Es Krim Susu Kambing Etawah-Ubi Ungu. *Caraka Tani: J. Sustainable Agric.*, 27(1), 35-43.
- Jernberg, C., Löfmark, S., Edlund, C., Jansson, J. K. 2010. Long-term impacts of antibiotic exposure on the human intestinal microbiota. *Microbiol.*, 156(11), 3216-3223.
- Meutia, N. 2016. Residu Antibiotika dalam Air Susu Segar Yang Berasal dari Peternakan di Wilayah Aceh Besar. *J. Ilmu Ternak*, 16(1).
- Ningrum, S.G. 2011. Pengujian Residu Antibiotika dalam Susu Segar dari Beberapa Peternakan Sapi Perah di Provinsi Jawa Barat Menggunakan Metode Bioassay.
- Nisha, A.R. 2008. Antibiotic residues-a global health hazard. *Vet. World*, 1(12), 375.
- Panigrahi, S., Sheoran, M.S., Ganguly, S. 2017. Antibiotic residues in milk-a serious public health hazard. *J. Environ. Life Sci.*, 2(4), 99-102.
- Pikkemaat, M.G. 2009. Microbial screening methods for detection of antibiotic residues in slaughter animals. *Anal. Bioanal. Chem.*, 395(4), 893-905.
- Plumb, D.C. 2009. *Veterinary Drug Handbook 7th Edition*. Pharmavet. Stockholm, Wisconsin.
- Pradika, A.Y., Chusniati, S., Purnama, M.T.E., Effendi, M.H., Yudhana, A., Wibawati, P. A. 2019. Uji Total *Escherichia coli* pada Susu Sapi Segar di Koperasi Peternak Sapi Perah (KPSP) Karyo Ngremboko Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. *J. Med. Vet.*, 2(1), 1-6.
- Quintanilla, P., Beltrán, M.C., Molina, A., Escriche, I., Molina, M.P. 2019. Characteristics of ripened Tronchón cheese from raw goat milk containing legally admissible amounts of antibiotics. *J. Dairy Sci.*, 102(4), 2941-2953.
- Standar Nasional Indonesia. 2000. SNI Nomor 01-6366-2000 Tentang Batas Maksimum

Cemaran Mikroba dan Batas Maksimum Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia. 2008. SNI Nomor 7442: 1995 Tentang Metode Uji Tapis (Screening Test) Residu Antibiotika pada

Daging, Telur dan Susu Secara Bioassay. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Suwito, W., Nugroho, W.S., Sumiarto, B., Wahyuni, A.E.T.H. 2014. Faktor-Faktor Risiko Mastitis Subklinis pada Kambing Peranakan Etawah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *J. Vet.*, 15(1), 130-138.
