

ISSN: 1412-1433



JURNAL

**BIOSAINS**

PASCASARJANA

Volume 18 Nomor 03, Desember 2016



J. Biosains  
Pascasarjana

Vol. 18

No. 03

Hlm.

Surabaya  
Desember 2016

ISSN  
1412-1433





PASCASAIRJANA

P-ISSN 1412-1433

E-ISSN 2621-4849

[HOME](#) [ABOUT](#) [LOGIN](#) [REGISTER](#) [SEARCH](#) [CURRENT](#) [ARCHIVES](#)
[Home](#) > [About the Journal](#) > [Editorial Team](#)

## EDITORIAL TEAM

### CHIEF EDITOR

Mr. Suryani Dyah Astuti, Program Studi S2-Teknobiomedik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

### EDITORIAL BOARD

Mr. I Ketut Sudiana, Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga  
 Dr. Ahmad Yudianto, Biologi Molekuler Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga  
 Mrs. Aminatun Aminatun, Program Studi S1- Fisika Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Indonesia  
 Ms. Gunanti Mahasri, Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Airlangga  
 Dr. Christijogo Sumartono, Departemen Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Dosen Departemen Manajemen Bencana, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia  
 Dr. Kuwat Triyana, Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
 Endarko Endarko, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia  
 Prof. Dr. Agik Suprayogi, Institut Pertanian Bogor, Indonesia  
 Prof. Drg. S. Sunardhi Widyaputra, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

### MANAGING EDITORS

Prof. Dr. Suharningsih, Ir., Universitas Airlangga, Indonesia  
 Prof. Dr. R. Eddy Rahardjo, Anestesiologi & Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Indonesia  
 Ms. Sri Subekti, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga  
 Prof. Dr. Ni Made Mertaniasih, Universitas Airlangga, Indonesia  
 Ms. Toetik Koesbardati, Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Indonesia

### ASSISTANT EDITORS

Ms. Cahyarani Permata Aji, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Indonesia  
 Mr. Alfian Pramudita Putra, Program Studi S1-Teknobiomedik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Indonesia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

#### Instruction for Author

[Guide for authors](#)
[Online Submission](#)
[Document Template](#)

#### Journal Policy

[Focus and Scope](#)
[Publication Ethics](#)
[Article Processing Charge](#)
[Peer Review Process](#)
[Peer Reviewers](#)
[Editorial Team](#)
[Open Access Statement](#)
[Plagiarism](#)
[Copyright](#)
[Contact](#)
[Old Website](#)

#### USER

 Username 

 Password 
☐ Remember me

#### NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

#### JOURNAL CONTENT

 Search 

Search Scope

All

Browse

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)
[Other Journals](#)


Pusat Pengembangan Jurnal dan Publikasi Ilmiah  
 Universitas Airlangga  
 copyright©2017 Template PPJPI



## VOL 18, NO 3 (2016)

JURNAL BIOSAINS PASCASARJANA UNAIR

### TABLE OF CONTENTS

#### ARTICLES

Pemberian Ekstrak Air Panas *Spirulina platensis* melalui Perendaman Terhadap Total Leukosit, Indeks fagositosis dan konsentrasi TNF- $\alpha$  *Osteonemus gouramy*

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3032

Abstract views = 224 times | views = 536 times  
Myrna Budi Resmawati

Pengembangan Metode Isolasi dan Identifikasi Mitragynine dalam Daun Kratom (*Mitragyna speciosa*)

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3033

Abstract views = 1746 times | views = 1680 times  
Livia Elsa

Pengaruh Tanah dan Air Laut Terhadap Kualitas DNA dari Otot PSOAS Jenazah Melalui Metode STR (Effect of Soil and Sea Water to Quality of PSOAS Muscle DNA Corpse with STR Method)

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3034

Abstract views = 1409 times | views = 1107 times  
Ni Putu Puniari Eka Putri

Perendaman Ekstrak *Spirulina plantesis* Terhadap Ig-M, Jaringan Limpa dan Diferensial Leukosit Ikan Mas Setelah Diinfeksi *Aeromonas hydrophila* (Deeping Of Extract *Spirulina plantesis* To Ig-M, Spleen Tissue And Differential Leucocyte Of Carp After Infected By *Aeromonas hydrophila*)

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3035

Abstract views = 443 times | views = 903 times  
Widya Pratiwi

Gambaran Basofil, TNF- $\alpha$ , dan IL-9 Pada Petani Terinfeksi STH di kabupaten Kediri

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3036

Abstract views = 407 times | views = 777 times  
Elfred Rinaldo Kasimo

Pengembangan Metode GC-MS untuk Penetapan Kadar Acetaminophen pada Spesimen Rambut Manusia

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3037

Abstract views = 1202 times | views = 4784 times  
Komang Ari Gunapria Darmapatni

Identifikasi KHV dengan Uji Immunofluorescence dan Immunocytochemistry Berdasarkan Uji Polymerase Chain Reaction Positif KHV pada Ikan Koi (*Cyprinus carpio*)

doi = 10.20473/bsn.v18i3.3444

Abstract views = 1134 times | views = 1410 times  
Oktarina Surianti

#### Instruction for Author

Guide for authors

Online Submission

Document Template

#### Journal Policy

Focus and Scope

Publication Ethics

Article Processing Charge

Peer Review Process

Peer Reviewers

Editorial Team

Open Access Statement

Plagiarism

Copyright

Contact

Old Website

#### USER

Username

Password

☐ Remember me

Login

#### NOTIFICATIONS

View

Subscribe

#### JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Search

Browse

By Issue

By Author

By Title

Other Journals



## IDENTIFIKASI KHV DENGAN UJI *Immunofluorescence* DAN *Immunocytochemistry* BERDASARKAN UJI *Polymerase Chain Reaction* POSITIF KHV PADA IKAN KOI (*Cyprinus carpio*)

Oktarina Surfianti<sup>1</sup>, Soewarno<sup>1</sup>, Gunanti Mahasri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S2 Bioteknologi Perikanan dan Kelautan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

<sup>2</sup>Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga  
Kampus C Mulyosari-Surabaya, 60115 Telp. 031-5911451  
e-mail: <sup>1</sup>hr\_surfi@yahoo.co.id,

### Abstrak

*Koi Herpesvirus* (KHV) menyebabkan penyakit parah dan kematian di segala usia ikan mas dan ikan koi (*Cyprinus carpio*) dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia sebagai penyebab mortalitas yang sangat tinggi dengan perkiraan (80-95%) untuk ikan koi dan ikan mas. Identifikasi KHV ini sudah dilakukan dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Tetapi, metode tersebut tidak cocok untuk pekerjaan lapangan karena belum efisien dalam hal waktu dan peralatan. Perlu ada pemeriksaan berbasis imunologis sebagai identifikasi awal (pemeriksaan dini) yang belum banyak dilakukan dan perlu dikembangkan terutama untuk pemeriksaan KHV yaitu metode *Immunofluorescence* sebagai pemeriksaan imunologis untuk identifikasi adanya antigen atau dengan menggunakan pewarnaan *fluorescent* dan *immunocytochemistry* menggunakan metode imuno histo (sito) kimia ensim yang bersifat spesifik dengan pewarnaan oleh zat chromogen guna mengidentifikasi antigen dalam suspensi organ insang dan darah. Tujuan dari penelitian ini adalah agar mampu mengidentifikasi KHV (*Koi Herpes Virus*) yang menginfeksi ikan koi (*Cyprinus carpio* L) menggunakan metode aplikasi *Immunofluorescence* serta *Immunocytochemistry* berdasarkan pemeriksaan menggunakan uji PCR dengan hasil positif KHV. Hasil dari kedua metode diperoleh positif untuk beberapa sampel berdasarkan positif PCR, ditandai dengan adanya pendaran oleh zat *fluorescein* berwarna hijau pada antigen KHV dengan pemeriksaan metode *Immunofluorescence* dan adanya ekspresi zat chromogen pada antigen berwarna coklat kemerahan pada antigen KHV dengan pemeriksaan *Immunocytochemistry*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua metode tersebut mampu mengidentifikasi KHV dan dapat digunakan sebagai uji pemeriksaan dini KHV berbasis imunologis.

**Kata kunci:** *Koi Herpesvirus*, Ikan koi (*Cyprinus carpio*), *Immunofluorescence*, *Immunocytochemistry*



#### Abstract

*Koi Herpesvirus (KHV) cause severe disease and death in all ages carp and koi carp (Cyprinus carpio) and spread rapidly around the world as the cause of very high mortality with estimates (80-95%) for koi and goldfish. KHV identification has been carried out by the method of Polymerase Chain Reaction (PCR). However, these methods are not suitable for field work because it is not efficient in terms of time and equipment. There needs to be examination-based immunological as early identification (primary care physician) that has not been done and needs to be developed especially for the examination KHV is the method Immunofluorescence as inspection immunological to the identification of the antigen or by using a staining fluorescent and immunocytochemistry using immuno histo (sito) chemical enzymes specific staining by the chromogen substances in order to identify the antigen in suspension gills organs and blood. The purpose of this research is to be able to identify KHV (Koi Herpes Virus) that infects koi carp (Cyprinus carpio L) using application methods Immunofluorescence and immunocytochemistry based examination using a PCR test with positive results from both methods obtained KHV. Hasil positive for multiple samples based on positive PCR, characterized by the luminescence by the green fluorescein substance with inspection methods Immunofluorescence KHV antigens and their expression on KHV antigen chromogen substances are reddish brown in antigen with Immunocytochemistry examination. It concluded that both methods are able to identify KHV and can be used as an early test of KHV based immunological examination.*

**Keywords:** Koi Herpesvirus, Ikan koi (*Cyprinus carpio*), Immunofluorescence, Immunocytochemistry

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan panas, yang menambah peluang berbagai biota untuk bertahan hidup dan tumbuh subur, baik didarat maupun dipelihara (Mashuri Masri, 2013). Akibat kondisi tersebut di atas, berbagai jenis penyakit pada ikan dapat mudah terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara mikroorganisme yaitu parasit, jamur, bakteri dan virus yang patogen maupun non patogen dengan induk semang/inang/host dan terutama akibat dari beberapa faktor lingkungan yang kurang mendukung (Isti, 2001). Salah satu penyakit yang menginfeksi ikan adalah jenis *Koi Herpesvirus*. *Koi Herpesvirus* (KHV) adalah penyakit virus yang sangat menular yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan pada ikan mas (*Cyprinus carpio*) dan domestik ikan hias (Soliman and El-Matbouli, 2005).

*Koi Herpesvirus* (KHV) menyebabkan penyakit parah dan kematian di segala usia ikan mas dan ikan koi (*Cyprinus carpio*) dan menyebar dengan cepat di seluruh dunia.

Sebagai pandangan bahwa KHV adalah penyakit terbatas pada perdagangan ikan hias sehingga dapat diminimalkan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap budidaya di Eropa (Haenen *et al.*, 2004).

Di Indonesia sendiri infeksi paling besar terjadi pada tahun 2001 menyebabkan penurunan produksi ikan mas nasional yang mengalami penurunan sekitar 40% selama kurun waktu 2002-2006 (Sunarto *et al.* 2002). Hal ini karena banyak ikan yang mati terkena serangan virus koi herpes. Sehingga terjadi kelangkaan ikan hias di pasaran, terutama ikan koi (Tauhid dkk, 2004).

Beberapa pendekatan pemeriksaan atau identifikasi *Koi Herpesvirus* (KHV) sudah dilakukan mulai tahun 2002. KHV telah didiagnosis dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Manfaat besar PCR yaitu sebagai deteksi penyakit secara molekuler terutama penyakit viral (Cobo, 2012). Salah satu penyakit viral yang dapat dideteksi dengan PCR yaitu KHV (*Koi Herpesvirus*) (Ciptoroso, *et al* 2012). Metode ini tidak cocok untuk pekerjaan lapangan karena membutuhkan peralatan laboratorium yang



tidak simpel. Dengan demikian, metode atau alat, yang mampu secara definitif mendeteksi virus dari jaringan yang terinfeksi sangat diperlukan, misalnya metode immuno-kromatografi kit dengan monoklonal spesifik antibodi terutama untuk kasus di lapangan (Aoki *et al.*, 2011).

Identifikasi KHV sudah banyak dikembangkan dan sudah banyak diteliti terutama pada ikan *Cyprinidae* seperti dengan menggunakan metode PCR. Tetapi dalam pemeriksaan berbasis imunologis masih belum banyak dilakukan dan perlu dikembangkan terutama untuk pemeriksaan KHV. Pemeriksaan *Immunocytochemistry* (ICC) merupakan salah satu jenis pemeriksaan imunologis, menggunakan metode imuno histo (sito) kimia ensim yang bersifat spesifik dan bertujuan untuk membantu mendeteksi antigen dalam cairan specimen klinik yang terinfeksi oleh kuman pathogen (Warsito, 1991). Sedangkan pemeriksaan *Immunofluorescence* merupakan suatu jenis pemeriksaan imunologis untuk deteksi adanya antigen atau mencari lokalisasi antigen dalam jaringan atau sel specimen klinik dengan menggunakan pewarnaan *fluorescent* dan metode ini sudah telah banyak penelitian tahun-tahun sebelumnya di wilayah lain dan ternyata memberikan korelasi positif terhadap hasilnya (Priyambodo, 2001).

Penerapan dan penggunaan uji bioteknologi berbasis antibodi, yaitu metode *immunofluorescence* (IF) dan *immunocytochemistry* (ICC/ Imunositokimia) *streptavidin biotin* dalam mendeteksi protein virus KHV pada ikan koi adalah sangat penting. Mengingat identifikasi KHV berbasis antibodi masih jarang dilakukan sementara itu masih sering menggunakan uji berbasis DNA dengan kebutuhan biaya yang relatif lebih mahal, perlu waktu dan penanganan serta alat khusus. Menurut Warsito, 2013 bahwa uji berbasis antibodi ini penting guna mendukung upaya penanganan wabah KHV pada ikan mas, ikan koi selama ini selalu terlambat dan pada kasus infeksi KHV, di lingkungan perairan sekitar dan mampu menginfeksi ikan-ikan lain yang peka. (Warsito dkk, 2013). Ditambahkan lagi oleh Lestari dkk, 2014 bahwa perlu adanya pengembangan teknik

pemeriksaan yang cepat, tepat dan akurat dengan mengembangkan uji *immunofluorescence* dan *immunocytochemistry* / imunositokimia pada preparat apus darah dan organ insang sebagai salah satu pemeriksaan awal KHV.

## 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Nopember 2015 sampai bulan Maret 2016 di Laboratorium Imunologi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I.

Bahan penelitian yang digunakan adalah ikan koi positif KHV berdasarkan pemeriksaan uji PCR yang diambil dari berbagai wilayah di sekitar Jawa Timur. Ikan koi diambil dari ikan yang diduga terinfeksi KHV dengan beberapa tanda klinisnya antara lain berupa insang geripis, erosi atau borok pada kulit, gerakan tak terkontrol, kulit melepuh atau kadang disertai pendarahan pada sirip ataupun pada ikan koi yang tidak menunjukkan tanda-tanda gejala klinis atau bersifat *carrier*.

Bahan untuk uji PCR adalah *DNAzol*, *Alkohol absolut*, *master mix*, *ddH<sub>2</sub>O*/ *Nuclease free water*, *Agarose 2%*, *Primer Mix KHV F 292 bp* dan *R 292 bp*, *DNA template kontrol negatif*, *DNA template kontrol positif KHV*, *TAE buffer* *Ethidium bromide*, *6x Loading dye buffer*, *100 bp ladder DNA marker*.

Bahan untuk *Immunofluorescence* adalah *methanol*, *larutan buffer saline*, *normal goat serum*, *1x PBS*, *Mouse Anti-Koi Herpesvirus (KHV) monoclonal antibody*, *goat anti-mouse Ig G fluorescence conjugate*, *entellan neu* untuk proses mounting, *aquades steril*.

Bahan yang digunakan untuk metode *Immunocytochemistry* ini antara lain *methanol*, *larutan buffer saline*, *10% hydrogen peroxide block*, *normal goat serum*, *Mouse anti-Koi Herpesvirus (KHV) monoclonal antibody*, *goat anti-mouse IgG biotin conjugate*, *streptavidin horseradish peroxidase*, *substrat-chomogen solution*, *counter stain (Mayer's hematoxylin)*, serta *Entellan neu* untuk proses mounting.



Peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan ikan adalah akuarium yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara ikan koi dari berbagai wilayah sebelum dilakukan uji PCR.

Peralatan untuk uji PCR adalah *micropipet* (1-10  $\mu$ l), (50-200  $\mu$ l), (200-1000  $\mu$ l), *sarung tangan*, *timbangan analitik*, *Thermocycler* (Mesin PCR), *pellet paste*, *hot plate*, *Microtube* 200  $\mu$ l dan 1500  $\mu$ l, *Pipet Tips* (1-10  $\mu$ l), (50-200  $\mu$ l), (200-1000  $\mu$ l), peralatan *Elektroforesis* dan *Power Supply*, *vortex*, *UV Trans-illuminator*, *camera Polaroid*.

Peralatan untuk uji *Immunofluorescence* adalah *coplin jar*, *cover glass*, *incubator*, *mikroskop fluorescence* dan *objek glass*. Peralatan untuk *Immunocytochemistry* adalah *coplin jar*, *cover glass*, *incubator*, lemari es, *mikroskop cahaya*, *objek glass*, *timbangan analitik*, dan *sarung tangan*.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental uji *Immunofluorescence* dan *Immunocytochemistry* menggunakan jaringan insang ikan koi dan menggunakan *whole* darah (*Cyprinus carpio*) yang diperoleh dari berbagai wilayah di Jawa Timur (Blitar, Malang, Kediri).

Pengujian awal dengan metode PCR sebagai uji konfirmasi awal guna mengetahui positif KHV yang akan dilanjutkan dengan uji *immunofluorescence* dan *Immunocytochemistry*.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu mengambil secara acak sampel ikan dari berbagai wilayah yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan metode PCR guna mengetahui positif KHV yang akan dilanjutkan dengan uji *immunofluorescence* dan *Immunocytochemistry*.

#### Persiapan Ikan yang Akan Diuji

Ikan koi yang digunakan untuk proses uji diperoleh dari sentra budidaya ikan Koi di berbagai wilayah di Jawa Timur. Ikan koi ditampung sementara pada akuarium yang telah dibersihkan kemudian di lanjutkan uji PCR hingga ketemu positif KHV.

#### Pengujian PCR

Isolasi DNA KHV yang selanjutnya digunakan untuk uji PCR untuk menentukan ikan yang terinfeksi KHV dan selanjutnya digunakan dalam uji utama yaitu pemeriksaan menggunakan uji *immunofluorescence* dan *imunositokimia*. Adapun tahapan dalam proses pemeriksaan dengan metode PCR adalah yang pertama melakukan Ekstraksi Tri Reagent, persiapan amplifikasi dan persiapan dalam alat *Thermal Cycler*.

Ekstraksi TRI Reagent yang dilakukan pertama kali yaitu sampel ikan pada organ insang sebanyak 50-100 mg dipotong kecil-kecil/ digerus halus dengan pisau bedah atau gunting steril. Untuk menghindari kontaminasi, setiap sampel harus diproses dengan menggunakan tempat dan alat yang berbeda. Selanjutnya sampel tersebut diekstrak DNA-nya.

Pendeteksian DNA KHV dengan teknik PCR dilakukan dengan menggunakan primer spesifik menurut Gray *et al*, (2002) yang telah dimodifikasi oleh Kurita, *et al* (2009). Primer Sphl-5 (5'GAC ACC ACA TCT GCA AGG AG 3') dan (5'GAC ACA TGT TAC AAT GGT CGC 3') akan menghasilkan amplicon seberat 292 bp.

Persiapan amplifikasi dengan menambahkan RTG PCR Bead 1 butir, Primer F290 (20 pMol) sebanyak 2  $\mu$ l dan primer R290 (20 pMol) sebanyak 2  $\mu$ l. Ditambahkan template DNA sebanyak 2  $\mu$ l. Kemudian dengan menambahkan Aquades steril sebanyak 19  $\mu$ l. Adapun siklus amplifikasi yang digunakan yaitu dengan 1 siklus pada suhu 95°C selama 5 menit; 30 siklus pada suhu 95°C selama 30 detik, 50°C selama 30 detik dan 72°C selama 30 detik; serta 1 siklus pada suhu 72°C selama 30 detik, 72°C selama 7 menit.

Produk PCR (*amplicon*) dipisahkan dengan elektroforesis gel. Elektroforesis dilakukan pada voltase 120 volt hingga indikator warna *loading dye buffer* bergerak  $\frac{1}{4}$  bagian dari panjang gel. Selanjutnya gel agarosa dimasukkan ke dalam larutan pewarnaan (0.05% *ethidium bromida*) dalam wadah plastik sampai terendam selama 10 menit. Gel diamati dengan UV transilluminator dan dokumentasi.



#### Pengujian *Immunocytochemistry/* *Imunositokimia*

Metode *Immunocytochemistry* /  
imunositokimia dilakukan dengan  
menggunakan sampel darah untuk apusan  
dengan urutan kerja yaitu dengan mengambil  
darah menggunakan spuit 1cc. Satu tetes darah  
diletakkan diatas objek gelas dan diulas tipis.  
Sediaan hasil olesan darah tipis ini kemudian  
difiksasi kedalam larutan methanol selama 10  
menit.

Sediaan selanjutnya ditetesi dengan  
*normal goat serum* dan diinkubasi pada suhu  
kamar selama 30 menit. Sediaan ditetesi  
dengan antibody primer yang berupa anti-  
KHV *Monoklonal antibody* lalu inkubasi pada  
suhu 37 °C selama 20 menit. Kemudian  
sediaan dicuci dengan larutan PBS selama 10  
menit, selanjutnya ditiriskan diatas kertas  
tissue.

Sediaan ditetesi dengan antibody  
sekunder dan ditambah dengan cairan  
*biotinylated secondary antibody* selama 10  
menit. Sediaan dicuci menggunakan PBS  
selama 10 menit, kemudian ditiriskan diatas  
kertas tissue. Sediaan kemudian diinkubasi  
dengan *streptavidin-peroxidase* conjugate  
selama 5 menit. Selanjutnya sediaan dicuci  
lagi dengan PBS selama 10 menit, lalu tiriskan  
didasar kertas tissue. Selanjutnya sediaan  
diinkubasi dengan substrat-*chromogen* pada  
suhu kamar selama 15 menit. Kemudian  
sediaan dicuci dengan aquades selama 10  
menit. Sediaan kemudian dilakukan  
*counterstain hematoxylin* selama 10 menit.

Dicuci dengan aquades dan *mounting*  
dengan *entellan neu* untuk pengamatan di  
bawah mikroskop cahaya. Hasil positif apabila  
dalam sediaan yang telah dilakukan  
pewarnaan menggunakan *streptavidin-biotin*  
akan terlihat warna coklat  
kemerahan/keemasan.

#### Pengujian *Immunofluorescence*

Pemeriksaan *imunofluorescence*  
adalah suatu jenis pemeriksaan imunologis  
untuk mendeteksi adanya antigen atau mencari  
lokalisasi antigen dalam jaringan atau sel  
specimen dengan pewarnaan *fluorescence*.  
Prinsip dasar pemeriksaan KHV pada ikan koi  
adalah dengan membuat preparat ulas dari

organ insang, hati dan ginjal, yang kemudian  
ditetesi dengan anti-KHV *fluorescent* dan  
diinkubasi pada suhu 37°C selama 30 menit.  
Setelah dilakukan pencucian dengan larutan  
buffer fosfat, selanjutnya dibuat sediaan pada  
objek glass kemudian dilihat dengan  
menggunakan mikroskop *fluorescence*.  
Apabila dalam ulasan tersebut mengandung  
antibodi yang menyelubungi KHV maka akan  
tampak warna *fluoresensi* kehijauan. Untuk  
membuat kesimpulan hasil pemeriksaan KHV,  
maka perlu diperhatikan adalah KHV dan  
intensitas *fluoresensi*. Hasil pemeriksaan  
memberikan penilaian positif atau negatif  
(Matuscak *et al.*, 1982; Ardana, 1987; Kunin,  
1997).

Teknik pewarnaan dalam mendeteksi  
protein virus KHV dilakukan berdasarkan  
metode *indirect labeling immunofluorescence*.  
Sebelumnya dilakukan pengambilan organ  
insang. Kemudian insang digerus dengan pelet  
pastel. Selanjutnya dengan penambahan PBS  
1x sebanyak 500 µl dilakukan sentrifuge  
10.000 rpm selama 5 menit. Pelet yang telah  
diperoleh dari hasil ekstraksi tersebut  
kemudian di smear pada objek glass secara  
merata dan setelah itu di fiksasi dengan  
methanol dengan tujuan membloking  
antigennya.

Fiksasi dilakukan dalam larutan  
methanol selama 30 menit pada suhu -20 °C.  
Berikutnya antigen diikat dengan antibody  
spesifik yang tidak dilabel (*unlabeled spesifik*  
*antibody*) sebagai antibody primer (mouse  
anti-KHV *monoclonal antibody*) dan  
diinkubasi sebagai ikatan antibody pertama.  
Sediaan kemudian diinkubasikan dengan  
antibody sekunder yang berlabel  
(*Fluorochrome secondary antibody*). Antibodi  
ini mengandung antibodi anti imunoglobulin  
hewan. Antibodi sekunder ini akan mengikat  
antibodi primer.

Hasil preparat positif didapatkan  
akibat dari reaksi antigen-antibodi kompleks  
(WHO 1996) yang berwarna hijau  
*fluorescence* dengan ukuran bervariasi. Hasil  
negatif jika tidak memberikan warna  
*fluorescence* (Dean *et al.*, 1996).



### Analisa Data

Data yang akan didapatkan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara dengan menggambarkan atau memaparkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci tentang sebuah kegiatan yang dilakukan dan dibandingkan dengan literature dengan menganalisa hasil berdasarkan tingkat ekspresi dari ikan uji berdasarkan metode *Immunofluorescence* dan *Immunocytochemistry*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil pengambilan ikan yang terinfeksi di beberapa wilayah yaitu Blitar, Malang dan Kediri didapatkan beberapa ikan terinfeksi KHV dengan dibuktikan adanya beberapa insang telah mengalami nekrosis dan beberapa gejala klinis lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 3.1** Pemeriksaan gejala klinis dan patologis anatomis pada beberapa ikan koi yang diperoleh dari beberapa daerah


No	Asal Daerah	Gejala Klinis dan patologis anatomis
1.	Blitar	Erosi sirip, sisik banyak yang terlepas, mata cekung dan nekrosis serta terdapat nodule putih pada insang
2.	Malang	Erosi sirip ekor, kongesti di sirip dada, dan nekrosis serta terdapat nodule putih pada insang
3.	Kediri	Kongesti sirip dada dan hemoragi area punggung

Ikan koi yang digunakan selama penelitian merupakan ikan sehat sebagai kontrol negatif setelah melalui konfirmasi

awal dengan uji PCR dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan ikan sakit yang menunjukkan gejala patologis anatomis sebagai kontrol positif dapat dilihat pada Gambar 3.2.



**Gambar 3.1** Ikan koi sehat dengan kondisi insang berwarna merah segar, sisik lengkap, mata cembung, digunakan sebagai kontrol negatif. A Kondisi Ikan sehat dengan mata cembung, tidak terdapat luka, sisik lengkap. B. Insang tampak berwarna merah cerah.




**Gambar 3.2** Ikan koi terinfeksi KHV yang digunakan sebagai kontrol positif. A. mata cekung dan adanya infeksi sekunder yaitu ulcer daerah kepala, nekrosis pada lamella insang, B. sisik rontok,



### Pengujian Menggunakan Metode Polymerase Chain Reaction

Ikan koi untuk sampel penelitian dilakukan setelah ikan koi dipingsankan dengan larutan cengkeh dosis 1-5 cc/10 liter air. Satu persatu ikan diuji dengan pengambilan organ insang. Insang diletakkan didalam tube untuk proses PCR. Prosedur Pemeriksaan KHV berdasarkan metode PCR dengan beberapa tahapan mulai dari proses ekstraksi, amplifikasi hingga elektroforesis dapat dilihat pada Lampiran 4.

Berdasarkan sampel yang diambil dari 3 kolam masing masing 10 ekor ikan sampel yang masih hidup, kemudian dipilih dan diambil untuk pemeriksaan PCR. Hasil pemeriksaan KHV berdasarkan metode PCR dapat dilihat pada Gambar 5.3.




**Gambar 3.3** Elektroforesis gel agarosa 2% dari PCR di amplifikasi pada fragmen 292bp dari KHV DNA yang diperoleh dari insang koi yang hampir mati. Primer yang digunakan untuk amplifikasi dipilih sesuai dengan OIE. Lane 1: Marker (100 bp DNA). Hasilnya, Lane 2 dan 13: kontrol positif; Lane 3 dan 12: kontrol negatif, Lane 4-8 hasil positif; Lane 9,10 hasil negatif


### Identifikasi Menggunakan Metode Immunofluorescence

Hasil ekspresi positif virion KHV terlihat adanya pendaran pada daerah selnya.

Hasil ekspresi negatif virion KHV tidak terlihat pendaran dari zat *fluorophore*.



**Gambar 3.4** Identifikasi KHV menggunakan monoclonal antibody anti-KHV dengan pewarnaan berlabel FITC. Terlihat pendaran pada apusan suspensi organ insang, perbesaran 40x, (A) asal Malang. (B) asal Blitar. (C) Tidak terlihat pendaran pada apusan suspensi organ insang, perbesaran 40x. Terlihat pendaran pada apusan suspensi organ insang, perbesaran 100x, (D) sampel asal Malang, (E) sampel asal Blitar, (F) sampel asal Kediri (Mikroskop ultraviolet merk Zeiss).



**Gambar 3.5** Identifikasi KHV menggunakan monoclonal antibody anti-KHV dengan pewarnaan menggunakan zat *fluorophore*. A-C: Terlihat pendaran pada apusan darah; perbesaran 40x.



Ikan yang memiliki beberapa gejala klinis terinfeksi KHV, asal Blitar, Malang dan Kediri tersebut dilakukan uji PCR *Polymerase Chain Reaction* (PCR) merupakan suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara invitro yaitu menggunakan mesin yang bernama *Thermalcycler*. Alat ini dengan setting suhu dan siklus yang sesuai mampu melipat gandakan DNA. Jumlah siklus yang digunakan untuk proses PCR KHV adalah 30 siklus yang mana diharapkan mampu memperbanyak DNA secara eksponensial. Seperti yang telah diungkapkan oleh Handoyo, D *et al* tahun 2000 bahwa umumnya jumlah siklus yang digunakan pada proses PCR adalah 30 siklus. Penggunaan jumlah siklus lebih dari 30 siklus tidak akan meningkatkan jumlah amplicon secara bermakna dan memungkinkan peningkatan jumlah produk yang non-target. Perlu diingat bahwa di dalam proses PCR, efisiensi amplifikasi tidak terjadi 100 %, hal ini disebabkan oleh target templat terlampaui banyak, jumlah polimerase DNA terbatas dan kemungkinan terjadinya *re-annealing* untai target.

Virus KHV dengan komponen utamanya adalah protein yang diselubungi oleh kapsid masuk melalui insang sebagai pernapasan ikan. KHV akan menempel pada sel insang sebagai reseptor spesifik guna replikasi virus selanjutnya. Beberapa tahapan setelah tahap absorpsi, KHV juga akan melakukan tahap penetrasi, sintesis, pematangan yang selanjutnya tahap lisis yang dapat berlangsung secara cepat. Virus KHV dalam hal ini sebagai pathogen dapat memasuki aliran darah dan menyebar ke bagian lain dari tubuh ikan seperti dapat mengendap di ginjal dan tertelan lewat mulut masuk melalui sistem pencernaan yang akhirnya mengendap dan berkembangbiak di usus. Virus akan berenang mengikuti aliran darah selama ikan masih hidup dan mengikuti system aliran darah yang berfungsi sebagai alat transport. Virion dalam darah inilah yang diteliti guna melihat keberadaannya sebagai bentuk ekspresi melalui kedua metode yang ingin dikembangkan sebagai konfirmasi awal pemeriksaan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam identifikasi virus KHV.

Dari beberapa jenis protein KHV yang bersifat antigenik mampu direaksikan berdasarkan ikatan antigen-antibodi. Antibodi yang digunakan bersifat spesifik dan komplemen terhadap antigen yang direaksikan. Monoklonal antibody memiliki binding site yang akan mengenali antigen tertentu dari beberapa jenis protein KHV tersebut. Dimana kedua interaksi ini akan membentuk suatu ikatan yang kuat ketika direaksikan.

Menurut Warsito, *et al.* 2013 mengungkapkan bahwa identifikasi KHV berdasarkan isolasi virus dan uji PCR mempunyai keterbatasan dalam hal sensitivitas sehingga diperlukan metode pendekatan diagnosis yang baru untuk peneguhan diagnosis KHV, yaitu uji imunopatologi imunositokimia dan *imunofluorescence*.

Alasan utama mencoba dikembangkannya metode ini adalah karena bersifat efektif dari segi waktu dan biaya, diakui secara internasional, mudah diaplikasikan pada masyarakat dan menurut Warsito, *et al.* 2016 bahwa hal ini sangat diperlukan dalam rangka program kontrol dan pengendalian, termasuk pencegahan dan eradikasi KHV di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan mampu mengoptimalkan kualitas dan peningkatan produksi hasil perikanan.

Sampel uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah insang dan whole blood sel dari masing masing 10 sampel ikan koi yang berasal dari 3 wilayah berdasarkan anamnesis pernah mengalami wabah koi herpes virus. Meskipun ke tiga tempat tersebut pernah mengalami wabah KHV dengan angka morbiditas dan mortalitas yang relatif tinggi, tetapi sampai saat ini belum ada laporan belum ada wabah lagi di daerah tersebut.

Sampel yang didapatkan diharapkan mampu memenuhi persyaratan dalam uji berbasis imunologis. Sampel uji dalam kondisi hidup ketika sampai di laboratorium diupayakan sedemikian rupa, Dalam hal ini tidak ada sampel yang mati diperjalanan karena penambahan oksigen secara periodik guna mempertahankan kondisi ikan. Hal ini diperkuat dengan alasan Wirata, *et al.* 2014 bahwa sampel rusak tidak dapat



dilakukan uji imunokimia karena dikhawatirkan berpeluang meningkatkan kemungkinan hasil negatif palsu.

Suatu pemeriksaan darah sangatlah perlu pada keadaan patologis dan kita bisa mendapatkan pelengkap pemeriksaan. Susunan darah ikan merupakan faktor pemeriksaan penting, sehingga perubahan gambaran darah banyak digunakan untuk menilai status kesehatan ikan (Amrullah, 2004). Lestari, *et al* (2014) mengungkapkan bahwa darah merupakan salah satu media pembawa virus yang dapat menjangkau seluruh system organ, seperti saluran pencernaan, system pernafasan melalui sirkulasi darah.

Darah sebagai alat transportasi hemoglobin komponennya yaitu trombosit dan plasma darah sebagai pertahanan pertama dari serangan penyakit yang masuk ke dalam tubuh (Aria, 2008). Salah satu fungsi darah yaitu sebagai media transportasi dalam mengangkat/mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh untuk dikeluarkan melalui ginjal termasuk sumber penyakit, seperti bakteri, virus, maupun parasit.

Menurut Playfair, *et al* (2009) menyatakan bahwa insang sebagai reseptor spesifik KHV. Sedangkan kunci infeksi virus KHV bersasal dari replikasi intra seluler yang dapat atau tidak dapat menimbulkan kematian sel. Oleh karena itu homogenisasi organ insang perlu dilakukan sehingga diperoleh antigen dalam bentuk suspensi. Suspensi organ inilah yang kemudian didiagnosa dengan metode imunokimia.

#### Uji immunofluorescence

Uji Utama berdasarkan metode *Immunofluorescence* tak langsung sebagai pemeriksaan imunologis guna mendeteksi adanya antigen atau mencari lokalisasi antigen dalam jaringan insang dan dalam sel darah (sel specimen yang merupakan sekumpulan dari satu bagian atau lebih bahan yang diambil langsung dari suatu sistem dengan pewarnaan *fluorescence*. Dengan menggunakan metode tak langsung, immunofluoresensi menggunakan dua antibodi; yang berlabel pertama (primer) antibodi khusus mengikat molekul target setelah proses fiksasi, antibodi sekunder yang

dikonjugasikan dengan zat *fluorophore* tersebut akan mengikat antibodi primer tunggal. Hal ini akan memperkuat pengikatan jumlah molekul *fluorophore* per antigen. Menurut Kresna, 2011 metode *Immunofluorescence* ini memiliki beberapa keunggulan antara lain bahwa metode ini merupakan metode yang cukup sederhana dan cepat untuk dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Uji ini merupakan suatu metode untuk memeriksa adanya antibodi atau antigen dengan menggunakan label *fluorescence* yang akan berpendar jika dilihat dibawah mikroskop ultraviolet.

#### Uji Imunositokimia

Pemeriksaan imunopatologi dengan metode imunositokimia yang diaplikasikan dalam peneguhan diagnosis penyakit KHV ini menggunakan teknik streptavidin biotin ini dengan alasan streptavidin ini memiliki kemampuan mengikat biotin yang sangat kuat yaitu memiliki berat molekul sebesar 60.000 dalton dan terdiri dari 4 subunit yang identik dengan setiap sub unit mempunyai satu bagian ikatan untuk biotin. (Warsito, *et al*. 2013). Hasil uji imunositokimia positif diamati di bawah mikroskop cahaya dan didasarkan pada analisis deskriptif terlihat adanya warna coklat keemasan setelah pada saat staining digunakan senyawa pembawa warna (kromogen) diamino-benzidine (DAB). Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Warsito dan Wuryastuti, 2011 menyatakan bahwa hasil akhir positif sedian berwarna coklat muda sampai coklat tua ataupun berwarna coklat kemerahan/keemasan.

#### 4.KESIMPULAN DAN SARAN

##### KESIMPULAN

1. Metode *Immunofluorescence* yang diaplikasikan dalam penguatan identifikasi KHV dapat mendeteksi antigen KHV pada darah dan insang ikan koi (*Cyprinus carpio*).
2. Metode *Immunocytochemistry* yang diaplikasikan dalam penguatan identifikasi KHV dapat mendeteksi



antigen KHV pada darah dan insang ikan koi (*Cyprinus carpio*).

#### SARAN

Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut tentang sensitifitas dan spesifitasnya serta pengujian terhadap suspensi organ lain seperti usus dan ginjal sebagai *host spesifik* lainnya menggunakan metode *Immunofluorescence* dan *Immunocytochemistry*.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis haturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi saya kesempatan untuk menempuh pendidikan S2 Bioteknologi Perikanan dan Kelautan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Iswati, S.E., M.Si., Ak. selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof Dr. Ir. Hari Suprpto, M.Agr. selaku koordinator Program Studi S2 Bioteknologi Perikanan dan Kelautan.
4. Bapak Prof. Dr. Suwarno, M.Si, drh selaku ketua Pembimbing Pertama Sekolah Pasca Sarjana, Surabaya, yang telah membimbing dan telah memberikan arahan, perhatian dan motivasi selama pengerjaan dan penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Gunanti Mahasri, Ir., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, saran serta motivasi penuh atas terselesainya tesis ini.
6. Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan dan masukan atas terselesaikannya tesis ini.
7. Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I yang telah menyediakan tempat untuk penelitian.

8. Kedua orang tuaku, Almarhum bapak Soernadji yang telah lama meninggal dan almarhumah ibu Sofia yang telah memberikan semangatnya serta do'a dan kepercayaan kepada penulis ketika dalam keadaan sakit selama proses tesis.
9. Suamiku Dandi, anak anak tercinta Helmi dan Randy, adik Irma yang bersedia membagi waktunya demi kelancaran tesis ini.
10. Teman-teman di Laboratorium Imunologi dan Biologi Molekuler yang penuh perhatian dan selalu setia mendengar keluh kesah penulis.
11. Teman-teman S2 Biotek Almira, Lina, Widya, Akbar, mas Anggi, Mbak Ayu, Rahma Umami, Mbak Myrna, Mba Ica, Pak Laode, Pak Ricat dan Pak Ferry yang selalu membantu dan memotivasi penulis.
12. Semua pihak yang telah mendukung hingga selesainya Tesis ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anina Berti. 2014. Laporan Praktikum Kuliah Lapangan Taksonomi Vertebrata di LIPI. Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan. Lampung.
- Aoki T., Hirono I., Kurokawa K., Fukuda H., Nahary R., Eldar A., Davison A.J., Waltzek T.B., Bercovier H. and R.P. Hedrick, 2007. Genome sequences of three koi herpesvirus isolates representing the expanding distribution of an emerging disease threatening koi and common carp worldwide. *J. Virol.*, 81(10):5058.
- Aoki. 2012. *Gene Expression analysis of common carp (Cyprinus carpio L) lines during Cyprinid herpesvirus 3 infection yields Insights Into Differential Immune Responses*. *Dev. Comp. Immunol.*, 37, pp. 65-76.



- Ariel, E. 2005. Ornamental fish as trans-boundary vectors of viral diseases. In P. Walker, R. Lester and M.G. Bondad-Reantaso(eds). Diseases in Asian Aquaculture V, pp. 103-112. Fish Health Section, Asian Fisheries Society, Manila.
- Aquatic Diagnostic Ltd, 2015. Anti-Koi Herpesvirus (KHV) Monoclonal Antibody. Product no:P14. Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling, Scotland.
- Bachtiar. 2002. Mencemerlangkan Warna Koi. Tim Lentera. Agro Media Pustaka. 74 hal.
- Balai KIPM Kelas I Surabaya I, 2014. Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Ikan Karantina. Surabaya.
- Bercovier H, Fishman Y, Nahary R, Sinal S, Ziotkin A, Eyngor M, Gilad O, Eldar A, Hedrick RP 2005. Cloning of the Koi Herpesvirus (KHV) Gene Encoding Thymidine Kinase and Its Use for a Highly Sensitive PCR Based Diagnosis. BMC Microbiol 5:13-19.
- Boenich, T., A.J. Farmilo, Ronald H. Stead, Marc Key, Rosanne Welcher, Richard Harvey, Keren N. Atwood. 2001. Hand Book Immunochemical staining Method Edisi-3. Daco Dytomation, Carpinteria. California.
- Breeder Koi. 2009. Bentuk Badan Ikan Koi. <http://www.Solat-Aid.org>. Diakses pada 31 Juli 2015, jam 08.00 WIB.
- Cahyono, B. 2000. Budidaya Ikan Air Tawar Ikan Gurami, Ikan Nila, Ikan Mas. Kanisius. Yogyakarta. 113 hlm.
- Campbell, Mitchell, Reece (2002). Biology: Edisi V Jilid 3, Jakarta: Erlangga.
- Choi, et al., 2004. reprint courtesy DR Dong Lim Choi email: [dlchoi@nfrdi.re.kr](mailto:dlchoi@nfrdi.re.kr); <http://sunarma.worpress.com/files/2008/01/dao-carph herpesvirus.pdf>.
- Cobo F. 2012. Application of Molecular Diagnostic Techniques for Viral Testing. *The Open Virology Journal*. Vol. 6: 104-114.
- Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, 2003. Prosedur PCR Untuk Diagnosa Cepat Koi Herpes Virus. Direktorat Jendral Perikanan Budidaya.
- Departemen Budidaya. 2005. Biologi Reproduksi dan Pengendalian dalam Upaya Pembenihan Ikan Koi (*Cyprinus carpio*). Institute Pertanian Bogor.
- Dishon A, Davidovich M, Ilouze M, Kotler M. (2007). Persistence of cyprinid herpesvirus 3 in infected cultured carp cells. *J Virol* 81: 4828-4836.
- D. POKOROVA, T. VESELY, V. PIACKOVA, S. RESCHOVA, J. HULOVA. 2005. Current Knowledge on Koi Herpesvirus (KHV). *Vet. Med. - Czech, Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic. University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology in Vodnany, Czech Republic.*
- Edi, S. dkk. 2010. Identifikasi Infeksi Koi Herpes Virus (KHV) pada Ikan Koi (*Cyprinus carpio*) dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR), Imunositokimia dan Imunohistokimia. *Indonesian Journal of Veterinary Science & Medicine*. Vol I Nomor 2: 17-22.
- Effendy, Hersanto. 1993. Mengenal Beberapa Jenis Koi. Kanisius. Yogyakarta.
- Effik Yuli Peryuni. 2013. Ikan Koi, jenis-jenis dan daftar harga. <http://ikanhias-yuli.blogspot.com/2014/02/ikan->



- Herpesvirus. Journal of Fish Diseases  
 2009, 32, 311–320.
- Hutoran, et al., 2005.  
<http://jvi.asm.org/cgi/reprint/79/4/1983>
- Ilouze, M., Perelberg, A., Kotler, M., and Steinitz, M. 2008. Antibody Response and Resistance of *Cyprinus carpio* Immunized with *Cyprinid*. Dor Aquacultured Research Station. Israel. 121 pp.
- Isti Koesharyani, dkk. 2001. Manual For Fish Disease Diagnosis- II. Gondol Research. Research Institute For Mariculture and JICA.
- Jean-Christophe Avarrea, Jean-Paul Madeiraa, Ayi Santikab, Zakki Zainunb, Marine Baudc, Joëlle Cabonc, Domenico Carusoa, Jeannette Castric c, Laurent Bigarréc. 2011. Investigation of *Cyprinid* herpesvirus-3 genetic diversity by a multi-locus variable number of tandem repeats analysis. Journal of Virological Methods 173 (2011) 320–327. Journal of Virological Methods. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/jviromet](http://www.elsevier.com/locate/jviromet).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 2013. Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Kepmen-KP/2013.
- Khairuman, Dodi S. dan Bambang G. 2008. Budidaya Ikan Mas Secara Intensif. Agromedia Pustaka. Jakarta. 100 hlm.
- Kimiko Uchii, Arndt Telschow, Toshifumi Minamoto, Hiroki Yamanaka, Mie N Honjo, Kazuaki Matsui and Zen'ichiro Kawabata. 2010. Transmission dynamics of an emerging infectious disease in wildlife through host reproductive cycles. Correspondence: K Uchii, Department of General Systems Studies, University of Tokyo, 3-8-1 Komaba, Meguro, Tokyo 153-8902, Japan. E-mail: [c-uchii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp](mailto:c-uchii@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp). Current address: H Yamanaka, Department of Environmental Solution Technology, Ryukoku University, Otsu, Japan.
- KKP. 2012. Industrialisasi Perikanan Budidaya. Arsip Berita Perikanan. Umm.ac.id. Universitas Muhammadiyah Malang. 2 hlm.
- Koi4u. 2008. Stability of colours. Published on Monday, 24 November 2008 12:16 . Website Last Modified: Saturday 31 January 2015.
- Konishi Koi Farm. 2015. Koi Herpes Virus. Konishi Koi Farm. <http://www.konishikoi.com/kh/index.php>
- Kunin CM. 1997. Detection, prevention and management of urinary tract infection 3th. Ed. Lea. Febiger, Philadelphia.
- Kusuma SAF, 2010. PCR Makalah. Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran.
- Lestari, Artanti Tri dan Putu Eka Sudaryatma. 2014. Studi Imunositokimia Darah dan Suspensi Organ Kerapu Macan (*Ephinephelus fuscoguttatus*) yang Diinfeksi Virus Isolat Lapang Penyebab Viral Nervous Necrosis. Jurnal Sain Veteriner ISSN : 0126-0421.
- Lio-Po, G., et. al. 2009. Surveillance of Emerging Fish Viral Pathogens in Some Southeast Asian Countries. The Israeli Journal of Aquaculture-Bamidgeh 61(3): 208-214.
- Malole. 2005. Bahan Teori dan Praktikum Apresiasi Teknik Virologi dan PCR Penyakit Hewan Aquatik. Balai Besar



- Karantina Ikan Soekarno-Hatta. Jakarta.
- Mashuri Masri Dosen pada Jurusan Biologi Fakultas Sains. DETEKSI KOI HARPES VIRUS (KHV) PADA IKAN MAS KOI (*Cyprinus carpio* L) DENGAN MENGGUNAKAN METODE APLIKASI *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Teknologi UIN Alauddin Makassar. Jurnal Teknosains, Volume 7 Nomor 2, Juli 2013, hlm: 189 - 200.
- Michel, Leroy, Stalin Raj, Liefrigg, J.Mast, Wattiez, A.F Vanderplasschen and B. Costes. 2010. The Genome of Cyprinid Herpesvirus 3 Encodes 40 Proteins Incorporated in Mature Virions. *Journal of General Virology*: 452-462. Belgium.
- McGeoch, et al. 2000. Toward a Comprehensive Phylogeny for Mammalian and Avian Herpesviruses. *Journal of Virology*, 74(22):10401-10406.
- Mohammad, F. 2009. Histopathological Studies on Tilapia zilli and Solea vulgaris from Lake Qarun, Egypt. *Journal of Fish and Marine Science* 1 (1):29-39,2009.
- Monaghan, KimD.Thompson, JamesE.Bron, SvenM. Bergmann, TaeS.Jung, Takashi Aoki, K.FionaMuir, MalteDauber,SvenReiche, DianaChee, ShinM.Chong, JingChen and Alexandra Adams. 2016. *Expression of immunogenic structural proteins of Cyprinid Herpesvirus 3 in vitro Assessed Using Immunofluorescence*. *Veteriner Research*. 47:8
- Narbuko, C dan Achmadi. 2001. Metode Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Narisah, Putri. 2015. Koi Herpes Virus (KHV). [http://www.academia.edu/4777446/Koi\\_Herpes\\_Virus](http://www.academia.edu/4777446/Koi_Herpes_Virus). Diakses tanggal 20 November 2015.
- Nazir, M. 1985. Metodologi Penelitian. Ghalia. Jakarta.
- NCBI. 2016. *Polymerase Chain Reaction (PCR)*. National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techpcr/>
- OIE, 2009. Manual Of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. Paris. [www.oie.int](http://www.oie.int)
- O.L.M. Haenen, K. Way, S.M. Bergmann and E. Ariel. 2004. The Emergence of Koi Herpesvirus and Its Significance to European Aquaculture. *Bull. Eur. Ass. Fish Pathology*.
- Perelberg, A., M. Smirnov, M. Huttoran, A. Diamant, I. Bejerano, and M. Kotler. 2003. Epidemiological Description of an New Viral Disease Afflicting Cultured *Cyprinus Carpio* in Israel. *The Israel Journal of Aquaculture* Bamidgheh 55:5-12.
- Prihartono, Eko. 2004. Permasalahan Ikan Koi dan Solusinya. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Pikulkaew S. et al.2009. The Outbreak of Koi Herpesvirus (KHV) in Koi (*Cyprinus carpio koi*) /Thai J. Vet. Med. 39(1): 53-58. 53 from Chiang Mai Province, Thailand.
- Pikarsky, E., Ronen, A., Abramowitz, J., Levavi-Sinan, B., Hutoran, M., Shapira, Y., Steinetz, M. Perelberg, A., Soffer, D., and Koller, M. 2004. Pathogenesis of Acute Viral Disease Induced in Fish by Carp Interstitial Nephritis and Gill Necrosis Virus. *Journal of Virology*, 78:9554-9551.
- Playfair, J.H.L. dan B.M. Chain. 2009. At a Glance Imunologi. Edisi Kesembilan. Penerbit Erlangga.
- Priyambodo.2001. Deteksi Bakteri Berselubung Antibodi Dalam Sedimen Air Kemih Dengan Uji Streptavidin Biotin. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.
- Pokorova,d., Vesely, T., Piacova, V., Reschova, S. 2005. Current Knowledge on KOi Herpesvirus (KHV) : A review.



- Ministry of Agriculture or The Czech Republic. 2005 (4) : 139-147.
- Rantam, Dr. Fedik. A., drh. 2003. Metode Imunologi. Airlangga University Press. Surabaya.
- Rantam, 2005. Virologi. Airlangga University Press.
- Raden Wasito, Hastari Wuryastuti, Bambang Sutrisno. 2013. Identifikasi Koi Herpesvirus dengan Uji Imunopatologi Imunohistokimia Streptavidin Biotin pada Ikan Mas Kari (IDENTIFICATION OF KOI HERPESVIRUS USING IMMUNOPATHOLOGIC IMMUNOHISTOCHEMISTRY OF STREPTAVIDIN BIOTIN IN THE COMMON CARP CARRIERS). Bagian Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Jurnal Veteriner Maret 2013. Vol. 14 No. 1: 37-44. ISSN: 1411 - 8327
- Ragam Fauna. 2015. Ini 13 Gambar Jenis Ikan Koi. <http://www.duniaq.com/ini-13-gambar-jenis-ikan-koi/>. Diakses tanggal 20 November 2015.
- Savni. 2014. Histopatologi Ikan Mas (*Cyprinus carpio*). Laporan Praktikum ke-13 mata kuliah Penyakit Organisme Akuatik. Departemen Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Subagyo, M. 1991. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sudiana, 2005. Konsep Dasar Imunologi. Universitas Airlangga. Surabaya
- Suryabrata. 1997. Metode Penelitian. Raya Grafindo Persada. Jakarta
- Susanto, Heru. 2000. Koi. Penebar Swadaya. Cipondoh.
- Suprpto, H. 2011. Histologi Ikan. Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Surabaya. Hal 6-13.
- Sano, M. Crane, M., komar, C. 2004. Infection With Koi herpesvirus-Disease Carp, Developed To Support the NACA/FAO/OIE regional quarterly animal disease reporting system in NACA. Bangkok. Thailand. 11 pp.
- Sunarto, A., Taukhid, Rukyani, A., Koesharyani, I., Supriyadi, H., Huminto, H., Agungpriyono, D.R., Pasaribu, F.H., Widodo, Herdikiawan, D., Rukmono, D., Prayitno, S.B., 2002. Field investigations on a serious disease outbreak among koi and common carp (*Cyprinus carpio*) in Indonesia. In: 5th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Gold Coast, Australia.
- Takashi Aoki, Ikuo Hirono, Ken Kurokawa, Hideo Fukuda, Ronen Nahary, Avi Eldar, Andrew J. Davison, Thomas B. Waltzek, Herve Bercovier, and Ronald P. Hedrick. 2012. Genome Sequences of Three Koi Herpesvirus Isolates Representing the Expanding Distribution of an Emerging Disease Threatening Koi and Common Carp Worldwide. This article has been cited by other articles in PMC. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2012
- Taukhid, A., Sunarto, A., Koesharyani, I., Supriyadi, H., Gardenia. 2004. Strategi Pengendalian Penyakit Koi Herpesvirus (KHV). Balai Riset Budidaya Air Tawar.
- Takashi Aoki, Tomokazu Takano, Sasimnans Unajak, Madoka Takagi, Young Rim Kim, Seong Bin Park, Hidehiro Kondo, Ikuo Hirono, Tatsuo Saito-Taki, Jun-ichi Hikima, Tae Sung Jung. 2010. Generation of Monoclonal Antibodies Specific for ORF68 of Koi Herpesvirus. Laboratory of Genome Science, Tokyo University of Marine Science and Technology, 4-5-7 Konan, Minato, Tokyo 108-8477, Japan. Department of Microbiology, School of Allied Health Science, Kitasato University, Sagami-hara, Kanagawa 228-8555, Japan. Aquatic Biotechnology Center, College of Veterinary Medicine, Gyeongsang National University, 900 Gajwa-dong, Jinju, Gyeongnam 660-710, South Korea.



- Takashi Aoki, Ikuo Hirono, Ken Kurokawa, Hideo Fukuda, Ronen Nahary, Avi Eldar, Andrew J. Davison, Thomas B. Waltzek, Herve Bercovier, and Ronald P. Hedrick. 2007. Genome Sequences of Three Koi Herpesvirus Isolates Representing the Expanding Distribution of an Emerging Disease Threatening Koi and Common Carp Worldwide. *JOURNAL OF VIROLOGY*, May 2007, p. 5058–5065 Vol. 81, No. 10. Copyright © 2007, American Society for Microbiology. All Rights Reserved.
- Torrent F, Villena A, Lee PA, Fuchs W, Bergmann SM, Coll JM. 2016. The Amino-terminal Domain of ORF149 of Koi Herpesvirus is Preferentially Targeted by IgM from Carp Populations Surviving Infection. *Arch Virol*. 161(10):2653–65.
- Svobodova, Z., Vykusova, B., 1991. Diagnostic Prevention and Therapy of Fish Diseases and Intoxication. Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology Vodnany, Czechoslovakia.
- Uchii K, Telshow A, Minamoto T, Yamanaka H, Honio MN, Matsui K, Kawabata Z. 2010. Transmission Dynamics of an Emerging Infectious Disease in Wildlife Through Host Reproductive Cycles. *The ISME Journal* (2011) 5, 244–251; doi:10.1038/ismej.2010.123; published online 26 August 2010.
- Wirata, K., Ketut Berata dan Ketut Puja. 2014. Sensitifitas dan Spesifisitas Teknik Imunohistokimia Rabies. Balai Besar Veteriner Denpasar. *Jurnal Ilmu dan Kesehatan*.
- Warsito R, 1991. Penggunaan Imunositokimia Untuk Diagnosis Penyakit Infeksi, Kursus Singkat Imunositokimia di PAU Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Warsito, R., Hastari, W., Bambang, S. 2013. Identifikasi KHV Dengan Uji Imunopatologi Imunohistokimia Streptavidin Biotin Pada Ikan Mas Karier. *Jurnal Veteriner* 14. No. 1: 37–44.
- Warsito, R dan Hastari Wuryastuti. 2014. Antibodi dan Imunohistokimia. Rapha Publishing. Yogyakarta.
- Yunasfi. 2006. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Penyakit Dan Penyakit Yang Disebabkan Oleh Jamur. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.
- Yusuf, Z.K., 2010. Polymerase Chain Reaction (PCR). *Saintek* Vol 5, No 6, Tahun 2010.