

Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) Terhadap Mortalitas Larva *Boophilus microplus* Secara In Vitro

by Endang Suprihati

Submission date: 29-Mar-2022 11:13AM (UTC+0800)

Submission ID: 1795700360

File name: The_Effectiveness_of_Ethanol_Extract_of_Red_Betel_Leaf.pdf (148.14K)

Word count: 2203

Character count: 12715

The Effectiveness of Ethanol Extract of Red Betel Leaf (*Piper crocatum*) Against Mortality of *Boophilus microplus* Larvae *In Vitro*

Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) Terhadap Mortalitas Larva *Boophilus microplus* Secara *In Vitro*

¹Meta Aprilia, ²Poedji Hastutiek, ³Rochmah Kurnijasanti, ³Lucia Tri Suwanti, ³Moh
Sukmanadi, ²Endang Suprihati

¹Student, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga.

²Department of Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga.

³Department of Basic Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga.

Received: 25-02-2019 , Accepted: 10-03-2019 , Published Online: 19-03-2019

Abstract

The aims of this study is to know the effectiveness of ethanol extract of red betel leaf (*Piper crocatum*) against mortality of *Boophilus microplus* Larvae *in vitro*, as well as knowing lethal concentration 50 (LC₅₀) and lethal concentration 90 (LC₉₀). Method that used in the research was completely randomized design. There were five treatments and each treatment was done in five replications. This research used ten *Boophilus microplus* larvae each treatment for all replication. The observation and recording of mortality was done at 1, 2, 3, 4, and 5 hours. *Boophilus microplus* larvae were declared dead if there was no movement. The obtained data was analyzed using ANOVA factorial. The result of this research show that ethanol extract of red betel leaf (*Piper crocatum*) has effectiveness against mortality of *Boophilus microplus* larvae *in vitro*. In the extract 10% concentration, there is effectiveness that almost the same as Noticks®. The higher concentration of the extract, the higher the effectiveness against mortality larvae. In probit analysis show that LC₅₀ achieved by concentration 5,4% or 2.700mg/50ml and LC₉₀ achieved by concentration 11,3% or 5.650mg/50ml.

Keywords: Red Betel Leaf, Mortality, *Boophilus microplus* Larvae

Pendahuluan

hingga saat ini kegiatan pengembangan ternak di Indonesia belum dapat mencapai titik yang diharapkan, kondisi ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat (Bamualim, 2007), salah satu faktor penghambat tersebut salah satunya mengenai masalah kesehatan ternak. Masalah kesehatan ternak di Indonesia masih menjadi satu bahasan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara menyeluruh, salah satu masalah kesehatan ternak yang masih dianggap serius adalah akibat serangan caplak. Indonesia yang memiliki iklim tropis menjadi faktor penunjang pertumbuhan caplak yang sangat cepat. Salah satu spesies caplak yang sering dijumpai keberadaannya di Indonesia adalah caplak *Boophilus microplus*. Caplak tersebut memiliki dua fase selama kehidupannya yakni fase parasitik dimulai dari larva hingga dewasa dan fase non parasitik dimulai dari telur hingga larva (Verdonck, 2013). Kerugian ekonomis terjadi karena caplak menghisap darah *B.*

microplus dapat menghisap darah sehingga dapat menyebabkan anemia (Jongejan dan Uilenberg, 2004). Seekor caplak dapat menghisap darah sebanyak 0,3 ml sehari sehingga dapat mengganggu pertumbuhan, menimbulkan kegatalan, bahkan dapat merusak kulit karena menimbulkan jaringan nekrotik pada kulit yang mengakibatkan harga kulit ternak turun (Wahyuwardani, 1995) selain itu caplak *B. microplus* merupakan vektor dari penyakit babesiosis dan anaplasmosis yang banyak menyebabkan kematian pada ternak (Boka et al., 2017)

Banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat serangan caplak *B. microplus* memerlukan penanganan yang serius. Penanganan kasus caplak di peternakan yang hingga saat ini masih sering dilakukan adalah dengan menggunakan bahan kimia yang memiliki efek sebagai insektisida, namun penggunaan insektisida sintetik dapat menimbulkan dampak negatif seperti berkembangnya ras resisten, terbunuhnya predator alami hama, keracunan pada

manusia dan hewan ternak penyebab kanker, residu pada daging dan susu, dan pencemaran lingkungan (Wardhana dan Diana, 2014). Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan menyebabkan perlu adanya alternatif lain. Insektisida nabati yang berasal dari tanaman dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Daun sirih merah (*Piper crocatum*) menjadi salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat salah satunya dapat digunakan sebagai kandungan flavonoid dari daun sirih merah memiliki kadar lebih tinggi dari daun sirih hijau, sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan (Neldawati dan Gusnedi, 2013) kandungan sirih merah berupa flavonoid yang terbagi atas flavon dan flavonol memiliki jumlah lebih tinggi dibanding kadar flavonoid daun sirisak, daun katuk, dan daun ekor naga. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatrowie (2015) menggunakan tanaman sirih hijau (*Piper betle*) terbukti efektif sebagai larvasida. Kesamaan kandungan yang ada di dalam daun *P. crocatum* dan *P. betle* menjadi dasar acuan bahwa daun sirih merah dapat digunakan sebagai larvasida terhadap *Boophilus microplus*, karena penelitian daun sirih merah sebagai insektisida ataupun larvasida masih sangat jarang dilakukan.

14 Materi dan Metode Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simplisia daun sirih merah, aquadest, etanol 96% teknik noticks[®] mengandung 10g coumaphos, Tween 80.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kain kasa, jarum penusuk tumpul, timbangan digital, pipet, spuit, rotary evaporator, mesin giling, botol spray dengan volume 10 ml, cawan petri, kertas saring, kapas, spuit 10 ml.

15 Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*)

Daun sirih merah dicuci dengan air mengalir dan didiamkan selama semalam. Selanjutnya dipotong kecil-kecil dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dalam ruangan, tidak terkena sinar matahari secara langsung selama 3 hari. Daun diangin-anginkan hingga terbentuklah simplisia. Simplisia dihaluskan hingga menjadi serbuk dengan cara digiling. Serbuk yang diperoleh kemudian diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 kali 24 jam, dan diambil filtratnya. Filtrat diupkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator dengan suhu

50°C dengan kecepatan 40 rpm, hingga diperoleh ekstrak daun sirih merah yang kental. Hasil ekstrak kemudian diencerkan menggunakan Tween 80 2% lalu dilakukan perhitungan sesuai konsentrasi yang telah ditentukan.

Koleksi Sampel Larva *B. microplus*

Larva *B. microplus* didapat dari caplak dewasa betina fase engorged yang berjumlah 5 ekor dan masing-masing ditempatkan di wadah tabung, kemudian dilakukan proses rearing pada caplak hingga didapatkan telur yang dikeluarkan secara berkala. Telur ditunggu hingga menetas menjadi larva kemudian ditunggu kembali hingga larva berumur tujuh hari. Sebanyak 250 ekor larva berumur tujuh hari diambil secara acak, kemudian dibagi ke dalam lima kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 larva *B. microplus*. Setiap perlakuan terdiri atas lima pengulangan. Kelompok perlakuan terdiri dari K-, K+, P1, P2, P3.



Gambar 1. Caplak *B. microplus* Betina yang sedang Bertelur.

Pemberian Perlakuan

Kelompok kontrol negatif disemprot menggunakan Tween 80 2% tanpa ekstrak daun sirih merah. Kelompok kontrol positif disemprot menggunakan insektisida yang mengandung 10g coumaphos. Kelompok perlakuan satu disemprot menggunakan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah dan Tween 80 2% dengan konsentrasi 2,5%. Kelompok perlakuan dua disemprot menggunakan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah dan Tween 80 2% dengan konsentrasi 5%. Kelompok perlakuan tiga disemprot menggunakan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah dan Tween 80 2% dengan konsentrasi 10%. Penyemprotan sebanyak empat kali pada masing-masing kelompok dan ulangnya dilakukan dengan jarak 16 jam sama.

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis varian

(ANOVA) dua arah atau faktorial dilanjutkan uji Duncan dan untuk mengetahui *Lethal Concentration* 95 (LC95) maka digunakan metode uji probit. Analisis statistika dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows 22.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap angka mortalitas larva *B. microplis* berdasarkan pemberian berbagai macam perlakuan dan dihubungkan dengan waktu kematian tercepat yang dibutuhkan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Terlihat dari tabel 1 bahwa pada jam ke dua dengan EDS 10% menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan penggunaan coumaphos dengan angka mortalitas larva yang tinggi 84%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan EDS 10% memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dan cepat terhadap mortalitas larva *B. microplis* bila dibandingkan dengan penggunaan EDS 2,5% dan 5%. Maka dari itu dilakukan uji probit terhadap ketiga konsentrasi EDS 2,5%; 5%; dan 10% dalam waktu pengamatan dua jam agar diperoleh LC₅₀ dan LC₉₀. Hasil dari uji probit memberikan


LC₅₀ sebesar 2.700mg/50ml setara dengan 5,4% dan LC₉₀ sebesar 5.650mg/50ml setara dengan 11,3%. Penelitian *Lethal Concentration* ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak sirih merah terhadap mortalitas larva terhitung mulai dari LC₅₀ yang menggambarkan jumlah konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh 50% populasi sampel dan LC₉₀ yang menggambarkan jumlah konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh 90% populasi sampel.

Tingkat mortalitas larva *B. microplis* mulai jam kesatu hingga jam kelima tergambar dari grafik pada Gambar 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan mortalitas larva setiap jam dalam perlakuan yang sama, namun pada perlakuan yang berbeda memberikan hasil atau tingkat efektivitas yang berbeda terhadap mortalitas larva *B. microplis*. Penggunaan insektisida yang mengandung coumaphos telah efektif terhadap mortalitas larva setelah 1 jam penyemprotan dan memberikan hasil optimum pada jam ke 3. Penggunaan EDS 2,5% dan 5% juga efektif terhadap mortalitas larva namun belum dapat mencapai optimum hingga jam ke 5, sedangkan pada EDS 10% telah mencapai titik optimum pada jam ke 5.


Tabel 1. Rata-rata Prosentase dan Simpangan Baku Pengamatan Mortalitas Larva *B. Microplis* Berdasarkan Interaksi Perlakuan dan Waktu

Perlakuan	Waktu (jam ke)				
	1	2	3	4	5
K- (aquadest+tween 80)	8 ^a ± 8,36	14 ^a ± 5,47	16 ^a ± 8,94	18 ^a ± 8,94	20 ^{ab} ± 7,07
K+ coumaphos	86 ^{gh} ± 13,41	96 ^{gh} ± 5,47	100 ^h ± 0,00	100 ^h ± 0,00	100 ^h ± 0,00
EDS 2,5%	16 ^a ± 15,16	22 ^{ab} ± 8,36	38 ^{cd} ± 13,03	50 ^d ± 7,07	74 ^{ef} ± 23,02
EDS 5%	34 ^{bc} ± 11,40	50 ^d ± 7,07	68 ^e ± 13,03	82 ^{efg} ± 20,49	92 ^{gh} ± 13,03
EDS 10%	68 ^e ± 14,83	84 ^{fgh} ± 11,40	90 ^{gh} ± 14,14	96 ^{gh} ± 8,94	100 ^{gh} ± 0,00

a,b,c,d,e,f,g, dan h Superskrip yang berbeda dalam kolom yang sama, menunjukan perbedaan yang nyata (p<0,05)



Gambar 2. Grafik Presentase Mortalitas Larva *B. microplis* K- (Aquadest+tween80),K+ (Coumaphos), P1 (EDS2,5%), P2 (EDS 5%), dan P3 (EDS 10%).



Gambar 3. Larva *B. microplus* yang Mati (Kaki Larva Menggugulung).

Kemampuan ekstrak etanol daun sirih merah untuk mempengaruhi mortalitas larva *B. microplus* karena adanya bahan aktif tertentu seperti flavonoid, alkaloid, minyak atsiri, dan saponin. Alkaloid juga memiliki fungsi sebagai pestisida nabati (Wempi dan Permadi., 2013), alkaloid memiliki kemampuan berikatan dengan DNA hal ini menyebabkan adanya zat antara DNA yang akan menghambat replikasi DNA akibatnya terjadi gangguan replikasi DNA yang akhirnya akan menyebabkan kematian sel. Kemampuan ekstrak etanol daun sirih merah (*Piper crocatum*) sebagai larvasida berbanding lurus dengan semakin tinggi konsentrasi ekstrak jika semakin tinggi tingkat efektivitasnya, hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani pada tahun 2012 mengenai penggunaan ekstrak daun sirih merah terhadap *Aeromonas hydrophila* menunjukkan hasil pada konsentrasi 12,5% telah mampu menghambat pertumbuhan bakteri, dan pada konsentrasi 25% dapat membunuh bakteri. Hasil yang didapat secara signifikan mengalami kenaikan antara semakin tingginya konsentrasi sirih merah yang digunakan angkat penghambatan pertumbuhan dan kematian bakteri juga semakin tinggi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, ekstrak etanol daun sirih merah *P. crocatum* efektif terhadap mortalitas larva caplak *B. microplus* secara *in vitro* dengan menggunakan konsentrasi 10% mampu menyebabkan kematian larva 100% pada jam kelima dan LC_{50} ekstrak etanol daun sirih merah dapat dicapai dengan jumlah ekstrak 2.700mg/50ml yang setara dengan 5,4% dan LC_{90} dicapai dengan jumlah ekstrak 5.650mg/50ml yang setara dengan 11,3%.

Daftar Pustaka

- Bamuallim, A.M. 2007. Produksi Peternakan Di Indonesia: Potensi dan Kendala Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Hal: 22-24.
- Boka, O.M., L. Achi, H. Adakal. A. Azokou, P. Yao, Y.G. Yapi, M. Kone, K. Dagnogo, and Y.Y. Kaboret. 2017. Review of Cattle Ticks (Acari, Ixodida) in Ivory Coast and Geographic Distribution of *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, an Emerging Tick in West Africa. Page: 2-5.
- Fatrowie, A.F. 2015. Perbedaan Toksisitas Ekstrak Daun Sirih Hijau dengan Berbagai Jenis Pelarut terhadap Mortalitas Larva Nyamuk *Aedes aegypti* L.[Karya Tulis Ilmiah]. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember.
- Hendrix, C.M and E. Robinson. 2006. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 3th Ed. Mosby Inc. an affiliate Elsevier Inc.
- Jongejan, F dan G. Uilenberg. 2004. The Global Importance Tick. J Agr Res. 19: 689-710.
- Neldawati, R., dan Gusnedi. 2013. Analisis Nilai Absorbansi dalam Penentuan Kadar Flavonoid untuk Berbagai Jenis Tanaman Obat. *Pillar of Physics*. Vol 2: 76-83.
- Wahyuwardhani, S. 1995. Pengaruh Perkembangan Tubuh Caplak *Boophilus microplus* Betina Dewasa terhadap Fertilitas Telurnya. Balai Penelitian Veteriner. 1(1): 43-47.
- Wardhana, A.H., A. Husein, dan J. Manurung. 2005. Efektifitas Ekstrak Biji Srikaya (*Annona squamosa* L.) dengan Pelarut Air, Metanol, dan Heksan terhadap Mortalitas Larva Caplak *Boophilus microplus* secara *In Vitro*. Balai Penelitian Veteriner. 10(2): 134-140.
- Wardani, R.K. 2012. Uji Efektifitas Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) terhadap *Aeromonas hydrophila*. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Airlangga.
- Wempi, I.G dan D.S. Permadi. 2013. Keanekaragaman Tanaman Obat sebagai Larvasida dalam Upaya Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD). Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan. 5(1): 12-20.

Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) Terhadap Mortalitas Larva *Boophilus microplus* Secara In Vitro

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | text-id.123dok.com
Internet Source | 2% |
| 2 | medpub.litbang.pertanian.go.id
Internet Source | 1% |
| 3 | journal.unair.ac.id
Internet Source | 1% |
| 4 | Joni Tandi, Rizaldy Lalu, Magfirah, Yunlis Silintowe Kenta, Ronaldy Nobertson. "Uji Potensi Nefropati Diabetes Daun Sirih Merah (<i>Piper croatum</i> Ruiz & Pav) pada Tikus Putih Jantan (<i>Rattus norvegicus</i>)", KOVALEN: Jurnal Riset Kimia, 2020
Publication | 1% |
| 5 | Retno Sri Wahjuni, M. Gandul Atik Yuliani. "The Isolation DNA Chromosomal DNA from Local Isolate of <i>Aeromonas hydrophila</i> Bacteria from East Java", Jurnal Vokasi Indonesia, 2018
Publication | 1% |

6	docobook.com Internet Source	1 %
7	repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id Internet Source	1 %
8	zombiedoc.com Internet Source	1 %
9	fr.scribd.com Internet Source	1 %
10	Wihdatul Karima, Syahrul Ardiansyah. "Lethal Efficacy of Banana Leaves Extract (<i>Musa paradisiaca</i> L.) Against <i>Aedes aegypti</i> Larvae", <i>Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology)</i> , 2021 Publication	1 %
11	docplayer.info Internet Source	1 %
12	cari2-cara.blogspot.com Internet Source	1 %
13	ejurnal.litbang.pertanian.go.id Internet Source	1 %
14	ojs.unud.ac.id Internet Source	1 %
15	mafiadoc.com Internet Source	1 %

16	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
17	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %
18	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
19	link.springer.com Internet Source	<1 %
20	123dok.com Internet Source	<1 %
21	adoc.tips Internet Source	<1 %
22	hasbifaza7.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	hitpi.org Internet Source	<1 %
24	patents.google.com Internet Source	<1 %
25	vdocuments.site Internet Source	<1 %
26	journals.ums.ac.id Internet Source	<1 %
27	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) Terhadap Mortalitas Larva *Boophilus microplus* Secara In Vitro

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4
