


JOURNAL

of Parasite Science

J. Parasite Sci.



Journal of Parasite Science

Vol. 3, No. 1, Maret 2019

Journal of Parasite Science memuat tulisan ilmiah dalam bidang Parasitologi
Frekuensi terbit dua kali satu tahun pada bulan **Maret dan
September**

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting:

Kusnoto

Sekretaris:

Poedji Hastutiek

Bendahara:

Endang Suprihati

Iklan dan Langganan:

Agus Sunarso

Penyunting Pelaksana:

Setiawan Koesdarto

Nunuk Dyah Retno Lastuti

Lucia Tri Suwanti

Muchammad Yunus

Mufasirin

Penyunting Penyelia:

Moch Arifudin

Alamat: Departemen Parasitologi, Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Airlangga; Kampus "C" Jl. Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992785; 5993016; Fax. (031) 5993015
e-mail: jparasitol@gmail.com ; jps@fkh.unair.ac.id
Rekening: BNI No. 0112443130 (a.n. Endang Suprihati)

Journal of Parasite Science diterbitkan oleh **Departemen Parasitologi,
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga, Surabaya.**

Journal of Parasite Science

Ketentuan untuk Penulisan Naskah

1. Ketentuan Umum
2. Ketentuan Umum
 - a. Journal of Parasite Science memuat tulisan ilmiah dalam bidang Parasitologi, berupa hasil penelitian, artikel ulasan balik (*review*) dan laporan kasus baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris.
 - b. Naskah/makalah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan. Apabila diterima untuk dimuat dalam Journal of Parasite Science, maka tidak boleh diterbitkan dalam majalah atau media yang lain.
3. Standar Penulisan
 - a. Makalah diketik dengan jarak 1 spasi, kecuali Judul, Abstrak, Judul tabel dan tabel, Judul gambar, Daftar Pustaka, dan Lampiran diketik menurut ketentuan tersendiri.
 - b. Alinea baru dimulai 3 (tiga) ketukan ke dalam atau (*First line 0.76 cm*) dari format paragraf.
 - c. Huruf standar untuk penulisan adalah Constantia 10.
 - d. Memakai kertas HVS ukuran A4 (8,27 x 11,69”).
 - e. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.
 - f. Tabel/Illustrasi/Gambar harus amat kontras, juga menyertakan *file scanning* (foto) terpisah dengan makalah dengan format file JPG. Keterangan Tabel, Gambar atau Penjelasan lain dalam Lampiran diketik 1 (satu) spasi.
4. Tata cara penulisan naskah / makalah ilmiah
 - a. Tebal seluruh makalah sejak awal sampai akhir minimal 18 halaman.
 - b. Penulisan topik (Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metode dst.) tidak menggunakan huruf kapital tetapi menggunakan *Title Case* (Capitalize Each Word) dan diletakkan di pinggir (sebelah kiri).
 - c. Sistematika penulisan makalah adalah Judul (Bahasa Indonesia dan Inggris), Nama Penulis dan Identitas, Abstract dengan Key words, Pendahuluan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih (bila ada), Daftar Pustaka dan Lampiran (bila ada).
 - d. Judul harus pendek, spesifik, tidak boleh disingkat dan informatif, yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - e. Nama penulis di bawah judul, identitas dan instansi penulis harus jelas, tidak boleh disingkat dan ditulis di bawah nama penulis.
 - f. Abstrak maksimal terdiri dari 200 (dua ratus) kata, diketik 1 (satu) spasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
 - g. Kata kunci (*key words*) maksimum 5 (lima) kata setelah abstrak.
 - h. Metode Penelitian memuat peralatan/bahan yang digunakan (terutama yang spesifik), prosedur penelitian dan analisis statistik (bila ada).
 - i. Daftar Pustaka disusun secara alfabetik tanpa nomor urut. Singkatan majalah/jurnal berdasarkan tata cara yang dipakai oleh masing-masing jurnal. Diketik 1 (satu) spasi dengan paragraf *hanging 0.3”* dan before 3.6 pt. Proporsi daftar pustaka, Jurnal/Majalah Ilmiah (60%), dan *Text Book* (40%). Berikut contoh penulisan daftar pustaka berturut-turut untuk *Text Book* dan Jurnal.

Roitt I, Brostoff J, and Male D. 1996. Immunology. 4th Ed. Black Well Scientific Pub. Oxford. pp. 23-41

Staropoli I, Clement JM, Frenkiel MP, Hofnung M, and Deuble V. 1996. Dengue-1 virus envelope glycoprotein gene expressed in recombinant baculovirus elicits virus neutralization antibody in mice and protects them from virus challenge. Am. J. Trop. Med. Hygi. 45: 159-167.
5. Pengiriman makalah dapat dilakukan setiap saat dalam bentuk cetakan (*print out*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Setelah ditelaah oleh Tim Penyunting, makalah yang telah direvisi penulis segera dikembalikan ke redaksi dalam bentuk cetakan 1 (satu) eksemplar dengan menyertakan makalah yang telah direvisi dan 1 (satu) Compac Disk (Progam MS Word/IBM Compatible) dikirim ke alamat redaksi: **Journal of Parasite Science**, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Kampus C Unair, Jalan Mulyorejo, Surabaya 60115, Telepon 031-599.2785; 599.3016; Fax. 031-599.3015; e-mail : jparasitol@gmail.com, jps@fkh.unair.ac.id
6. Ketentuan akhir

Terhadap naskah/makalah yang dikirim, redaksi berhak untuk:

 - a. memuat naskah/makalah tanpa perubahan
 - b. memuat naskah/makalah dengan perubahan
 - c. menolak naskah/makalah
7. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi naskah/makalah.
8. Makalah yang telah dimuat dikenai biaya penerbitan dan biaya pengiriman.
9. Penulis/pelanggan dapat mengirimkan biaya pemuatan makalah/langganan lewat **transfer-bank** pada Journal of Parasite Science **Fakultas Kedokteran Hewan UNAIR**, dengan nomor rekening **BNI No. 0112443130 (a.n. Endang Suprihati)**.
10. Semua keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat untuk keperluan itu.

Journal of Parasite Science

Vol. 3, No. 1, Maret 2019

Terbit tiap 6 bulan sekali, pada bulan Maret dan September

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi, penulis dan pembaca Journal of Parasite Science memberikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada para pakar di bawah ini, selaku mitra bestari yang telah menelaah semua tulisan baik yang dimuat maupun yang ditolak sesuai rekomendasi yang disampaikan pada redaksi dalam Volume 3 No. 1, edisi Maret 2019

Prof. Dr. Sri Subekti, drh., DEA. (P4I Cabang Surabaya)

Prof. Dr. Upiék Kesumawati Hadi, drh., MS. (FKH IPB)

April Hari Wardhana, SKH, M.Si, Ph.D. (Balai Besar Penelitian Veteriner Bogor)

Dr. Raden Wisnu Nurcahyo, drh. (FKH UGM)

Dr. Dwi Priyowidodo, drh., MP. (FKH UGM)

Dr. Nyoman Adi Suratma, drh., MP. (FKH UDAYANA)

Journal of Parasite Science

Vol. 3, No. 1, Maret 2019

Terbit tiap 6 bulan sekali, pada bulan Maret dan September

DAFTAR ISI

	Halaman
1 Identifikasi Larva Stadium Pertama (L ₁) dan Larva Stadium kedua (L ₂) <i>Toxocara cati</i> Secara Mikroskopis (Eny Coolfina Simarmata, Kusnoto, Mochamad Lazuardi, Setiawan Koesdarto, Endang Suprihati, Kuncoro Puguh Santoso)	1 - 4
2 Deteksi Protozoa Darah yang Menginfeksi Ayam Ras Pedaging di Peternakan desa Tanjung Gunung, Kabupaten Jombang (Marchelia Arifiandani, Endang Suprihati, Wiwik Misaco Yuniarti, Nunuk Dyah Retno Lastuti, Poedji Hastutiek, Sunaryo Hadi Warsito).....	5 - 8
3 Prevalensi Penyakit Protozoa Darah pada Sapi dan Kerbau di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat (Melani Anggraini, Hardany Primarizky, Mufasirin, Lucia Tri Suwanti, Poedji Hastutiek, Setiawan Koesdarto).....	9 - 14
4 Aktivitas Anthelmintika Ekstrak Etanol Daun Afrika (<i>Vernonia amygdalina</i>) Terhadap Mortalitas <i>Fasciola gigantica</i> Secara <i>in Vitro</i> (Dhio Asmaydo, Iwan Sahrial Hamid, Muchammad Yunus, Kusnoto, Muhammad Sukmanadi, Endang Suprihati).....	15 - 18
5 Uji Efektivitas Daya Antihelminik Ekstrak Etanol Daun Afrika (<i>Vernonia amygdalina</i>) Terhadap Cacing <i>Ascaridia galli</i> Secara <i>in vitro</i> (Amelia Dwita Safitri, Iwan Sahrial Hamid, Poedji Hastutiek, Setiawan Koesdarto, Rahmi Sugihartuti, Endang Suprihati).....	19 - 22
6 Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (<i>Piper crocatum</i>) Terhadap Mortalitas Larva <i>Boophilus microplus</i> Secara <i>In Vitro</i> (Meta Aprilia, Poedji Hastutiek, Rochmah Kurnijasanti, Lucia Tri Suwanti, Moh Sukmanadi, Endang Suprihati).....	23 - 26
7 Prevalensi dan Intensitas Infeksi Nematoda pada Persilangan Kuda di Pasukan Berkuda Parongpong Bandung Jawa Barat (Sesa Puput Febriyanti, Lucia Tri Suwanti, Eka Pramytha Hestinah, Setiawan Koesdarto, Boedi Setiawan, Kusnoto).....	27 - 32
8 Pengaruh Asam Folat Sebagai Terapi Pendukung Spiramycine pada Berat Janin terhadap <i>Toxoplasma gondii</i> - Tikus Hamil yang Terinfeksi (<i>Mus musculus</i>) (Alfina Azkiana, Boedi Setiawan, Erma Safitri, Lucia Tri Suwanti, Mufasirin, Djoko Legowo).....	33 - 36
9 Prevalensi Cestodes Usus Kecil pada Kambing di Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya (Bryan Ahmad Affan Lubis, Setiawan Koesdarto, Eka Pramytha Hestianah, Kusnoto, Lucia Tri Suwanti, Muhammad Yunus).....	37 - 40
10 Prevalensi dan Derajat Infeksi Cacing Saluran Pencernaan pada Ayam Buras (<i>Gallus domesticus</i>) di Desa Kramat Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan (Ellza Agatha Damayanti, Poedji Hastutiek, A.T. Soelih Estoepangestie, Nunuk Dyah Retno L, Kusnoto, Endang Suprihati).....	41 - 46

The Effectiveness of Ethanol Extract of Red Betel Leaf (*Piper crocatum*) Against Mortality of *Boophilus microplus* Larvae *In Vitro*

Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) Terhadap Mortalitas Larva *Boophilus microplus* Secara *In Vitro*

¹⁾Meta Aprilia, ²⁾Poedji Hastutiek, ³⁾Rochmah Kurnijasanti, ²⁾Lucia Tri Suwanti, ³⁾Moh
Sukmanadi, ²⁾Endang Suprihati

¹⁾Student, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga.

²⁾Department of Veterinary Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga.

³⁾Department of Basic Veterinary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Universitas Airlangga.

Received: 25-02-2019 , Accepted: 10-03-2019 , Published Online: 19-03-2019

Abstract

The aims of this study is to know the effectiveness of ethanol extract of red betel leaf (*Piper crocatum*) against mortality of *Boophilus microplus* Larvae *in vitro*, as well as knowing lethal concentration 50 (LC₅₀) and lethal concentration 90 (LC₉₀). Method that used in the research was completely randomized design. There were five treatments and each treatment was done in five replications. This research used ten *Boophilus microplus* larvae in each treatment for all replication. The observation and recording of mortality was done at 1, 2, 3, 4, and 5 hours. *Boophilus microplus* larvae were declared dead if there was no movement. The obtained data was analyzed using ANOVA factorial. The result of this research show that ethanol extract of red betel leaf (*Piper crocatum*) has effectiveness against mortality of *Boophilus microplus* larvae *in vitro*. In the extract 10% concentration, there is effectiveness that almost the same as Noticks®. The higher concentration of the extract, the higher the effectiveness against mortality larvae. In probit analysis show that LC₅₀ achieved by concentration 5,4% or 2.700mg/50ml and LC₉₀ achieved by concentration 11,3% or 5.650mg/50ml.

Keywords: Red Betel Leaf, Mortality, *Boophilus microplus* Larvae

Pendahuluan

hingga saat ini kegiatan pengembangan ternak di Indonesia belum dapat mencapai titik yang diharapkan, kondisi ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat (Bamuallim, 2007), salah satu faktor penghambat tersebut salah satunya mengenai masalah kesehatan ternak. Masalah kesehatan ternak di Indonesia masih menjadi satu bahasan yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara menyeluruh, salah satu masalah kesehatan ternak yang masih dianggap serius adalah akibat serangan caplak. Indonesia yang memiliki iklim tropis menjadi faktor penunjang pertumbuhan caplak yang sangat cepat. Salah satu spesies caplak yang sering dijumpai keberadaannya di Indonesia adalah caplak *Boophilus microplus*. Caplak tersebut memiliki dua fase selama kehidupannya yakni fase parasitik dimulai dari larva hingga dewasa dan fase non parasitik dimulai dari telur hingga larva (Verdonck, 2013). Kerugian ekonomis terjadi karena caplak menghisap darah *B.*

microplus dapat menghisap darah sehingga dapat menyebabkan anemia (Jongejan dan Uilenberg, 2004). Seekor caplak dapat menghisap darah sebanyak 0,3 ml sehari sehingga dapat mengganggu pertumbuhan, menimbulkan kegatalan, bahkan dapat merusak kulit karena menimbulkan jaringan nekrotik pada kulit yang mengakibatkan harga kulit ternak turun (Wahyuwardani, 1995) selain itu caplak *B. microplus* merupakan vektor dari penyakit babesiosis dan anaplasmosis yang banyak menyebabkan kematian pada ternak (Boka *et al.*, 2017)

Banyaknya masalah yang ditimbulkan akibat serangan caplak *B. microplus* memerlukan penanganan yang serius. Penanganan kasus caplak di peternakan yang hingga saat ini masih sering dilakukan adalah dengan menggunakan bahan kimia yang memiliki efek sebagai insektisida, namun penggunaan insektisida sintetik dapat menimbulkan dampak negatif seperti berkembangnya ras resisten, terbunuhnya predator alami hama, keracunan pada

manusia dan hewan ternak penyebab kanker, residu pada daging dan susu, dan pencemaran lingkungan (Wardhana dan Diana, 2014). Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan menyebabkan perlu adanya alternatif lain. Insektisida nabati yang berasal dari tanaman dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Daun sirih merah (*Piper crocatum*) menjadi salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat salah satunya dapat digunakan sebagai kandungan flavonoid dari daun sirih merah memiliki kadar lebih tinggi dari daun sirih hijau, sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan (Neldawati dan Gusnedi, 2013) kandungan sirih merah berupa flavonoid yang terbagi atas flavon dan flavonol memiliki jumlah lebih tinggi dibanding kadar flavonoid daun sirih, daun katuk, dan daun ekor naga. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatrowie (2015) menggunakan tanaman sirih hijau (*Piper betle*) terbukti efektif sebagai larvasida. Kesamaan kandungan yang ada di dalam daun *P. crocatum* dan *P. betle* menjadi dasar acuan bahwa daun sirih merah dapat digunakan sebagai larvasida terhadap *Boophilus microplus*, karena penelitian daun sirih merah sebagai insektisida ataupun larvasida masih sangat jarang dilakukan.

Materi dan Metode Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simplisia daun sirih merah, aquadest, etanol 96% tekhnik, noticks® mengandung 10g coumaphos, Tween 80.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kain kasa, jarum penusuk tumpul, timbangan digital, pipet, spuit, rotary evaporator, mesin giling, botol spray dengan volume 10 ml, cawan petri, kertas saring, kapas, spuit 10 ml.

Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*)

Daun sirih merah dicuci dengan air mengalir dan didiamkan selama semalam. Selanjutnya dipotong kecil - kecil dan dikeringkan dengan cara diangin - anginkan dalam ruangan, tidak terkena sinar matahari secara langsung selama 3 hari. Daun diangin-anginkan hingga terbentuklah simplisia. Simplisia dihaluskan hingga menjadi serbuk dengan cara digiling. Serbuk yang diperoleh kemudian diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96% selama 3 kali 24 jam, dan diambil filtratnya. Filtrat diupkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator dengan suhu

50°C dengan kecepatan 40 rpm, hingga diperoleh ekstrak daun sirih merah yang kental. Hasil ekstrak kemudian diencerkan menggunakan Tween 80 2% lalu dilakukan perhitungan sesuai konsentrasi yang telah ditentukan.

Koleksi Sampel Larva *B. microplus*

Larva *B. microplus* didapat dari caplak dewasa betina fase *engorged* yang berjumlah 5 ekor dan masing-masing ditempatkan di wadah tabung, kemudian dilakukan proses *rearing* pada caplak hingga didapatkan telur yang dikeluarkan secara berkala. Telur ditunggu hingga menetas menjadi larva kemudian ditunggu kembali hingga larva berumur tujuh hari. Sebanyak 250 ekor larva berumur tujuh hari diambil secara acak, kemudian dibagi ke dalam lima kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 10 larva *B. microplus*. Setiap perlakuan terdiri atas lima pengulangan. Kelompok perlakuan terdiri dari K-, K+, P1, P2, P3.



Gambar 1. Caplak *B. microplus* Betina yang sedang Bertelur.

Pemberian Perlakuan

Kelompok kontrol negatif disemprot menggunakan Tween 80 2% tanpa ekstrak daun sirih merah. Kelompok kontrol positif disemprot menggunakan insektisida yang mengandung 10g coumaphos. Kelompok perlakuan satu disemprot menggunakan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah dan Tween 80 2% dengan konsentrasi 2,5%. Kelompok perlakuan dua disemprot menggunakan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah dan Tween 80 2% dengan konsentrasi 5%. Kelompok perlakuan tiga disemprot menggunakan suspensi ekstrak etanol daun sirih merah dan Tween 80 2% dengan konsentrasi 10%. Penyemprotan sebanyak empat kali pada masing-masing kelompok dan ulangnya dilakukan dengan jarak yang sama.

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan analisis varian

(ANOVA) dua arah atau faktorial dilanjutkan uji Duncan dan untuk mengetahui *Lethal Concentration 95* (LC95) maka digunakan metode uji probit. Analisis statistika dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows 22.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap angka mortalitas larva *B. microplus* berdasarkan pemberian berbagai macam perlakuan dan dihubungkan dengan waktu kematian tercepat yang dibutuhkan dapat dilihat dalam Tabel 1.

Terlihat dari Tabel 1 bahwa pada jam ke dua dengan EDS 10% menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dengan penggunaan coumaphos dengan angka mortalitas larva yang tinggi 84%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan EDS 10% memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dan cepat terhadap mortalitas larva *B. microplus* bila dibandingkan dengan penggunaan EDS 2,5% dan 5%. Maka dari itu dilakukan uji probit terhadap ketiga konsentrasi EDS 2,5%; 5%; dan 10% dalam waktu pengamatan dua jam agar diperoleh LC₅₀ dan LC₉₀. Hasil dari uji probit memberikan


LC₅₀ sebesar 2.700mg/50ml setara dengan 5,4% dan LC₉₀ sebesar 5.650mg/50ml setara dengan 11,3%. Pengujian *Lethal Concentration* ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas ekstrak sirih merah terhadap mortalitas larva terhitung mulai dari LC₅₀ yang menggambarkan jumlah konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh 50% populasi sampel dan LC₉₀ yang menggambarkan jumlah konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh 90% populasi sampel.

Tingkat mortalitas larva *B. microplus* mulai jam kesatu hingga jam kelima tergambar dari grafik pada Gambar 1.1 terlihat bahwa terjadi peningkatan mortalitas larva setiap jam dalam perlakuan yang sama, namun pada perlakuan yang berbeda memberikan hasil atau tingkat efektivitas yang berbeda terhadap mortalitas larva *B. microplus*. Penggunaan insektisida yang mengandung coumaphos telah efektif terhadap mortalitas larva setelah 1 jam penyemprotan dan memberikan hasil optimum pada jam ke 3. Penggunaan EDS 2,5% dan 5% juga efektif terhadap mortalitas larva namun belum dapat mencapai optimum hingga jam ke 5, sedangkan pada EDS 10% telah mencapai titik optimum pada jam ke 5.


Tabel 1. Rata-rata Prosentase dan Simpangan Baku Pengamatan Mortalitas Larva *B. Microplus* Berdasarkan Interaksi Perlakuan dan Waktu

Perlakuan	Waktu (jam ke)				
	1	2	3	4	5
K- (aquadest+tween 80)	8 ^a ± 8,36	14 ^a ± 5,47	16 ^a ± 8,94	18 ^a ± 8,94	20 ^{ab} ± 7,07
K+ coumaphos	86 ^{fg} ± 13,41	96 ^{gh} ± 5,47	100 ^h ± 0,00	100 ^h ± 0,00	100 ^h ± 0,00
EDS 2,5%	16 ^a ± 15,16	22 ^{ab} ± 8,36	38 ^{cd} ± 13,03	50 ^d ± 7,07	74 ^{ef} ± 23,02
EDS 5%	34 ^{bc} ± 11,40	50 ^d ± 7,07	68 ^e ± 13,03	82 ^{efg} ± 20,49	92 ^{gh} ± 13,03
EDS 10%	68 ^e ± 14,83	84 ^{fg} ± 11,40	90 ^{gh} ± 14,14	96 ^{gh} ± 8,94	100 ^{gh} ± 0,00

a,b,e,d,e,f,g, dan h Superskrip yang berbeda dalam kolom yang sama, menunjukan perbedaan yang nyata (p<0,05)



Gambar 2. Grafik Presentase Mortalitas Larva *B. microplus* K- (Aquadest+tween80),K+ (Coumaphos), P1 (EDS2,5%), P2 (EDS 5%), dan P3 (EDS 10%).



Gambar 3. Larva *B. microplus* yang Mati (Kaki Larva Menggulung).

Kemampuan ekstrak etanol daun sirih merah untuk mempengaruhi mortalitas larva *B. microplus* karena adanya bahan aktif tertentu seperti flavonoid, alkaloid, minyak atsiri, dan saponin. Alkaloid juga memiliki fungsi sebagai pestisida nabati (Wempi dan Permadi., 2013), alkaloid memiliki kemampuan berikatan dengan DNA hal ini menyebabkan adanya zat diantara DNA yang akan menghambat replikasi DNA akibatnya terjadi gangguan replikasi DNA yang akhirnya akan menyebabkan kematian sel. Kemampuan ekstrak etanol daun sirih merah (*Piper crocatum*) sebagai larvasida berbanding lurus dengan semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya, hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani pada tahun 2012 mengenai penggunaan ekstrak daun sirih merah terhadap *Aeromonas hydrophila* menunjukkan hasil pada konsentrasasi 12,5% telah mampu menghambat pertumbuhan bakteri, dan pada konsentrasi 25% dapat mem-bunuh bakteri. Hasil yang didapat secara signifikan mengalami kenaikan antara semakin tingginya konsentrasi sirih merah yang digunakan angkat penghambatan pertumbuhan dan kematian bakteri juga semakin tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, ekstrak etanol daun sirih merah *P. crocatum* efektif terhadap mortalitas larva caplak *B. microplus* secara *in vitro* dengan menggunakan konsentrasi 10% mampu menyebabkan kematian larva 100% pada jam kelima dan LC_{50} ekstrak etanol daun sirih merah dapat dicapai dengan jumlah ekstrak 2.700mg/50ml yang setara dengan 5,4% dan LC_{90} dicapai dengan jumlah ekstrak 5.650mg/50ml yang setara dengan 11,3%.

Daftar Pustaka

- Bamuallim, A.M. 2007. Produksi Peternakan Di Indonesia: Potensi dan Kendala Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Hal: 22-24.
- Boka, O.M., L. Achi, H. Adakal. A. Azokou, P. Yao, Y.G. Yapi, M. Kone, K. Dagnogo, and Y.Y. Kaboret. 2017. Review of Cattle Ticks (Acari, Ixodida) in Ivory Coast and Geographic Distribution of *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, an Emerging Tick in West Africa. Page: 2-5.
- Fatrowie, A.F. 2015. Perbedaan Toksisitas Ekstrak Daun Sirih Hijau dengan Berbagai Jenis Pelarut terhadap Mortalitas Larva Nyamuk *Aedes aegypti* .L.[Karya Tulis Ilmiah]. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jember.
- Hendrix, C.M and E. Robinson. 2006. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 3th Ed. Mosby Inc. an affiliate Elsevier Inc.
- Jongejan, F dan G. Uilenberg. 2004. The Global Importance Tick. J Agr Res. 19: 689-710.
- Neldawati, R., dan Gusnedi. 2013. Analisis Nilai Absorbansi dalam Penentuan Kadar Flavonoid untuk Berbagai Jenis Tanaman Obat. *Pillar of Physics*. Vol 2: 76-83.
- Wahyuwardhani, S. 1995. Pengaruh Perkembangan Tubuh Caplak *Boophilus microplus* Betina Dewasa terhadap Fertilitas Telurnya. Balai Penelitian Veteriner. 1(1): 43-47.
- Wardhana, A.H., A. Husein, dan J. Manurung. 2005. Efektifitas Ekstrak Biji Srikaya (*Annona squamosa* L.) dengan Pelarut Air, Metanol, dan Heksan terhadap Mortalitas Larva Caplak *Boophilus microplus* secara *In Vitro*. Balai Penelitian Veteriner. 10(2): 134-140.
- Wardani, R.K. 2012. Uji Efektifitas Daun Sirih Merah (*Piper crocatum*) terhadap *Aeromonas hydrophila*. [Skripsi]. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Airlangga.
- Wempi, I.G dan D.S. Permadi. 2013. Keanekaragaman Tanaman Obat sebagai Larvasida dalam Upaya Pengendalian Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD). Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan. 5(1): 12-20.



SURAT KETERANGAN
Nomor : 2934/UN3.1.6/KP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP
NIP : 196201161992032001
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Madya / (Gol. IV/d)
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Endang Suprihati, drh., MS
NIP : 195810211983112001
Pangkat / Golongan : Pembina TK I / (Gol. IV/b)
Jabatan : Lektor Kepala

Telah melaksanakan penelitian dengan judul sebagai berikut :

No.	Judul Karya Ilmiah	Tahun pelaksanaan Penelitian
1.	Morphological Detection of The Intestinal Parasite Blastocystis sp. In Fresh and Cultured Feces of Pet Sugar Glider (<i>Petaurus breviceps</i>) (Mammalia: Petauridae) In Surabaya, Indonesia.	2018
2.	Identification of Active Compounds of Ethanol Extract of Citrus amblycarpa leaves by Analysis of Thin-layer Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectrometry as Bioinsecticide Candidates for Mosquitoes	2020
3.	Histopathological studies on <i>Leucocytozoon Caulleryi</i> infection on broiler in endemic area of Indonesia	2020
4.	Potential Extract Ethanol Citrus Amblycarpa as a Bioinsecticide Against <i>Aedes Aegypti</i> Larvae	2021
5.	Protein Profile of Sporozoite of <i>Leucocytozoon</i> sp. from <i>Culicoides</i> sp.	2010
6.	Deteksi <i>Cryptosporidium canis</i> pada Anjing di Kota Surabaya	2020
7.	Eksplorasi Protein Antigenik <i>Leucocytozoon caulleryi</i> sebagai Kit Diagnostik <i>Leucocytozoonosis</i> pada Ayam Broiler	2013



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015

Laman: <http://www.fkh.unair.ac.id>, e-mail: info@fkh.unair.ac.id

8.	Uji reaktivitas protein 30 kDA bakteri <i>Aeromonas hydrophila</i> yang diisolasi dari ikan air tawar dengan teknik indirect ELISA.	2016
9.	Penambahan Sari Air Laut (Nigarin) Dalam Pengencer Skim Kuning Telur Terhadap Viabilitas Dan Motilitas Spermatozoa Sapi Limousin Post Thawing	2018
10.	The Effectiveness of Ethanol Extract of Red Betel Leaf (<i>Piper crocatum</i>) Against Mortality of <i>Boophilus microplus</i> Larvae In Vitro	2020
11.	Prevalence of Ectoparasites in Bean Goats on the Sub-District of Prambon, District of Nganjuk	2020
12.	Repellent Effectiveness of Permot Leaf Ethanol Extract (<i>Passiflora Foetida</i> Linn.) against <i>Aedes Aegypti</i> Adult Mosquitoes	2021
13.	Detection of Goat Digestive Tract Protozoa Through Feces Examination in Kwanyar Sub-District, Bangkalan District	2021
14.	Identification and Prevalence of Digestive Tract Endoparasites of Goats in Ujungpangkah, Gresik District	2021
15.	Morphology of surface ultrastructure of <i>Duthiersia expansa</i> (Cestoda Diphyllobothriidea) from water lizards (<i>Varamus salvator</i>) from Sidoarjo, Indonesia	2014
16.	Antigenic Protein of <i>Leucocytozoon caulleryi</i> schizont Inducing Cellular Immune Resonse: TLR-2 and CD4 as Marker	2017

Adapun penelitian tersebut tidak perlu dilakukan *Uji Etical Clearence* karena tidak menggunakan hewan coba.

Demikian surat kerangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan pengusulan Jabatan Fungsional **Guru Besar**

Surabaya, 8 Agustus 2022

Dekan,



Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP
NIP. 196201161992032001

