

9

by Yiyik Windah Yulianti

Submission date: 20-Dec-2021 07:34PM (UTC+0800)

Submission ID: 1734197182

File name: 9.pdf (173.56K)

Word count: 3668

Character count: 20965

8
PIGMEN RUMPUT LAUT MERAH (*Acanthophora spicifera*) SEBAGAI ALTERNATIF PEWARNA ALAMI PADA PRODUK SOSIS IKAN LELE DUMBO (*Clarias gariepinus*)

25
SEAWEED RED PIGMENT(*Acanthophora spicifera*) AS AN ALTERNATIVE IN PRODUCING NATURAL DYES OF CATFISH (*Clarias gariepinus*) SAUSAGE PRODUC

Yiyik Windah Yulianti¹, Moch. Amin Alamsjah² dan Riesta P.H.³

¹³
¹Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Kampus B Jl. 18 Langga 4-6 Surabaya, 60286 Telp. 031-5041566

²Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo - Sura 27 a, 60115 Telp. 031-5911451

³Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo – Surabaya, 60115

Abstract

Aquatic resources that have great potential to be developed is a pigment obtained from seaweed. According Winarno (1996), seaweeds are classified into three classes, namely red algae (Rhodophyceae), brown algae (Phaeophyceae) and green algae (Chlorophyceae). There are three main types of pigment in the seaweed, namely: chlorophyll, carotenoids, and phycocyanin (Lila, 2004). Each type of pigment that provides different benefits to human life. Red seaweed spicifera types Acanthophora be extracted and taken the pigment has a branch color (thallus) are varied, due to the pigment composition consisting of chlorophyll a, chlorophyll d, and fikobiliprotein (R-phycocyanin, allofikosianin and fikoeritrin) (Lee, 2008) . Fikoeritrin is the dominant pigment in red algae, thus giving the appearance of red on the thallus.

The use of pigments is very important not only in the food and beverages, but also in medicines, cosmetics and pharmaceutical industrial. It is one of the determinants of consumer acceptance of products offered. Source of pigments used are also used by consumers as one of the indicators in assessing the quality of a product. The use of natural or synthetic dyes in the product will enhance the visual appeal that will increase consumer preference for products offered, therefore, the use of natural dye for industrial cannot be avoided.

Based on the description above, this study will extract the pigment from red algae (*A. spicifera*) with a polar solvent (ethanol, distilled water) which will be used as a dye in catfish sausage with different proportions and determine the color stability during storage at cold temperatures and using the analytical method for determining the wavelength spectrophotometer fikoeritrin extraction results.

The aim of the study is getting the appropriate method to produce the red pigment of seaweed *A. spicifera*, obtain the pigment concentrate that can be applied to the catfish sausage and determine the stability of the color pigment *A. spicifera* on application of catfish sausages during storage.

The study consisted of two examination to obtain the best dose of *A. spicifera* pigment. The first step is to find wavelength of fikoeritrin. The design of the study is completely randomized design RAK with 12 treatments and 3 replications.

The results of the study showed that the red pigment *A. spicifera* can be used as a dye in catfish sausage with the best concentration of 0.75%. Concentration and storage time catfish sausage significant effect on the intensity of reddish and yellowish color, but not significantly different to the intensity of brightness and water content. The concentration of pigment *A. spicifera* different in catfish sausage on organoleptic test gives a significant difference in color, smell and flavor

Keywords : pigment, concentration, stability

Pendahuluan

Rumput laut dengan spesies beraneka ragam di Indonesia mempunyai potensi nilai tambah yang sangat tinggi dan mempunyai manfaat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. namun sampai saat ini belum banyak dilakukan penelitian. Selama ini, negara Indonesia masih mengimpor pigment alami dari Tiongkok

maupun Amerika. Menurut Limantara dan Heriyanto (2010) bahwa rumput laut coklat yang mengandung pigment fukoxanthin setelah dihasilkan pigment, maka harganya menjadi 20.000.000 kali lebih tinggi. Mengingat potensinya yang sangat besar, maka pemerintah Indonesia telah menjadikan rumput

Pigmen Rumput Laut Merah.....

laut sebagai salah satu komoditi unggulan program revitalisasi kelautan.

[1] Menurut Winarno (1992) pewarna alami tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka penggunaan pewarna alami sangat dianjurkan pada berbagai kebutuhan hidup manusia. Tingginya kebutuhan pewarna alami dalam kehidupan tersebut menuntut dilakukannya berbagai penelitian dari berbagai sumber biota alam yang dapat menghasilkan pigmen alam dengan harga yang terjangkau.

Sumberdaya perairan yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan adalah pigmen yang diperoleh dari rumput laut. Rumput laut merah jenis *Acanthophora spicifera* yang akan diekstraksi dan diamplifikasi mempunyai warna cabang (thallus) yang bervariasi, disebabkan adanya komposisi pigmen yang terdiri dari klorofil a, klorofil d, dan fikobiliprotein (*R*-fikosianin, allofikosianin serta fikoeritrin) (Lee, 2008). Fikoeritrin merupakan pigmen dominan pada alga merah, sehingga memberikan kenampakan merah pada thallus.

Pemakaian pigmen dalam industri makanan dan minuman, serta pada industri obat-obatan, kosmetika dan farmasi memberikan pengaruh yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor penentu penerimaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Sumber pigmen yang dipergunakan juga dipakai oleh konsumen sebagai salah satu indikator dalam menilai mutu suatu produk.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan metode yang tepat untuk menghasilkan pigmen merah dari rumput laut *A. spicifera*, mendapatkan konsentrasi pigmen yang tepat dapat diaplikasikan pada sosis ikan lele dumbo serta mengetahui stabilitas warna pigmen *A. spicifera* pada aplikasi sosis ikan lele dumbo selama masa penyimpanan.

15 **Materi dan Metode**

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Agroekoteknologi, Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo, Laboratorium ULP dan Laboratorium Fakultas Farmasi Universitas Airlangga pada bulan Oktober 2014 – Januari 2015

Materi Penelitian

Peralatan Penelitian

Peralatan yang dipergunakan dalam pembuatan pigmen dan sosis ikan lele dumbo adalah : panci besar, timbangan, pisau, gunting,

talenan, timbangan, kompor, gelas ukur, pengaduk, stuffler, food processor, cassing dan benang ikat sosis.

Peralatan laboratorium dalam penelitian yang dipergunakan adalah : bermacam-macam alat gelas, kertas saring whatman no. 41, thermometer, spektrofotometer UV-Vis, Ultrasonik (Elma), Rotary evaporator (Buchi R-210), freeze drying christ (Beta 1-8 K), timbangan digital, pipet, color reader CR-10 (Minolta Co.Ltd., Jepang), kulkas dan lain-lain.

16 **Bahan Penelitian**

Bahan baku yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rumput laut jenis *A. spicifera* dewasa yang tumbuh di pinggir pantai dan karang, diamplifikasi dari daerah pulau Kangean Kabupaten Sumenep. Setelah diamplifikasi, kemudian rumput laut dibawa menggunakan polyback dan ditaruh pada coolbox atau sterofoam yang telah diberi es batu, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerusakan pigmen karena cahaya maupun kenaikan suhu.

Rancangan Penelitian

Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan pigmen merah dari *A. spicifera* dengan metode yang tepat yang dibuktikan dengan pengukuran panjang gelombang mempergunakan spektrofotometer UV-vis.

Penelitian utama, setelah diperoleh metode yang tepat dengan menghasilkan panjang gelombang pigmen yang sesuai, kemudian pigmen yang diperoleh diaplikasikan pada sosis ikan lele dumbo yang bertujuan untuk mengetahui faktor K adalah konsentrasi (%) dan faktor H adalah [30] masa penyimpanan (hari) terhadap stabilitas warna sosis ikan lele dumbo pada penyimpanan suhu dingin. Penelitian utama memakai Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 12 perlakuan, yaitu sosis ikan lele dumbo tanpa penambahan pigmen *A. spicifera* penyimpanan 1 hari (KOH1), penyimpanan 5 hari (KOH5) dan penyimpanan 10 hari (KOH10). Sosis ikan lele dumbo dengan penambahan pigmen 0,50 % dengan penyimpanan 1 hari (K1H1), penyimpanan 5 hari (K1H5) dan penyimpanan 10 hari (K1H10). Sosis ikan lele dumbo dengan penambahan pigmen 0,75 % dengan penyimpanan 1 hari (K2H1), penyimpanan 5 hari (K2H5) dan penyimpanan 10 hari (K2H10). Sosis ikan lele dumbo dengan penambahan pigmen 0,100 % dengan penyimpanan 1 hari (K3H1), penyimpanan 5 hari (K3H5) dan penyimpanan 10 hari (K3H10). Masing-masing

perlakuan diulang 3 kali sehingga didapat 36 perlakuan.

Analisis Data

- Analisa optimasi fikoeritrin pigmen rumput laut *A. spicifera* dengan menggunakan spektrofotometer UV-visible light (Shimadzu, Kyoto).
- Perhitungan perkiraan kadar fikoeritrin dalam 1 gram pigmen dengan rumus :
Total mg fikoeritrin =
$$\frac{\text{OD at } 566 \text{ nm} \times \text{volume (in ml) extract}}{8.20}$$
- Analisis kadar air metode oven vakum.
- Analisa intensitas warna dengan metode L*a*b* Twinter menggunakan color reader (Yuwono dan Susanto, 1998).
- Uji organoleptik meliputi bau, warna dan rasa (Rahayu, 2001).
- Perhitungan perlakuan terbaik (De Garmo, Sullivan dan Canada, 1984)

Data penelitian dianalisis secara statistik dengan Analisa Varian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Pengukuran pada percobaan penelitian menggunakan perbandingan konsentrasi pigmen pada produk sosis ikan, yaitu : 0 % (A); 0.5 % (B); 0.75 % dan (C); 1 % yang terdapat 12 perlakuan dan diulang 3 kali. Data pengolahan dilakukan pada hasil penelitian dengan membuat tabel dan mencari kondisi yang optimum dari variabel-variabel yang ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan


Pada penelitian utama, setelah diperoleh pigmen kering *A. spicifera* kemudian dilakukan spektrofotometer dengan pelarut aquadest. Gambar 6 memperlihatkan bahwa panjang gelombang maksimal pigmen merah *A. spicifera* berada pada kisaran 560-585 nm, dengan puncaknya berada pada panjang gelombang 566 nm.

Berdasarkan panjang gelombang yang diperoleh pada spektrofotometer diatas, maka diperkirakan kadar fikoeritrin dalam 1 gram pigmen adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Total mg fikoeritrin} &= \\ \text{OD . at } 566 \text{ nm} \times \text{volume (in ml) extract} &= \\ 8.20 &= 0.52 \times 100 \\ 8.20 &= 6.3 \text{ mg} \end{aligned}$$

Hasil uji color reader kecerahan pada produk sosis ikan lele dumbo yang telah di beri pigmen merah *A. spicifera* adalah seperti pada Tabel 3.

Rerata nilai warna kecerahan pada berbagai kombinasi konsentrasi pigmen *A. spicifera* dan lama penyimpanan sosis ikan lele dumbo berkisar antara 5.6-7.1. Sedangkan perlakuan konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* dan interaksi antara kedua perlakuan menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap nilai warna kecerahan pigmen merah *A. spicifera* ($\alpha=0.05$).



Gambar 6. Panjang gelombang pigmen *Acanthophora spicifera* dengan pelarut aquadest

Keterangannya : Angka pada kolom dengan
berbeda menyatakan
supercript berbeda menyatakan
beda nyata pada uji DMR^t

Rerata nilai warna kekuningan pada
berbagai koncentrasi pigmen tersebut *A. spicifera*
dan lama penyimpanan sosis ikian lele dumbo
berkisar antara 26,1 - 62,1. Perbedaan
koncentrasi dan interaksi kedua pertakuan
menunjukkan pengaruh nyata terhadap nilai
warna kekuningan sosis ikian lele dumbo ($\alpha = 0,05$). Pengaruh perbedaan koncentrasi pigmen
march *A. spicifera* dan lama penyimpanan
terhadap nilai warna kekuningan denistitas
berambahan yang nyata pada uji DMR^t.

Keterangannya : Angka pada kolom dengan
berbeda menyatakan beda nyata pada
supercript berbeda menyatakan
beda nyata pada uji DMR^t ($\alpha=0,05$)

Ko (0)	H1	10,6 ^a
K1 (0,5)	H1	48,2 ^b
K2 (0,75)	H1	36,3 ^b
K3 (1)	H1	29,6 ^c
KO (0)	H1	62,1 ^a
K1 (0,5)	H5	51,3 ^a
K2 (0,75)	H10	48,2 ^b
K3 (1)	H5	37 ^b
KO (0)	H10	46,3 ^b

Table 4. Rerata Warna Kemerahan Sosis Ikan
Acanthophora spicifera dan Lama
Penyimpanan (%) Penyimpanan Ratna-Ratna
Koncentrasi Lama Penyimpanan Ratna
Penyimpanan

Hasil uji color reader menunjukkan bahwa
kekuningan pada produk sosis ikian lele dumbo
yang telah di bercampur dengan mikroorganisme
kecuali sebagian besar kultur :

dengan pembandahan pigmen march *A. spicifera*.
march *A. spicifera* akan meningkat ketika
dipertahankan bahwa rerata warna kemerahan
sosis ikian lele dumbo cenderung pada kontrol
lama penyimpanan 1 hari dari rerata ketika
pada penyimpanan 1 hari 0,100 % pada penyimpanan 1
hari. Intensitas warna kemerahan pada kontrol
dumbo ($\alpha=0,05$). Pada tabel tersebut
terdapat nilai warna kemerahan sosis ikian lele
dumbo ($\alpha=0,05$). Pada sosis ikian lele dumbo
perbedaan nyata antara kedua pertakuan
A. spicifera dan interaksi antara kedua
pertakuan menunjukkan pengaruh sangat nyata
pada pertakuan sosis ikian lele dumbo ($\alpha=0,05$).
Pengaruh pertakuan sosis ikian lele dumbo
menunjukkan pengaruh nyata terhadap nilai
warna kekuningan sosis ikian lele dumbo ($\alpha=0,05$).

Keterangannya : Angka pada kolom dengan
berbeda menyatakan beda nyata pada uji DMR^t
supercript berbeda menyatakan
beda nyata pada uji DMR^t ($\alpha=0,05$)

Ko (0)	H1	71,4 ^a
K1 (0,5)	H10	68,1 ^a
K2 (0,75)	H10	63,9 ^a
K3 (1)	H1	61,9 ^a
KO (0)	H10	65,4 ^a
K1 (0,5)	H5	61,5 ^a
K2 (0,75)	H10	63,9 ^a
K3 (1)	H1	61,9 ^a
KO (0)	H1	69,3 ^a

Table 3. Rerata Warna Kccerahan Sosis Ikan
Acanthophora spicifera dan Lama
Penyimpanan (%) Penyimpanan Ratna-Ratna
Koncentrasi Lama Penyimpanan Ratna
Penyimpanan

Kadar air sosis ikan lele dumbo yang telah diberi pigmen *A. spicifera* dengan proporsi yang berbeda, adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Rerata Kadar Air Sosis Ikan Lele Dumbo Akibat Pengaruh Konentrasi Pigmen Merah <i>Acanthophora spicifera</i> dan Lama Penyimpanan		
Perlakuan	Rata-Rata Kadar Air	
Konsentrasi Pigmen (%)	Lama Penyimpanan (hari)	(%)
K0 (0)	H1	77.05 ^a
	H5	91.47 ^a
	H10	55.06 ^a
K1 (0.5)	H1	54.67 ^a
	H5	84.63 ^a
	H10	64.18 ^a
K2 (0.75)	H1	76.77 ^a
	H5	76.99 ^a
	H10	77.80 ^a
K3 (1)	H1	68.72 ^a
	H5	72.17 ^a
	H10	90.76 ^a

Keterangan : Angka pada kolom dengan superscript berbeda menyatakan bedanya pada uji DMRT ($\alpha=0.05$)

Tabel 6. Menunjukkan rerata kadar air sosis ikan lele dumbo terendah pada konsentrasi 0,50 % dengan penyimpanan 1 hari, yaitu 54,67 dan tertinggi adalah konsentrasi 0 % pada penyimpanan 5 hari yaitu 91,47. Lama penyimpanan sosis ikan lele dumbo cenderung memiliki kadar air yang meningkat namun masih stabil, hal tersebut dibuktikan dengan kadar air sosis ikan lele dumbo selama penyimpanan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Hasil uji organoleptik warna dengan skala hedonik 1-5 (suka-sangat tidak suka) sosis ikan lele dumbo yang diberi pigmen *A. spicifera* dengan proporsi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 7.

Hasil skor uji organoleptik terhadap warna sosis ikan lele dumbo berkisar antara 1,5-3,5 ($\alpha=0,05$), sedangkan total rangking penilaian panelis terhadap warna dari sosis ikan lele dumbo berkisar antara 3,2 - 4,7. Hasil uji lanjut Friedman pada Lampiran 15 terhadap tingkat kesukaan panelis pada warna sosis ikan lele dumbo akibat pengaruh konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* berbeda memberikan hasil signifikan ($\alpha=0,05$).

Tabel 7. Total Rangking Nilai Kesukaan Warna Sosis Ikan Lele Dumbo karena Konsentrasi Pigmen Merah *Acanthophora spicifera* dan Lama Penyimpanan Yang Berbeda

Perlakuan		
Konsentrasi Pigmen (%)	Lama Penyimpanan (hari)	Total Rangking Kesukaan warna
0,50	1	3,7
	5	3,4
	10	3,2
	1	4,1
	5	3,8
	10	3,8
0,75	1	4,7
	5	4,6
	10	4,4
	1	4,3
0,100	5	4
	10	3,8

Hasil uji organoleptik aroma dengan skala hedonik 1-5 (suka-sangat tidak suka) sosis ikan lele dumbo yang diberi pigmen *A. spicifera* dengan proporsi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 8.

Hasil skor uji organoleptik terhadap aroma sosis ikan lele dumbo berkisar antara 1,7-3,6 ($\alpha=0,05$), sedangkan total rangking penilaian panelis terhadap aroma dari sosis ikan lele dumbo berkisar antara 3,3-4,5. Hasil uji Friedman pada Lampiran 15 terhadap tingkat kesukaan panelis pada aroma sosis ikan lele dumbo akibat pengaruh konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* berbeda memberikan hasil signifikan ($\alpha=0,05$).

Tabel 8. Total Rangking Nilai Kesukaan Aroma Sosis Ikan Lele Dumbo karena Konsentrasi Pigmen Merah *Acanthophora spicifera* dan Lama Penyimpanan Yang Berbeda

Perlakuan		
Konsentrasi Pigmen (%)	Lama Penyimpanan (hari)	Total Rangking Kesukaan Aroma
0,50	1	3,7
	5	3,7
	10	3,5
	1	4,5
	5	4,4
	10	4,1
0,75	1	4,4
	5	3,8
	10	3,7
	1	3,7
0,100	5	3,3
	10	3,3

5

Hasil uji organoleptik rasa dengan skala hedonik 1-5 (suka-sangat tidak suka) sosis ikan lele dumbo ²⁴g diberi pigmen *A. spicifera* dengan proporsi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Total Rangking Nilai Kesukaan Rasa Sosis Ikan Lele Dumbo karena Konsentrasi Pigmen Merah *Achanthophora spicifera* dan Lama Penyimpanan Yang Berbeda

Perlakuan		
Konsentrasi Pigmen (%)	Lama Penyimpanan (hari)	Total Rangking Kesukaan Rasa
0	1	3.8
	5	3.8
	10	3.5
0,50	1	4.4
	5	4.3
	10	3.9
0,75	1	4.3
	5	3.8
	10	3.6
0,100	1	3.7
	5	3.6
	10	3.3

Hasil skor uji organoleptik terhadap rasa sosis ikan lele dumbo berkisar antara 1.8-3.4 ($\alpha=0.05$), sedangkan total rangking penilaian panelis terhadap rasa dari sosis ikan lele dumbo berkisar antara 3.3-4.4. Hasil uji ⁷jut Friedman pada Lampiran 15 terhadap tingkat kesukaan panelis pada rasa sosis ikan lele dumbo akibat pengaruh konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* berbeda memberikan hasil signifikan ($\alpha=0.05$).

Hasil penelitian utama, memperoleh pigmen dengan tampilan warna merah. Pigmen yang diperoleh kemudian dianalisis dengan spectrotometer dengan puncak panjang gelombang yang diperoleh 566 nm yang merupakan panjang gelombang fikoeritrin. Warna pigmen merah tersebut sangat cocok diaplikasikan pada produk yang menginginkan penampakan warna merah seperti sosis

Penurunan intensitas warna kecerahan disebabkan oleh penambahan konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* dari 0,100 %, 0,75 % dan 0,50 %. Penambahan konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* menyebabkan intensitas warna menurun karena sosis ikan lele dumbo akan semakin berwarna merah dan menyebabkan turunnya nilai intensitas warna kecerahan. Menurut teori ¹²Ameny and Wilson, 1997; Knoll, 2005), kecerahan merupakan

spektrum warna dasar, adanya penambahan warna lain pada suatu obyek akan menurunkan nilai kecerahan.

Pada penelitian ini lama penyimpanan dan konsentrasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap warna pigmen merah *A. spicifera*. Pigmen merah *A. spicifera* yang ditambahkan sebagai pewarna pada sosis ikan lele dumbo cenderung mempunyai warna yang stabil selama masa penyimpanan. Hal tersebut dapat diketahui dari perubahan rerata intensitas warna kecerahan pigmen merah *A. spicifera* selama masa penyimpanan cenderung menurun, namun tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Menurut Lawless and Heyms ¹⁹(1998) dalam Satriyanto (2012), bahwa *axis a** menunjukkan intensitas warna merah (+) dan hijau (-). Rerata intensitas warna kemerah pada berbagai kombinasi konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* dan lama penyimpanan sosis ikan lele dumbo berkisar antara 7,7 – 75,5. Perlakuan ¹⁶konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* dan interaksi antara kedua perlakuan menunjukkan pengaruh sangat nyata terhadap nilai warna intensitas warna kemerah sosis ikan lele dumbo ($\alpha=0,05$). Penambahan pigmen merah *A. spicifera* pada produk sosis ikan lele dumbo akan meningkatkan intensitas warna kemerah.

Penambahan proporsi pigmen merah *A. spicifera* menyebabkan intensitas warna kekuningan meningkat. Peningkatan intensitas warna kekuningan pada sosis ikan lele dumbo diperkirakan adanya peningkatan senyawa karoten yang berwarna merah-orange. Menurut Eskin (1990), bahwa semakin tinggi kadar betakaroten makan akan menyebabkan semakin meningkat pula intensitas warna merah atau kuning.

Rerata kadar air sosis ikan lele dumbo pada berbagai proporsi dan lama penyimpanan berkisar antara 54,67 – 91,47. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi pigmen merah *A. spicifera* dan lama penyimpanan serta interaksi kedua perlakuan tidak berbeda nyata ($\alpha = 0,05$). Hal tersebut disebabkan karena kadar air pada setiap perlakuan sosis ikan lele dumbo adalah sama. Pigmen merah *A. spicifera* yang ditambahkan pada produk dalam bentuk kering meskipun dalam konsentrasi yang berbeda tidak akan mempengaruhi kadar air sosis ikan lele dumbo.

Pada penambahan ²⁹ proporsi pigmen merah *A. spicifera* yang berbeda akan memberikan respon yang berbeda pada panelis terhadap warna sosis ikan lele dumbo. Total

rangking penilaian panelis terhadap warna dari sosis ikan lele dumbo berkisar antara 48-71 (Lampiran 13). Daya terima panelis terhadap warna sosis ikan lele dumbo meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi pigmen merah *A. spicifera* sampai pada konsentrasi 0,75 % dan kemudian menurun pada konsentrasi 0,100 %. Selama penyimpanan dengan bertambahnya waktu penyimpanan, penerimaan panelis terhadap warna sosis ikan lele dumbo cenderung menurun. Berdasarkan uji organoleptik terhadap warna, rangking terendah (panelis netral) memiliki skor 3,2 dengan total rangking 48 diperoleh pada konsentrasi 0 % (kontrol) dan lama penyimpanan 10 hari. Sedangkan rangking tertinggi panelis (sangat suka) dengan skor 4,7 dengan total rangking 71 diperoleh pada konsentrasi 0,75 % pada hari I.

Penambahan pewarna pada makanan akan menjadikan suatu produk makanan menjadi lebih menarik dan memberi rangsangan kepada konsumen untuk membeli. Dijelaskan oleh Nugraheni (2014), bahwa pewarna merupakan bahan yang ditambahkan dalam makanan yang berfungsi untuk memberikan warna yang khas dan menjadi ciri khusus dari suatu makanan.

B. Aroma

Daya terima panelis terhadap aroma sosis ikan lele dumbo meningkat seiring dengan bertambahnya proporsi pigmen merah *A. spicifera* sampai pada konsentrasi 0,50 % dan kemudian mulai menurun pada konsentrasi 0,75 %. Selama penyimpanan dengan bertambahnya waktu penyimpanan, penerimaan panelis terhadap warna sosis ikan lele dumbo cenderung menurun. Berdasarkan uji organoleptik terhadap warna, rangking terendah (panelis netral) memiliki skor 3,27 dengan total rangking 49 diperoleh pada konsentrasi 0,100 % (kontrol) dan lama penyimpanan 10 hari. Sedangkan rangking tertinggi panelis (sangat suka) dengan skor 4,47 dengan total rangking 67 diperoleh pada konsentrasi 0,50 % pada hari I.

Penerimaan panelis terhadap rasa sosis ikan lele dumbo dengan bertambahnya waktu penyimpanan cenderung menurun. Berdasarkan uji organoleptik terhadap rasa, rangking terendah (panelis netral) memiliki skor 3,3 dengan total rangking 50 diperoleh pada konsentrasi 0,100 % (kontrol) dan lama penyimpanan 10 hari. Sedangkan rangking tertinggi panelis (sangat suka) dengan skor 4,4 dengan total rangking 66 diperoleh pada konsentrasi 0,50 % pada hari I.

Dengan bertambahnya proporsi pigmen pigmen *A. spicifera* pada sosis ikan lele dumbo akan meningkatkan rasa khas rumput laut yang

cenderung berbau amis, sehingga sampai pada proporsi tertentu akan menurunkan nilai rasa sosis ikan lele dumbo.

Kesimpulan

Pigmen merah *A. spicifera* bisa dipakai sebagai pewarna pada sosis ikan lele dumbo dengan konsentrasi terbaik 0,75 %. Konsentrasi dan lama penyimpanan sosis ikan lele dumbo berpengaruh nyata terhadap intensitas warna kemerahan dan kekuningan, namun tidak berbeda nyata terhadap intensitas kecerahan dan kadar air. Konsentrasi pigmen *A. spicifera* yang berbeda pada sosis ikan lele dumbo terhadap uji organoleptik memberikan perbedaan signifikan pada warna, aroma dan rasa. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap perlakuan suhu pemanasan pigmen *A. spicifera* terhadap ketabilan warna. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi lain dari pigmen *A. spicifera*.

Daftar Pustaka

- De Garmo E.P., W.G. Sullivan dan J.R. Canada, 1984. *Engineering Economy*. Seventh Edition. Macmillan Publishing Company, New York.
 Lee RE, 2008. *Phycology*. Ed ke-4 Cambridge : Cambridge University Press. 547 hal.
 Limantara, L. dan Rahayu, P., 2007. *Prospek Kesehatan Pigmen Alami*. Prosiding Seminar Nasional Pigmen 2007 MB UKSW, Salatiga. ISBN.979-1098. 16-4.
 Puji Rahayu dan Leenawaty Limantara, 2005. *Studi Lapangan Kandungan Klorofil in Vivo Beberapa Spesies Tumbuhan Hijau di Salatiga dan Sekitarnya*. Seminar Nasional MIPA 2005.
 Winarno, FG., 1992. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
 Winarno, FG., 1996. *Teknologi Pengolahan Rumput Laut*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

13%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | ecampus.poltekkes-medan.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 2 | vibdoc.com
Internet Source | 1 % |
| 3 | Fajrin Saputra Laitupa, Sahril Kacoa,
Muhammad Askar Laitupa, Umar Tangke.
"Pendugaan daerah potensial penangkapan
ikan layang (Decapterus sp) berdasarkan SPL
dan klorofil-a di perairan pesisir Pulau
Ternate", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan,
2015
Publication | 1 % |
| 4 | etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 5 | I. Sasahan, F.S. Ratulangi, M. Sompie, J.E.G.
Rompis. "Penggunaan tepung ubi jalar ungu
(Ipomoea batatas L) sebagai filler terhadap
sifat sensorik sosis daging ayam", ZOOTEC,
2021
Publication | 1 % |
-

6	jurnalagriepat.wordpress.com Internet Source	1 %
7	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
9	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
10	library.um.ac.id Internet Source	<1 %
11	zaifbio.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	research-report.umm.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %