

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berusaha menarik beberapa kesimpulan :

- 6.1.1. Toxoplasmosis telah terbukti ada pada babi dan kambing di RPH Pegirian Kotamadya Surabaya.
- 6.1.2. Prevalensi antibodi T. gondii pada babi lebih tinggi daripada kambing, tetapi secara statistik tidak berbeda nyata ($p > 0,05$).
- 6.1.3. Tidak ada perbedaan yang nyata antara prevalensi antibodi T. gondii pada babi jantan dengan babi betina dan pada kambing jantan dengan kambing betina ($p > 0,05$).
- 6.1.4. Harga rata-rata titer positif antibodi T. gondii pada kambing lebih tinggi daripada babi, tetapi secara statistik tidak berbeda nyata ($p > 0,05$).

6.2. SARAN

Adanya prevalensi antibodi T. gondii yang cukup tinggi pada babi dan kambing di RPH Pedirian Kotamadya Surabaya, maka daging babi dan kambing harus dimasak dengan sempurna. Kucing, anjing dan hewan pemakan daging

lainnya janganlah diberi makan daging yang masih mentah. Ibu-ibu terutama yang sedang mengandung sebaiknya menghindari makan daging mentah atau kurang masak dan memakai sarung tangan atau mencuci tangan secepatnya ketika mengolah daging mentah atau saat dan setelah berkebun. Bagi pekerja RPH atau pejagal seharusnya memakai sarung tangan dan sepatu karet ketika menangani karkas.

Kasus-kasus keguguran pada hewan ternak khususnya babi dan kambing, harus dipikirkan kemungkinan akibat toxoplasmosis.

Mengingat sumber penularan ada dekat dengan kita, baik sebagai hewan kesayangan maupun piaraan, akibat dan kerugian yang ditimbulkan, maka toxoplasmosis perlu diperkenalkan secara meluas kepada masyarakat.