



ISSN 2085-5842

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 9 / Nomor : 1 / Published April 2017



FAKULTAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA



Research Articles

Potensi Serbuk Daun Pepaya untuk Meningkatkan Efisiensi Pemanfaatan Pakan, Rasio Efisiensi Protein dan Laju Pertumbuhan Relatif pada Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
[*Papaya Leaf Powder Potential to Improve Efficiency Utilization of Feed, Protein Efficiency Ratio and Relative Growth Rate in Tilapia (Oreochromis niloticus) Fish Farming*]

November 1, 2015

121-124

Gunanti Mahasri, Romziah Sidik, Norma Isnawati



Karakterisasi Edible Film dari Pati Propagul Mangrove Lindur (*Bruguiera gymnorrhiza*) dengan Penambahan Carboxymethyl Cellulose (Cmc) sebagai Pemplastis
[*Characterization of Edible Film From Propagules Mangrove Lindur (Bruguiera Gymnorrhiza) Starch with Addition of Carboxymethyl Cellulose (Cmc) as Plasticizer*]

November 1, 2015

125-132

Moch Amin Alamsjah, Sudarno Sudarno, Azka Prima Nurindra



Potensi *Bacillus licheniformis* dan *Streptomyces olivaceoviridis* sebagai Penghambat Pertumbuhan Jamur *Saprolegnia* sp. Penyebab Saprolegniasis pada Ikan secara In Vitro
[*Potential of Bacillus licheniformis and Streptomyces olivaceoviridis as Inhibiting The Growth of Fungus Saprolegnia sp, Cause Saprolegniasis on Fish by Using In Vitro*]

November 1, 2015

133-140

Oktantia Frenny Anggani, Rahayu Kusdarwati, Hari Suprpto



Perbandingan Viskositas, Titik Nyala dan Titik Beku Biodiesel dari Rumpun Laut (*Eucheuma denticulatum*), Minyak Ikan Lemuru (*Sardinella longiceps*) dan Biodiesel Komersil
[*The Comparison of Viscosity, Flash Point and Freeze Point Biodiesel of Seagrass (Eucheuma denticulatum), Sardinella Oi*]

November 1, 2015

141-148

Boedi Setya Rahardja, Woro Hastuti Satyantini, Andry Wijayanto



Pemeriksaan Viral Nervous Necrosis (VNN) Pada Ikan dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR)
[*Viral Nervous Necrosis (VNN) Examination at Fish by Polymerase Chain Reaction (PCR) Method*]

November 1, 2015

149-152

Abdul Manan, Elly Fitriatin



Teknik Dasar Histologi pada Ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*)
[*The Basic Histology Technique of Gouramy Fish (Osphronemus gourami)*]

November 1, 2015

153-158

Abdul Manan, Harini Citra Pratiwi



Pengaruh Perasan Biji Pepaya (*Carica papaya*) terhadap Kerusakan Telur *Argulus japonicus*
[*The Influence of Papaya Seed (Carica papaya) Toward The Damage Eggs of Argulus japonicus*]

November 1, 2015

159-164

Kismiyati Kismiyati, Sri Subekti, Ade Fitri Noor Inaya



Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar pada Daun Kacang Tanah (*Arachis hypogaea*) yang Difermentasi dengan Bakteri *Enterobacter cloacae* WPL 111 sebagai Bahan Pakan Alternatif Ikan
[*Content of Crude Protein and Crude Fiber in Peanut Leaves (Arachis hypogaea) Fermented by Enterobacter cloacae WPL 111 as Alternative Fish Feed Stuff*]

November 1, 2015

165-168

Agustono Agustono, Widya Paramita Lokapimasari, Karlina Hardianing
Pangestu



Analisis Finansial Pembesaran Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) pada Tambak Tradisional dengan Sistem Monokultur dan Polikultur di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur
[*Financial Analysis of Fish Enlargement Milkfish (Chanos chanos) in Pond with Traditional Farming and Monoculture Polyculture System in Mulyorejo, Surabaya, East Java*]

November 1, 2015

169-176

Moch. Amin Alamsjah, Kustiawan Tri Pursetyo, Asmaul Huniyah



Substitusi Silase Secara Kimiawi Limbah Padat Surimi Ikan Swanggi (*Priacanthus macracanthus*) pada Tepung Ikan terhadap Retensi Energi dan Rasio Konversi Pakan Benih Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)
[*Chemical Silage Substitution of Swanggi Surimi Solid Waste (Priacanthus macracanthus) of Fish Meal Toward Energy Retention and Tiplapia Seeds (Oreochromis niloticus) Feed Conversion Rate*]

November 1, 2015

177-182

Boedi Setya Rahardja, Prayogo Prayogo, Wiku Bakti Bawono



Pengaruh Larutan Fixer terhadap Kualitas Pewarnaan Biopigmen Rumput Laut *Eucheuma* sp. sebagai Pengganti Pewarna Sintetis pada Tekstil
[*The Influence of Fixer for The Quality of Coloring Biopigmen Eucheuma sp. as a Substitute for Synthetic Dyes in Textiles*]

November 1, 2015

183-188

Sri Subekti, Achmad Amarudin, Moch Amin Alamsjah



Pengaruh Penambahan Perasan Paprika Merah (*Capsicum annum*) dalam Pakan Terhadap Tingkat Kecerahan Warna Ikan Koi (*Cyprinus carpio* L.)
[*The Influence of Additional Red Pepper (Capsicum annum) Juice in Fish Feed to Koi (Cyprinus Carpio L.) Color Brightness Level*]

November 1, 2015

189-194

Wahju Tjahjaningsih, Moch. Amin Alamsjah, Nindya Putriana



Pengaruh Pemberian Ekstrak Sargassum sp. dengan Pelarut Metanol pada Pakan terhadap Jumlah Eritrosit dan Differensial Leukosit Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)
[Effect Of Extract Sargassum sp. with Methanol Solvent in Feed on Erythrocythes and Differential Leucocythes of African Catfish (Clarias gariepinus)]

November 1, 2015

213-218

Firly Waliani Rahma, Gunanti Mahasri, Laksmi Surmartiwi



Perubahan Hematologi Ikan Mas Komet (*Carassius auratus auratus*) Akibat Infestasi *Argulus japonicus* Jantan Dan *Argulus japonicus* Betina
[Hematologic Changes Comet Goldfish (Carassius auratus auratus) as a Result of Infestation Argulus japonicus Males And Argulus japonicus Females]

November 1, 2015

219-224

Kismiyati Kismiyati, Laksmi Sulmartiwi, Norma Isnawati



Gambaran Darah dan Histopatologi Insang, Usus Dan Otak Ikan Koi (*Cyprinus carpio Koi*) yang Diinfeksi Spora *Myxobolus koi* secara Oral
[Haematology and Histopatology of Gills, Intestine And Brain Koi Fish (Cyprinus carpio Koi) Myxobolus koi Orally Infected]

November 1, 2015

225-234

Gunanti Mahasri, Kusnoto Kusnoto, Era Insivitawati



Pengaruh Kedalaman Sarang Penetasan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) terhadap Masa Inkubasi dan Persentase Keberhasilan Penetasan di Pantai Sukamade, Taman Nasional Meru Betiri, Banyuwangi Jawa Timur
[*Effect of Nesting Site Depth of Green Turtle (Chelonia mydas) on the Incubation Period and Hatching Success Percentage in Sukamade Beach, Meru Betiri National Park, Banyuwangi in East Java*]

November 1, 2015

195-198

Laksmi Sulmartiwi, Wahyu Tjahjaningsih, Abang Aldhian R. Putera



Substitusi Tepung Ikan dengan Tepung Limbah Ikan Hiu (*Carcharhinus* sp.) terhadap Pertumbuhan, Efisiensi Pakan dan Survival Rate Ikan Lele Dumbo (*Clarias* sp.)
[*Substitution of Fish Mill with Shark Waste Mill (Carcharhinus sp.) on Growth, Feed Efficiency and Fish Survival Rate of African Catfish (Clarias sp.)*]

November 1, 2015

199-206

Yudi Cahyoko, Muhammad Arief, Novan Agil Permana



Pengaruh Pemberian Probiotik Plus Herbal pada Pakan Komersil terhadap Retensi Protein dan Retensi Lemak Ikan Nila Merah (*Oreochromis niloticus*)
[*The Effect of Addition Probiotic Plus Herbal on Commercial Feed to Protein Retention and Fat Retention Red Tilapia Fish (Oreochromis niloticus)*]

November 1, 2015

207-212

Muhammad Arief, Diatra Faradiba, Muhammad Anam Al-Arief



PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK *Sargassum* sp. DENGAN PELARUT METANOL PADA PAKAN TERHADAP JUMLAH ERITROSIT DAN DIFFERENSIAL LEUKOSIT IKAN LELE DUMBO (*Clarias gariepinus*)

EFFECT OF EXTRACT *Sargassum* sp. WITH METHANOL SOLVENT IN FEED ON ERYTHROCYTHES AND DIFFERENTIAL LEUCOCYTHES OF AFRICAN CATFISH (*Clarias gariepinus*)

Firly Waliani Rahma, Gunanti Mahasri dan Laksmi Surtmartiwi

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo - Surabaya, 60115 Telp. 031-5911451

Abstract

The main obstacles in successful production is the attack of a disease. Preventive measures in reducing disease one of them is by means an increase in immunity the body of fish use natural compound (Parelberg *et al.*, 2005). One of the natural compound that can be used as obtaining the immune system fish are the vitamin C, iodine, tannin (Bachtiar, dkk., 2012) and polysaccharides and derivatives as fucoidan. (Castro *et al.*, 2006) which is in *Sargassum* sp. With the provision of extract *Sargassum* sp. in feed is expected to optimize the number of erythrocytes and differensial leukocytes (number of neutrophils, monocytes and lymphocytes) at african catfish (*Clarias gariepinus*) so that it may optimize immunity the body of fish (Brown, 2000). The result of the observation of the blood of fish test is the use of extract *Sargassum* sp. wich get mixed in feed with doses 5, 10 and 15 g/kilogram feed during 21 days impact on the number of erythrocytes and prosentase lymphocytes blood catfishes. In doses C (15 g extract/ kilogram feed) put a value erythrocytes highest in day 21 namely $16.84 \pm 1.56 \times 10^5$ cells/mm³, and give prosentase lymphocytes highest in day 21 than those wich others are 86.00 ± 3.81 %. But in a post test, B and C not seen the real difference between treatment. While for statistics the addition of extract not indicates the influence of real to the percentage neutrophils and monocytes of the blood fish. So that it can be said that addition extract *Sargassum* sp. with doses 15 g extract/kilogram feed give the effectiveness of the optimal response immune system than second doses other.

Keywords : Feed, ekstrak *Sargassum* sp., the number of erythrocytes, and differential leukocytes

Pendahuluan

Ikan lele merupakan salah satu komoditas unggulan air tawar yang penting dalam rangka pemenuhan gizi masyarakat. Selain karena rasanya yang enak dan harga dari ikan ini dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat kandungan protein dari ikan lele sebesar 15,74 % (Ubadillah dan Hersoelistryorini, 2010). Produksi ikan lele pada tahun 2010 sebesar 242.811 ton dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 758.455 ton. Kenaikan rata-rata produksi ikan lele selama tahun 2010-2013 sebesar 47,21%. Target produksi ikan lele pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi 840.000 ton. (KKP, 2013). Namun, salah satu yang menjadi kendala dalam budidaya ikan lele adalah rentan terhadap kondisi lingkungan yang buruk sehingga mudah terinfeksi bakteri (Murhananto, 2002).

Upaya pencegahan yang paling efektif dilakukan dengan meningkatkan kekebalan tubuh ikan baik kekebalan tubuh spesifik dengan menggunakan vaksinasi maupun

kekebalan tubuh non spesifik dengan pemberian imunostimulan (Parelberg *et al.*, 2005).

Salah satu bahan alami yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan yakni *Sargassum* sp. menurut Castro *et al.* (2006) mengandung senyawa fucoidan yang merupakan polisakarida kompleks pada dinding sel alga coklat dan merupakan komponen terbesar yang mampu meningkatkan imunitas dengan merangsang produksi sel-sel imun, sehingga membantu dalam melawan bakteri patogen. Selain itu *Sargasum* sp. mengandung iodin, tannin dan fenol yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri (Bachtiar, dkk., 2012)

Darah menjadi salah satu cara dalam mendiagnostik status kesehatan dari ikan. Darah mengalami perubahan yang serius khususnya apabila terkena penyakit infeksi (Amlacher 1970). Parameter darah yang dapat memperlihatkan adanya gangguan adalah nilai hematokrit, konsentrasi hemoglobin, jumlah eritrosit (sel darah merah) dan serta perubahan

terhadap jumlah differensial leukosit (neutrofil, monosit dan limfosit) (Lagler *et al.*, 1977).

Materi dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga selama 21 hari dimulai pada bulan Agustus sampai dengan bulan September 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang digunakan sebanyak 4 perlakuan dan 5 ulangan. Pemberian pakan dengan perlakuan diberikan selama 21 hari dan pada hari ke 0, 7, 14 dan 21 dilakukan penghitungan jumlah eritrosit dan differensial leukosit (neutrofil, limfosit dan monosit). Perlakuan yang diberikan yakni perbedaan dosis ekstrak *Sargassum* sp. yakni K (Kontrol), A (5 gr ekstrak/kg pakan), B (10 gr ekstrak/kg pakan) dan C (15 gr ekstrak/kg pakan). Jumlah pakan yang diberikan sebanyak 5% dari biomassa.

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antar lain adalah ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus*) ukuran 10-12 cm, sebanyak 200 ekor. *Sargassum* sp., Aquades, pakan ikan komersial *Comfeed* 781-2 dengan kandungan protein 30 – 32 %, formalin, kapas, tisu, EDTA, Giemsa 10%, metil alkohol Penghitungan Jumlah Eritrosit (Svobodova & Vyukusova 1991)

Jumlah eritrosit dihitung dalam volume tertentu dengan menggunakan faktor konversi. Penghitungan dimulai dengan mengisi pipet eritrosit yakni darah dihisap sampai garis tanda 0,5 dan larutan pengencer (larutan hayem) sampai garis 101. Melepaskan tabung aspirator kemudian dihomogenkan 5-10 menit untuk memastikan pencampuran dengan baik. Membuang 3-4 tetes pertama, berikutnya meletakkan pada bilik hitung. Bilik hitung yang telah terisi diletakkan pada mikroskop dan lakukan pembacaan dalam pembesaran (40x).

$$\text{Eritrosit} = (A/N) \times (1/V) \times Fp$$

A = Σ sel terhitung

V = volume kotak haemocytometer

N = Σ kotak haemocytometer yang diamati

Fp = Faktor pengenceran

Penghitungan Prosentase Differensial Leukosit (Svobodova & Vyukusova 1991)

Pemeriksaan dilakukan dengan membuat preparat ulas darah dan diwarnai

dengan pewarnaan Giemsa 10% selama 10-15 menit. Sampel darah di campur homogen sebelum diambil dengan pipet kapiler, kemudian satu tetes kecil darah diletakkan dekat ujung gelas obyek posisi permukaan datar. Gelas obyek yang kedua ditempatkan dengan ujung menyentuh permukaan gelas obyek pertama sehingga membentuk sudut 30-45°. Gelas obyek kedua ditarik ke samping dan dibiarkan darah mengalir dengan daya kapiler sehingga mencapai luasan 2/3 gelas obyek pertama. Gelas obyek kedua didorong dengan sudut yang sama sehingga membentuk lapisan tipis. Preparat apus dibiarkan mengering di udara terbuka.

Preparat apus darah difiksasi dengan metil alkohol selama 3-5 menit, preparat diambil dan dibiarkan kering di udara. Setelah kering preparat direndam dengan pewarna Giemsa yang baru selama 10-15 menit. Preparat dicuci dengan air berkali-kali dan dibiarkan mengering di rak. Penghitungan persentase limfosit dilakukan perbesaran obyektif 40x, klasifikasi leukosit pada beberapa lapang pandang dan dihitung per 100 leukosit.

$$\text{Presentase Limfosit} = \frac{L}{100} \times 100 \%$$

$$\text{Presentase Monosit} = \frac{M}{100} \times 100 \%$$

$$\text{Presentase Neutrofil} = \frac{N}{100} \times 100 \%$$

Hasil dan Pembahasan

Jumlah Eritrosit

Pengamatan terhadap jumlah total eritrosit dalam darah ikan lele dumbo pada perlakuan yang berbeda, menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada perlakuan C pada hari ke-21 yakni $16.84 \pm 1.56 \times 10^5$ sel/mm³. Nilai terendah terdapat pada kontrol yaitu $11.6 \pm 5.80 \times 10^5$ sel/mm³ yakni pada hari ke-14. Dari analisa statistic ragam (ANOVA) dan uji lanjutan Duncan pada selang kepercayaan 95% (p<0.05) diperoleh hasil pada hari ke-21 kontrol berbeda nyata (p<0.05) dengan perlakuan A, B dan C yakni jumlah eritrosit lebih rendah dari ketiga perlakuan. Kisaran jumlah eritrosit ini masih berada dalam kisaran normal artinya ikan berada dalam kondisi sehat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Robert (1978) dalam Mulyani (2006) yang menyatakan bahwa pada ikan teleostei, jumlah normal eritrosit sebesar $1,05 - 3,00 \times 10^6$ sel/mm³.

Tabel 1. Jumlah Rataan Eritrosit Pada Setiap Perlakuan ($\times 10^5$ sel/mm³) Selama Pemberian Ekstrak *Sargassum sp.*

Perlakuan	Hari ke-0	Hari ke-7	Hari ke-14	Hari ke-21	Normal
K	14.24 ± 2.36	13.6 ± 5.80	15.18 ± 2.82	13.08 ± 0.82 ^a	1,05 – 3,0 ×10 ⁶ Robert, 1978 dalam Mulyani, 2006
A	13.38 ± 4.92	13.74 ± 1.86	15.10 ± 2.50	16.10 ± 1.60 ^b	
B	12.78 ± 1.42	13.28 ± 4.52	15.50 ± 1.80	16.06 ± 1.34 ^b	
C	13.58 ± 2.72	13.98 ± 1.52	15.34 ± 2.36	16.84 ± 1.56 ^b	

Keterangan : Huruf superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh berbeda nyata (p<0.05)

Tabel 2. Persentase Rataan Limfosit Setiap Perlakuan (%) Selama Pemberian Ekstrak *Sargassum sp.*

Perlakuan	Hari ke-0	Hari ke-7	Hari ke-14	Hari ke-21	Normal
K	78.80 ± 4.32	81.60 ± 2.41	81.40 ± 1.67	80.80 ± 1.92 ^a	65,20 – 86,00 Salasia dkk., (2001)
A	80.40 ± 1.14	83.00 ± 3.39	82.80 ± 3.56	85.80 ± 3.11 ^b	
B	77.60 ± 4.93	81.60 ± 2.19	84.00 ± 3.54	85.20 ± 3.11 ^b	
C	80.20 ± 2.86	81.00 ± 2.92	85.40 ± 4.04	86.00 ± 3.81 ^b	

Tabel 3. Jumlah Rataan Persentase Jumlah Neutrofil Pada Setiap Perlakuan (%) Selama Pemberian Ekstrak *Sargassum sp.*

Perlakuan	Hari ke-0	Hari ke-7	Hari ke-14	Hari ke-21	Normal
K	13.00 ± 4.95	10.60 ± 2.07	10.60 ± 1.82	11.20 ± 1.58	7,75 - 14,94 Salasia dkk., (2001)
A	11.40 ± 1.82	9.00 ± 2.83	8.20 ± 3.96	7.80 ± 1.10	
B	13.40 ± 4.51	10.40 ± 3.05	7.20 ± 1.44	8.40 ± 1.67	
C	11.40 ± 2.82	11.00 ± 3.32	8.20 ± 2.28	8.20 ± 1.92	

Tabel 4. Jumlah Rataan Persentase Jumlah Monosit Pada Setiap Perlakuan (%) Selama Pemberian Ekstrak *Sargassum sp.*

Perlakuan	Hari ke-0	Hari ke-7	Hari ke-14	Hari ke-21	Normal
K	8.20 ± 0.84	7.80 ± 0.45	8.00 ± 0.71	8.60 ± 1.52	3,12 – 8,82 Andayani dkk., (2013)
A	8.20 ± 0.84	8.00 ± 1.00	7.70 ± 0.71	7.40 ± 1.95	
B	9.00 ± 0.71	7.00 ± 1.00	8.80 ± 0.45	8.20 ± 0.84	
C	8.40 ± 0.36	8.20 ± 1.00	6.30 ± 0.03	7.00 ± 1.00	

Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan sel darah merah membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Rendahnya eritrosit akan menyebabkan ikan tidak mampu mengambil oksigen dalam jumlah banyak walaupun ketersediaan oksigen di perairan mencukupi. Akibatnya ikan akan mengalami anoxia (kekurangan oksigen) (Fujaya, 2002). Seperti halnya pada hematokrit, kadar eritrosit yang rendah menunjukkan terjadinya anemia sedangkan kadar yang tinggi menunjukkan bahwa ikan dalam keadaan stress (Wedemeyer dan Yatsuke, 1977 dalam Purwanto, 2006).
Differential Leukosit

Bila dilihat pada Tabel 2. jumlah prosentase limfosit di semua perlakuan dari hari ke-0 sampai hari ke-21 cenderung meningkat. Peningkatan prosentase limfosit di hari ke-21 pada perlakuan 5, 10 dan 15 g ekstrak / kg pakan menunjukkan pemberian ekstrak *Sargassum sp.* memberikan pengaruh terhadap prosentase limfosit dalam darah ikan lele. Pengaruh ini berupa peningkatan jumlah limfosit. Hal ini dikarenakan kandungan kimia alami dari hasil ekstraksi *Sargassum sp.* mengandung vitamin C dimana pemberian vitamin C dalam dosis tinggi mampu meningkatkan ketahanan tubuh (Navarre and Halve, 1989) dan polisakarida yang berfungsi

sebagai peningkat sistem imun pada ikan dan meningkatkan proteksi terhadap bakteri (Anggadiredja dkk., 2006). Selain itu kandungan lain dalam ekstrak *Sargassum* sp. seperti senyawa fucoidan juga berfungsi meningkatkan sel imun dengan merangsang produksi sel imun (Castro *el al.*, 2006), yakni menginduksi sel pembentuk leukosit, untuk menghasilkan lebih banyak sel sel yang terdapat dalam leukosit yakni limfosit, monosit dan neutrofil (Radji, 2015). Induksi sel leukosit ini merupakan bentuk respon dari tubuh ikan terhadap adanya benda asing yang masuk se dalam tubuh. Benda asing ini berupa pemberian ekstrak *Sargassum* sp. yang dicampurkan ke dalam pakan.

Peningkatan prosentase limfosit merupakan refleksi keberhasilan sistem imunitas ikan dalam mengembangkan respon imunitas seluler (non spesifik) sebagai pemicu untuk respon kekebalan. Pada dasarnya sel limfosit terdiri dari dua populasi : sel B dan sel T. Sel B mempunyai kemampuan untuk bertransformasi menjadi sel plasma yaitu sel yang memproduksi antibodi. Sedangkan sel T sangat berperan dalam kekebalan berperantara sel (sel T sitotoksik) dan mengontrol respon imun (sel T supresor). Limfosit yang teraktivasi akan berdiferensiasi dari sel kognitif yang mengenal antigen menjadi sel efektor yang berfungsi menyingkirkan anti gen menjadi sel efektor yang berfungsi menyingkirkan antigen (Kresno, 2001). Setelah terjadi pengikatan antigen dengan reseptor antigen sel limfosit, maka sel limfosit akan membelah dan berdiferensiasi menjadi sel efektor dan sel memori (Tizard 1988). Sel T-sitolitik yang berdiferensiasi mempunyai granula sitoplasmik lebih banyak yang mengandung protein yang berfungsi melisiskan sasaran. Limfosit B berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi (Kresno, 2001).

Pengamatan terhadap rata-rata prosentase neutrofil dalam darah ikan lele dumbo menunjukkan bahwa jumlah neutrofil cenderung menurun disetiap minggunya. Pada dosis kontrol, 5, 10 dan 15 g ekstrak/ kg pakan prosentase neutrofil memiliki pola yang sama yakni cenderung menurun. Menurut Tizard (1988), hal ini berkaitan dengan fungsi utama dari neutrofil yaitu penghancuran bahan asing melalui proses fagositosis yaitu kemotaksis dimana sel akan bermigrasi menuju partikel, peletakan partikel pada sel, penelanan partikel oleh sel, dan penghancuran partikel oleh enzim lisosim di dalam fagolisosom. Sehingga tanpa adanya rangsangan dari benda asing baik berupa bakteri, virus, maupun patogen neutrofil tidak

akan menunjukkan reaksi peningkatan. Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Delman and Brown (1989) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah sel neutrofil mengindikasikan adanya peningkatan kegiatan pengumpulan makrofag di tempat terjadinya infeksi, sehingga makrofag akan lebih mudah untuk menghancurkan partikel asing. Namun pasca infeksi jumlah sel neutrofil dapat ditekan, sel-sel mati dan jaringan nekrotik yang salah satunya mengandung neutrofil yang telah mati secara bertahap akan mengalami lisis dalam beberapa hari (Jain, 1993).

Monosit yang cenderung menurun di setiap minggunya berkaitan dengan fungsi monosit yaitu sebagai makrofag, dimana monosit tidak dibutuhkan untuk memfagosit, dikarenakan belum adanya infeksi yang masuk ke dalam tubuh yang merangsang produksi monosit. Gambar 9 dapat dilihat bahwa prosentase monosit di perlakuan 0, 5 10 dan 15 g ekstrak/ kg pakan memiliki pola yang sama yakni akan mengalami penurunan di hari ke-7 hingga hari ke-21. Erika (2008) yang menyatakan hal yang serupa bahwa jumlah limfosit yang rendah dalam sirkulasi darah akan diimbangi dengan jumlah neutrofil yang tinggi, begitupun sebaliknya.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penggunaan ekstrak *Sargassum* sp. dengan pelarut metanol yang dicampurkan pada pakan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan prosentase limfosit darah ikan lele dumbo namun tidak berpengaruh pada ikan prosentase monosit dan neutrofil. Dosis pemberian ekstrak sebanyak 15 g ekstrak /kg pakan mampu memberikan peningkatan jumlah eritrosit dan limfosit paling optimal dibandingkan dosis 5 dan 10 g ekstrak / kg pakan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pula mengenai waktu optimum pemberian ekstrak agar penggunaannya tepat guna dan dapat memberikan respon yang optimum terhadap sistem pertahanan nonspesifik ikan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian mengenai kemungkinan efek samping dari pemberian ekstrak yang dicampurkan dalam pakan pada ikan.

Daftar Pustaka

- Amlacher, E. 1970. Textbook of fish disease. Publication Nepture City . New Jersey. USA
- Anggadiredja, J. T., Ahmad Z, Heri P dan Sri I 2006. Rumput Laut. Penerbit Swadaya. Jakarta.

- Bachtiar, S.Y., W. Tjahjaningsih dan N. Sianita. 2012. Pengaruh Ekstrak Alga Coklat (*Sargassum sp.*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli*. *Journal of Marine and Coastal Science* 1(1) : 53-60.
- Brown, B.A. 1980. *Hematology Principles and Procedures*. Third Edition. Lea and Febiger. Philadelphia.
- Castro, R. I. Zarrab, & J. Lamas. 2004. Water-soluble Seaweed Extracts Modulate the *Pantoea agglomerans* lipopolysaccharide (LPS). *Fish Shellfish Immunol* (10) : 555-558
- Dellman H.D. dan Brown E.M. 1992. *Buku Teks Histologi Veteriner. Edisi 3*. Hartono (Penerjemah). UI Press, Jakarta
- Erika, Y. 2008. Gambaran Diferensiasi Leukosit pada Ikan Mujair (*Oreochromis mossambica*) di Daerah Ciampoa Bogor. (Skripsi). Institut Pertanian Bogor.
- Fujaya, Y. 2002. *Fisiologi Ikan*. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Houghton P.J and Raman. 1998. *Laboratory Handbook for The Fractionation of Natural Extract*. Chapman and Hall. London. UK. 199 pp.
- Jain, N.C. 1993. *Essentials of Veterinary Hematology*. Lea and Febiger Publishing. Philadelphia. 417p.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2013. Laporan Tahunan Direktorat Produksi Tahun 2013. Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Jakarta. Diakses dari www.djpb.kkp.go.id (10 Juni 2015).
- Kresno, S.B. 2001. *Imunologi : Diagnosis dan Prosedur Laboratorium*. Edisi Ketiga. Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia. Jakarta. 437 hlm.
- Lagler KF, Bardach JE, RR Miller, Passino DRM. 1977. *Ichthyology*. John Willey and Sons. Inc. new York-London. 506 hal.
- Mulyani, S. 2006. Gambaran Darah Ikan Gurame *Osporonemus gouramy* Yang Terinfeksi Cendawan *Achlya sp.* pada Kepadatan 320 dan 720 Sppora per mL. *Skripsi*. Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Navarre, O. and J. E. Halver. 1989. Disease Resistance and Humoral Antibody Production in Rainbow Trout Fed High Levels of Vitamin C. 79 : 207-221
- Parelberg, A., A. Ronen., M. Hutoran., Y. Smith and M. Kotler. 2005. Protection of an attenuated virus vaccine. *J. Vaccine* 23: 3396-3403.
- Purwanto, A. 2006. Gambaran Darah Ikan Mas *Cyprinus carpio* Yang Terinfeksi Koi Herpes Virus. *Skripsi*. Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Radji, M. 2015. *Imunologi dan Virologi : Edisi Revisi*. Isfi Penerbitan. Jakarta. 354 hal.
- Svobodova Z, Vyukusova B. 1991. *Diagnostik, Prevention and Therapy of Fish Disease and Intoxication*. Research Institute of fish Culture and Hydrobiology Vodnany Czechoslovakia. <http://www.fao.org/fi/website/firetriveaction.do?dom=topic&fid=16064&lang=en> diakses : 21 September 2015
- Tizard I. 1982. *Veterinary Immunology, An Introduction*. Ed Ke-3. W.B. Saunders Company, Canada.

