

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN



Fokus Utama

Aplikasi Teknologi Asap Cair Dalam Pengolahan dan Pengawetan Produk Perikanan di Pulau Mandangin

Pakan Alternatif dari Limbah Sayuran untuk Ikan Nila Hitam (*Oreochromis niloticus*)



Efektivitas Vaksinasi *Crude* dan *Soluble Protein* Spora *Myxobolus koi* Terhadap Tingkat Kerusakan Usus Ikan Koi (*Cyprinus carpio* Koi)



Peningkatan Nilai Nutrisi *Pollard* Melalui Fermentasi Ragi Tempe Sebagai Bahan Pakan Buatan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

GIS Application to Determine Critical Condition and Rehabilitation Model of Mangrove Ecosystem in Southern Coast of Pamekasan Region Madura



Pengaruh Alga Merah (*Kappaphycus alvarezii*) Terhadap Mutu Ikan Kembung (*Rastrelliger* sp.)

Identifikasi dan Prevalensi Cacing pada Saluran Pencernaan Ikan Salem (*Scomber japonicus*) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara



Studi Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Forskall) di Tambak Sekitar Perairan Sungai Buntung, Kabupaten Sidoarjo

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 7, Nomor 1, April 2015

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi
Moch. Amin Alamsjah

Penyunting Pelaksana

Gunanti Mahasri
Laksmi Sulmartiwi
Endang Dewi Masitha
A. Taufik Mukti
A. Shofy Mubarak
Kustiawan Tri Pursetyo
Sapto Andriyono
Anita Erna Faricha

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan diterbitkan dua kali per tahun oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair yang memuat hasil penelitian dan komunikasi singkat dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan (Akuakultur, Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan/Pascapanen, Teknologi Penangkapan Ikan, Ilmu Kelautan, Oceanografi, Agribisnis dan Penyuluhan Perikanan)

Alamat Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan :

Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Airlangga
Jl. Mulyorejo (Kampus C Unair)
Surabaya 60115
Telp. 031 - 5911451
Fax. 031 - 5965741
E-mail :
sjfm_unair@yahoo.com
sjfm_unair@unair.ac.id
Website :
www.journal.unair.ac.id

Rekening :
No. Rekening : 141 - 00 - 0980121 - 8
Atas Nama : Laksmi Sulmartiwi
Bank : Bank Mandiri
Cabang Surabaya - Unair

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Volume 7 Nomor 1 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Format jurnal penerbitan kali ini merupakan perubahan dari Jurnal Berkala Ilmiah Perikanan dengan tetap melakukan penerbitan 2 kali dalam setahun (bulan April dan November).

Pokok bahasan penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan menampilkan *headline* presentasi hasil penelitian pada bidang bioteknologi perikanan, genetika dan reproduksi nutrisi, penyakit dan kesehatan lingkungan. Secara umum, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan tetap menerima artikel hasil penelitian dan komunikasi singkat dalam bidang ilmu lainnya seperti pemanfaatan sumberdaya perairan, teknologi hasil perikanan, ilmu kelautan dan sosial ekonomi perikanan.

Pihak Redaksi Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua rekan sejawat yang intens mendukung penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan mejadi lebih baik. Terakhir, kritik dan saran tetap kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Hormat kami,

Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 7, Nomor 1, April 2015

DAFTAR ISI

Aplikasi Teknologi Asap Cair Dalam Pengolahan dan Pengawetan Produk Perikanan di Pulau Mandangin	1 - 6
Sapto Andriyono, Wahyu Thajaningsih, Agustono, Endang Dewi Masithah, Kustiawan Tri Pursetyo, Annur Ahadi Abdillah dan Heru Pramono	
IbM Bagi Petambak Udang Tradisional di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, yang Mengalami Gagal Panen Secara Terus Menerus	7 - 15
Sudarno, Gunanti Mahasri dan Kismiyati	
Peningkatan Hasil Panen Udang pada Budidaya Udang Tradisional di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk Mengurangi Waktu Panen Menggunakan Metode Best Management Practice (BMP)	17 - 23
Muhammad Arief, Gunanti Mahasri dan Akhmad Taufiq Mukti	
Isolasi dan Identifikasi <i>Vibrio</i> sp. pada Produk Seafood Tradisional Area Timur Kota Surabaya	25 - 29
Heru Pramono, Hafizh M. Noor, Siti Sahatul Fatimah, Nur Aida Harahap and Alief Ayu Selia	
Perbandingan Morfologi Kerang Darah di Perairan Kenjeran dan Perairan Sedati	31 - 33
Kustiawan Tri Pursetyo, Wahyu Tjahjaningsih dan Heru Pramono	
Pakan Alternatif dari Limbah Sayuran untuk Ikan Nila Hitam (<i>Oreochromis niloticus</i>)	35 - 37
Aisya Maulyna Santoso dan Abdul Manan	
Deteksi Koi Herpesvirus (KHV) pada Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) yang Diinfeksi Secara Buatan	39 - 45
Muhammad Sungging Pradana, Suwarno dan Hari Suprpto	
Pigmen Rumput Laut Merah (<i>Acanthophora spicifera</i>) Sebagai Alternatif Pewarna Alami pada Produk Sosis Ikan Lele Dumbo (<i>Clarias gariepinus</i>)	47 - 53
Yiyik Windah Yulianti, Moch. Amin Alamsjah dan Riesta P.H.	
Efektivitas Vaksinasi <i>Crude</i> dan <i>Soluble Protein Spora Myxobolus koi</i> Terhadap Tingkat Kerusakan Usus Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio</i> Koi)	55 - 60
Rachma Woro Anggarani, Gunanti Mahasri dan Lucia Tri Suwanti	
Prevalensi dan Tingkat Kelulushidupan Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) yang Diuji Tantang Dengan Protein Spora Utuh <i>Myxobolus koi</i> di Tambak	61 - 66
Nedi, Gunanti Mahasri dan Mufasirin	
Peningkatan Nilai Nutrisi <i>Pollard</i> Melalui Fermentasi Ragi Tempe Sebagai Bahan Pakan Buatan Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	67 - 70
Miftakhul Munir, Romziah Sidik dan Gunanti Mahasri	
Analisis Respons Imun Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio koi</i>) yang Divaksin Dengan <i>Whole Protein Spora Myxobolus koi</i> Sebagai Kandidat Vaksin Myxobolus	71 - 78
Mohamad Yusuf, Gunanti Mahasri dan Mufasirin	
GIS Application to Determine Critical Condition and Rehabilitation Model of Mangrove Ecosystem in Southern Coast of Pamekasan Region Madura	79 - 86
Zainul Hidayah	

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 7, Nomor 1, April 2015

DAFTAR ISI

Pengaruh Alga Merah (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) Terhadap Mutu Ikan Kembung (<i>Rastrelliger sp.</i>)	87 - 93
Ayu Lana Nafisyah, Wahyu Tjahjaningsih, Rahayu Kusdarwati dan Annur Ahadi Abdillah	
Pengaruh Penambahan <i>Crude Fish Oil</i> (CFO) pada Pakan Udang Vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>) Terhadap Kandungan Kolesterol dan Retensi Lemak Daging	95 - 99
Agustono, Widya Paramitha Lokapirnasari dan Azharur Riyadh	
Pengaruh Ekstrak Alga Merah (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) Terhadap Jumlah Total Bakteri dan Nilai Organoleptik Ikan Kembung (<i>Rastrelliger sp.</i>)	101 - 107
Dyo Maliki Hakim, Wahyu Tjahjaningsih, Sudarno dan Annur Ahadi Abdillah	
Identifikasi dan Prevalensi Cacing pada Saluran Pencernaan Ikan Salem (<i>Scomber japonicus</i>) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara	109 - 114
Rengga Eko Pradipta, Sri Subekti dan Kismiyati	
Studi Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (<i>Chanos chanos</i> Forskall) di Tambak Sekitar Perairan Sungai Buntung, Kabupaten Sidoarjo	115 - 120
Rr. Juni Triastuti, Singgih Aditama dan Boedi Setya Rahardja	

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1. Ketentuan Umum
 - a. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan memuat tulisan ilmiah dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan, berupa hasil penelitian, artikel ulasan balik (review/mini review) dan laporan kasus baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
 - b. Naskah/makalah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan. Apabila diterima untuk dimuat dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, maka tidak boleh diterbitkan dalam majalah atau media yang lain.
2. Standar Penulisan
 - a. Makalah diketik dengan jarak 2 spasi, kecuali Judul, Abstrak, Judul tabel, Judul gambar, Daftar pustaka, dan Lampiran diketik menurut ketentuan tersendiri.
 - b. Alinea baru dimulai 3 (tiga) ketukan ke dalam atau (*first line 0.3"*).
 - c. Huruf standar untuk penulisan adalah Times New Roman 12.
 - d. Memakai kertas HVS ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm).
 - e. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - f. Tabel/Illustrasi/Gambar harus hitam putih, amat kontras atau *file scanning* (apabila sudah disetujui untuk dimuat).
3. Tata cara penulisan naskah/makalah ilmiah
 - a. Tebal seluruh makalah sejak awal sampai akhir maksimal 12 (dua belas) halaman.
 - b. Penulisan topik (Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metode dst.) tidak menggunakan huruf kapital (*sentence*) tetapi menggunakan *Title Case* dan diletakkan di pinggir (sebelah kiri).
 - c. Sistematika penulisan makalah adalah Judul, Nama Penulis dan Identitas, Abstrak dengan Key words, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih (bila ada), Daftar Pustaka.
 - d. Judul harus pendek, spesifik, tidak boleh disingkat dan informatif, yang ditulis dalam bahasa Inggris.
 - e. Nama penulis di bawah judul, identitas dan instansi penulis harus jelas, tidak boleh disingkat dan ditulis di bawah nama penulis.
 - f. Abstrak maksimal terdiri dari 200 (dua ratus) kata, diketik 1 (satu) spasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
 - g. Kata kunci (*Key words*) maksimum 5 (lima) kata setelah abstrak.
 - h. Materi dan Metode memuat peralatan/bahan yang digunakan terutama yang spesifik.
 - i. Daftar Pustaka disusun secara alfabetik tanpa nomor urut. Singkatan majalah/jurnal berdasarkan tata cara yang dipakai oleh masing-masing jurnal. Diketik 1 (satu) spasi dengan paragraf hanging 0.3" dan before 3.6 pt. Proporsi daftar pustaka, Jurnal/Majalah Ilmiah (60%), dan *Text Book* (40%). Berikut contoh penulisan daftar pustaka berturut-turut untuk *Text Book* dan Jurnal.
Roitt, I., J. Brostoff, and D. Male. 1996. *Immunology*. 4th Ed. Black Well Scientific Pub. Oxford.
Staropoli, I., J. M. Clement, M. P. Frenkiel, M. Hofnung and V. Deuble. 1996. Dengue-1 virus envelope glycoprotein gene expressed in recombinant baculovirus elicits virus neutralization antibody in mice and protects them from virus challenge. *Am.J. Trop. Med. Hygi*; 45: 159-167.
 - j. Tabel, Keterangan Gambar atau Penjelasan lain dalam Lampiran diketik 1 (satu) spasi, dengan huruf Times New Roman 12.
4. Pengiriman makalah dapat dilakukan setiap saat dalam bentuk cetakan (*print out*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Setelah ditelaah oleh Tim Editor Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, makalah yang telah direvisi penulis segera dikembalikan ke redaksi dalam bentuk cetakan 1 (satu) eksemplar dengan menyertakan makalah yang telah direvisi dikirim via e-mail ke Dewan redaksi Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan ke alamat: **Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo (Kampus C Unair) Surabaya 60115, Telp./Fax. 031-5911451; E-mail : sjfm_unair@yahoo.com; sjfm_unair@unair.ac.id; Website: www.journal.unair.ac.id**
5. Ketentuan akhir terhadap naskah/makalah yang dikirim, redaksi berhak untuk :
 - a. memuat naskah/makalah tanpa perubahan
 - b. memuat naskah/makalah dengan perubahan
 - c. menolak naskah/makalah
6. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi naskah/makalah.
7. Makalah yang telah dimuat dikenai biaya penerbitan dan biaya pengiriman.
8. Penulis/pelanggan dapat mengirimkan biaya pemuatan makalah/langganan lewat transfer ke Bank Mandiri Cabang Surabaya - Unair No Rek. 141 - 00 - 0980121 - 8 (Laksmi Sulmartiwi).
9. Semua keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat untuk keperluan itu.

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 7, Nomor 1, April 2015

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi, penulis dan pembaca Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan memberikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pakar di bawah ini selaku mitra bestari Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan.

Prof. Dr. Sri Subekti, DEA., drh. (FKH, UNAIR)
Prof. Dr. Sri Agus Soedjarwo, Ph.D., drh (FKH, UNAIR)
Prof. Dr. Ir. Marsudi, M.Sc. (FPIK, UNIBRAW)
Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. (FPIK, IPB)
Prof. Dr. Ir. Feliatra, M.Sc. (FPIK, UNRI)
Prof. Dr. Sakri Ibrahim (FSAM, UMT, Malaysia)
Dr. Muhammad Yunus, M.Sc., drh (FKH, UNAIR)
Dr. Widjiati, M.Si., drh (FKH, UNAIR)
Dr. Ir. Murdjani, M.Sc. (BBPBAL Lampung)
Dr. Ir. Triyanto, M.Si. (Faperta, UGM)
Dr. Ir. Agung Sudaryanto, M.Sc. (FPIK, UNDIP)

**IDENTIFIKASI DAN PREVALENSI CACING PADA SALURAN PENCERNAAN IKAN SALEM
(*Scomber japonicus*) DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN MUARA ANGKE, JAKARTA
UTARA**

**IDENTIFICATION AND PREVALENCE OF HELMINTHIC GASTROINTESTINAL IN CHUB
MACKEREL (*Scomber japonicus*) IN THE FISH LANDING BASE MUARA ANGKE, NORTH
JAKARTA**

Rengga Eko Pradipta, Sri Subekti dan Kismiyati

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo - Surabaya, 60115 Telp. 031-5911451

Abstract

The high interest of public to Marine fish, making more request of chub mackerel (*Scomber japonicus*). Chub Mackerel is one commodity that has economic and high nutrient value. The Chub Mackerel obtained from the Indonesian importation from China. However, fish importation can be affected by diseases caused by helminthic endoparasites infection.

The parasites that infected chub mackerel probably be caused by pollution due to environmental factors that could decreased the immune system, and making a fish easily infected by helminthic endoparasite as *Anisakis*. This parasite is zoonosis and could infected to human. Therefore, identification and prevalence of this parasite was needed in order to human consumed and managed this fish correctly.

The purpose of this study was to identify and to know the prevalence of this helminth that infected a chub mackerel fish (*Scomber japonicus*) from fish importation that were sold in Fish Landing Base Muara Angke, North Jakarta. Research methodology using survey methods through sampling at locations directly. Fish samples were examined as many as 60 samples of chub mackerel. The main parameters are observed prevalence of helminth and helminth that infect in gastrointestinal chub mackerel. The result identification of helminth that infect chub mackerel descriptively analyzed and presented in the form of figures and tables.

The result showed the presence of the third-stage larvae *Anisakis simplex* that infected the intestinal mucosa and lumen of chub mackerel fish, in Fish Landing Base Muara Angke, North Jakarta with prevalence was 70%.

Keywords : Chub Mackerel, Prevalence, *Anisakis simplex*, and Zoonosis

Pendahuluan

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke berada di Jakarta Utara dan merupakan tempat pendaratan ikan terbesar di Jakarta Utara. PPI Muara Angke memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut serta berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada tahun 2012 mampu menghasilkan ikan mencapai 20.085.570 kg ikan laut dengan nilai Rp. 40.018.938.730,00, dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 18.753.870 kg ikan laut dengan nilai Rp. 37.561.781.640,00 (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2013).

Salah satu ikan yang dipasarkan di TPI Muara Angke adalah Ikan salem (*Scomber japonicus*). Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (2012) telah menetapkan bahwa ikan salem (*Scomber*

japonicus) merupakan ikan impor sebagai bahan baku industri pengolahan ikan tradisional berupa pemindangan di Indonesia dan dipasarkan di TPI dalam keadaan beku. Menurut data Direktorat Jenderal Perikanan (2013), impor ikan salem pada tahun 2012 mencapai 120.436 ton, mengalami peningkatan dimana pada tahun 2011 mencapai 93.781 ton. Menurut (Hernandez and Ortega, 2000). ikan salem merupakan ikan yang hidup bebas di alam pada perairan epipelagik hingga mesopelagik (biasanya 50-300 m) dan hidup bergerombol dengan sesama jenis dan ukurannya. Pada malam hari, secara bergerombol ikan salem naik ke permukaan laut untuk memangsa euphausiids, copepods, amphipods, anchovies, dan cumi-cumi kecil sehingga ikan salem termasuk golongan ikan karnivora.

Ikan sama seperti makhluk hidup lainnya, tidak pernah lepas dari ancaman

berbagai penyakit dan salah satunya penyebab penyakit tersebut adalah parasit. Parasit merupakan organisme yang hidup pada atau di dalam organisme lain, mengambil makanan dari organisme yang ditumpanginya untuk berkembang biak (Subekti dan Mahasri, 2010). Berdasarkan habitatnya, parasit dalam tubuh ikan dibagi menjadi dua yaitu ektoparasit (parasit yang menyerang bagian permukaan tubuh ikan atau pada rongga yang berhubungan langsung ke permukaan tubuh ikan, misalnya pada insang, sirip dan kulit), dan endoparasit (parasit yang menginfeksi organ bagian dalam tubuh ikan, misalnya usus, ginjal dan hati) (Olsen, 1974). Infeksi parasit dapat menyebabkan kerugian pada inang definitif misalnya menghambat pertumbuhan dan penurunan produksi. Infeksi cacing pada manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia (zoonosis) yang ditandai dengan gejala sakit pada abdomen, kejang dan muntah (Palm, 2008). Oleh karenanya diperlukan pemahaman terhadap cacing parasitik dan penyakit yang ditimbulkannya terutama yang berasal dari ikan untuk dapat mengembangkan berbagai produk asal ikan terutama untuk konsumsi manusia (Yamaguti 1958 dalam Emelina 2008).

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dan juga karena sedikitnya informasi mengenai jenis parasit apa saja yang menyerang ikan salem (*Scomber japonicus*), maka perlu dilakukan penelitian tentang identifikasi dan prevalensi cacing pada saluran pencernaan ikan salem (*Scomber japonicus*) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara

Materi dan Metode

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga dan Balai Karantina Ikan Tanjung Priok pada bulan Maret-April 2014. Pengambilan sampel dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara.

Alat dan Bahan

Peralatan yang akan digunakan dalam pemeriksaan parasit adalah gunting, pinset, pisau bedah dan nampan. Alat yang digunakan untuk identifikasi parasit adalah gelas objek, *cover glass*, dan mikroskop.

Bahan yang diperlukan untuk proses identifikasi endoparasit adalah ikan sampel, tisu dan aquades sedangkan bahan yang digunakan untuk pewarnaan parasit yang ditemukan adalah larutan alkohol gliserin 5%, zat pewarna

carmine, alkohol asam, alkohol basa, alkohol 70%, alkohol 85%, alkohol 95%, Hungs I dan Hungs II.

Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan yaitu dengan mengambil ikan dari Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke. Perhitungan masing-masing jumlah sampel ikan yang diambil sebesar 5-10% dari jumlah total populasi ikan (Balai Karantina Ikan Batam, 2007). Jumlah populasi rata-rata impor ikan salem di PPI Muara Angke sebanyak 450 ekor per hari. Pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*) sebanyak tiga kali. Masing-masing pengambilan ikan sebanyak 20 ekor ikan salem.

Pemeriksaan Parasit

Sampel diambil dan diletakkan di atas nampan, kemudian dilakukan pembedahan dengan gunting mengarah ke anterior tubuh sampai pada bagian sirip ventral, kemudian digunting ke arah dorsal ikan sampai pada bagian gurat sisi lalu digunting mengarah pada bagian anal ikan. Lambung ikan bagian anterior dipotong sampai pada bagian posterior usus, kemudian diperiksa di atas cawan petri dan diinsisi untuk diperiksa keberadaan cacing pada organ tersebut. Cacing yang ditemukan disimpan di dalam larutan alkohol glycerin 5%. (Aryani, 2012).

Pewarnaan Ektoparasit

Pewarnaan cacing yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan salem (*Scomber japonicus*) dilakukan berdasarkan Kuhlman (2006) dengan cara cacing disimpan dalam alkohol gliserin 5% selama 24 jam. Kemudian dimasukkan dalam alkohol 70% selama lima menit. Setelah itu, memindahkan cacing dalam larutan carmine selama empat jam, kemudian cacing dipindahkan dalam larutan alkohol asam selama dua menit. Setelah selesai, dipindahkan dalam larutan alkohol basa selama 20 menit. Selanjutnya dilakukan dehidrasi bertingkat dengan alkohol 70%, 85%, dan 95% masing-masing selama lima menit. Kemudian dilakukan mounting dengan menggunakan Hungs I, cacing diambil lalu diletakkan di *object glass*, dan ditetesi larutan Hungs II, kemudian ditutup dengan *cover glass*.

Perhitungan Prevalensi


Prevalensi adalah besarnya persentase ikan yang terinfestasi dari ikan contoh yang diperiksa. Menurut Mohammed (2007)

prevalensi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prevalensi} = \frac{\text{Jumlah ikan yang terserang}}{\text{Jumlah sampel ikan yang diperiksa}} \times 100\%$$


Hasil identifikasi cacing dari 60 sampel ikan yang telah diperiksa pada saluran pencernaan ikan salem (*scomber japonicus*) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke Jakarta Utara hanya ditemukan satu jenis species yaitu larva stadium tiga *Anisakis simplex*. Cacing dari Ordo Ascaridida tersebut ditemukan menempel di permukaan dinding perut, lambung, otot, dan usus (mukosa dan lumen).

Cacing yang ditemukan menurut kunci identifikasi adalah larva stadium tiga *Anisakis simplex*, cacing tersebut merupakan Phylum dari Nematelminthes, Kelas Nematoda, Ordo Ascaridida, Famili Anisakidae, Genus *Anisakis* (Grabda, 1991). Larva stadium tiga *A. simplex* yang ditemukan memiliki warna putih susu, berukuran panjang 10-29 mm dengan diameter 0,4-0,9 mm, ditemukan dalam bentuk lurus dan melingkar (coil) yang dibungkus oleh kista halus. Larva stadium tiga *Anisakis simplex* yang ditemukan memiliki bentuk tubuh silindris memanjang, di bagian anterior (Gambar 1) cacing tersebut memiliki bibir (*larval tooth*) yang mengelilingi mulut, organ tersebut digunakan untuk mengambil makanan dari inang. Sedangkan di bagian posterior terdapat mukron dan saluran ekskresi (Gambar 2). Selain itu larva ketiga *A. simplex* juga memiliki esophagus yang lurus berbentuk silindris, dan dilanjutkan dengan adanya ventrikulus berupa otot yang menghubungkan langsung pada usus. Ventrikulus yang terletak di antara esophagus dan usus menjadi ciri khas *A. simplex* dari jenis nematoda lainnya.



Gambar 1. Larva stadium tiga *Anisakis simplex* pada ikan salem (mikroskop binokuler)

Keterangan : A. Bagian anterior *A. simplex* (perbesaran 100x)
 B. Bagian posterior *A. simplex* (perbesaran 100x)
 C. Bagian ventriculus *A. simplex* (perbesaran 40x)



Gambar 2. Larva tiga *Anisakis simplex* pada ikan salem (Camera Lucida)

Keterangan : (a) bagian anterior *A. simplex*. (b) bagian posterior *A. simplex*. (c) bagian ventriculus *A. simplex*. Skala bar = 0,5mm (a-b) dan 0,8mm (c).

Prevalensi Larva Cacing *Anisakis simplex*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat prevalensi cacing pada setiap ukuran panjang ikan bervariasi. Data perhitungan prevalensi cacing pada ikan salem berdasarkan panjang ikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Prevalensi dan Intensitas Infeksi Larva Stadium Tiga *Anisakis simplex* Berdasarkan Perbedaan Ukuran Panjang Ikan Salem

Panjang ikan (cm) / fase	Jumlah Ikan	Ikan yang terinfeksi	Prevalensi (%)
18 – 28 (muda)	51	34	66,67
29 – 30 (dewasa)	9	9	100
Jumlah	60	42	70

Tabel 1. menjelaskan dari hasil penelitian terhadap 60 ekor ikan salem (*Scomber japonicus*) yang didapatkan di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke ditemukan hasil 42 ekor ikan yang terinfeksi larva ketiga *Anisakis simplex* dengan prevalensi 70. Berdasarkan perbedaan ukuran ikan terdapat 51 ekor ikan salem dengan ukuran 18 – 28 cm, 34 ekor diantaranya terinfeksi larva ketiga *A. simplex* dengan prevalensi 66,67%, dan 9 ekor berukuran 29 – 30 cm, semua ikan terinfeksi sehingga prevalensinya 100%. Panjang ikan dibedakan sesuai dengan kategori fase ukuran ikan salem (*Scomber japonicus*) yang telah ditentukan oleh Hernandez and Ortega (2000) yang menyebutkan ikan muda mempunyai ukuran 15 – 28 cm dan ikan dewasa mempunyai ukuran lebih dari 28 cm.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan larva stadium tiga *Anisakis simplex* yang berwarna putih susu dan telah memiliki *larval tooth* dan mukron. *A. simplex* yang ditemukan memiliki saluran ekskresi di bagian posterior dan memiliki esophagus, ventrikulus dan usus yang terlihat jelas. Sugane *et al.* (1992) menerangkan bahwa karakteristik *Anisakis simplex* mempunyai *larval tooth* yang menonjol di ujung anterior. *A. simplex* biasa ditemukan melingkar dan berwarna putih atau cream dengan struktur usus anterior lurus yang terdiri dari esophagus, ventriculus, dan usus.

Infeksi cacing *Anisakis simplex* pada ikan salem (*Scomber japonicus*) disebabkan akibat ikan salem yang memakan euphausiids yang telah terinfeksi oleh larva stadium tiga *Anisakis simplex*. Crone *et al.* (2009) menyatakan bahwa ikan salem (*Scomber japonicus*) merupakan ikan karnivora yang memakan organisme kecil di sekitar habitatnya antara lain euphausiids, copepods, amphipods, anchovies, dan cumi-cumi kecil sehingga parasit lebih banyak yang menginfeksi dibanding ikan pemakan plankton (herbivora). Rucket *et al.*,

(2009) menjelaskan bahwa keberadaan cacing endoparasit di dalam tubuh ikan juga bisa disebabkan karena adanya organisme invertebrata seperti crustacea di sekitar habitat dari ikan salem, yang juga merupakan salah satu jenis pakan alami dari ikan salem.

Crustacea dan ikan kecil merupakan inang antara bagi *A. simplex*, sedangkan ikan salem merupakan inang paratenik, sehingga *A. simplex* yang ditemukan masih dalam tahap larva stadium tiga. Klimpel *et al.*, (2004) menerangkan bahwa *Anisakis simplex* membutuhkan crustacea kecil (euphausiids) dan larva ikan kecil sebagai inang antaranya. Sebelum mencapai tahap cacing dewasa ketika menginfeksi inang definitifnya yaitu mamalia laut, *Anisakis simplex* masih berupa larva stadium tiga di inang paratekniknya (piscivores / herring).

Infeksi cacing larva tiga *A. simplex* pada ikan tidak menunjukkan gejala klinis yang khas, sebab ikan sampel yang diamati tidak mengalami perubahan pada bagian eksternalnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sarjito dan Desrina (2005) yang menyatakan bahwa infeksi endoparasit tidak menunjukkan gejala klinis eksternal dan sulit untuk terdeteksi dengan cepat, sehingga perlu dilakukan pembedahan dan pengamatan organ dalamnya.

Distribusi infeksi larva cacing *Anisakis simplex* pada ikan salem (*Scomber japonicus*) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke terdapat pada dinding perut, lambung, usus, dan otot sedangkan pada organ lainnya tidak ditemukan larva cacing *A. simplex*. Menurut Williams and Jones (1994) mikrohabitat parasit adalah lingkungan/tempat yang mendukung kehidupan parasit. Lingkungan / tempat tinggal tersebut harus tersedia makanan, oksigen dan faktor lainnya termasuk di dalamnya kompetisi antar spesies. Menurut Rakibuzzaman (2011) persebaran *Anisakis simplex* pada beberapa organ yaitu untuk melengkapi siklus hidupnya. Terdapatnya *Anisakis simplex* pada rongga tubuh dan saluran pencernaan karena banyaknya sumber bahan organik yang siap serap oleh cacing tersebut, sebagaimana diketahui makanan dari parasit nematoda adalah sel jaringan dan cairan tubuh.

Tingkat prevalensi larva stadium tiga *A. simplex* pada ikan salem (*Scomber japonicus*) di pangkalan pendaratan ikan Muara Angke sebesar 70%. Menurut kategori infeksi berdasarkan Williams and Williams (1996), prevalensi ikan salem yang telah diteliti termasuk kategori *Usually* (89-70%), masih tergolong satu kategori dari penelitian yang

dilakukan oleh Cisse and Belghyti (2005) dengan prevalensi 86,67%.

Hasil penelitian terhadap ikan salem (*Scomber japonicus*) memperlihatkan adanya hubungan antara ukuran panjang ikan dengan prevalensi dan intensitas infeksi *Anisakis simplex*. Berdasarkan perbedaan ukuran ikan terdapat 51 ekor ikan salem dengan ukuran 18 – 28 cm, 34 ekor diantaranya terinfeksi larva ketiga *A. simplex* dengan prevalensi 66,67%, dan 9 ekor berukuran 29 – 30 cm, semua ikan terinfeksi sehingga prevalensinya 100%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perbedaan ukuran ikan dengan prevalensi dimana menurut kategori infeksi, ukuran ikan 18 – 28 termasuk kategori *frequently*, sedangkan ukuran ikan 29 – 30 termasuk kategori yang paling tinggi yaitu *always*. Prevalensi dan intensitas ini dipengaruhi oleh ukuran ikan salem (*Scomber japonicus*), semakin besar ukuran ikan maka semakin besar kesempatan ikan terpapar oleh *A. simplex*. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Hariyadi (2006) yang menyebutkan infeksi larva *Anisakis simplex* meningkat dengan makin bertambahnya ukuran ikan. Semakin panjang ukuran ikan berarti umur ikan semakin bertambah, sehingga kesempatan terpapar oleh larva cacing *Anisakis simplex* juga semakin banyak. Komentar tersebut didukung oleh Mahmoud and Mahmoud (2005) yang mengungkapkan bahwa tubuh ikan adalah tempat untuk kolonisasi parasit. Semakin luas permukaan tubuh ikan, maka koloni parasit juga bertambah, sehingga nilai prevalensi dan intensitas parasit meningkat. Selain faktor tersebut, umur ikan juga mempengaruhi prevalensi dan intensitas sebagaimana dijelaskan oleh Kennedy (1975) bahwa semakin tua ikan, berarti semakin lama waktu yang dimiliki ikan untuk kontak dengan parasit, sehingga prevalensi dan intensitas parasit meningkat sesuai dengan umur ikan.

Cacing parasit pada ikan salem yang telah diteliti tidak terdapat keragaman. Hal ini dimungkinkan karena ikan salem hidup di satu tipe perairan saja. Menurut Mahmoud and Mahmoud (2005) ikan yang menghabiskan seluruh siklus hidupnya hanya di satu tipe perairan akan memiliki parasit lebih sedikit daripada ikan yang berpindah-pindah, sebaliknya ikan yang hidup di dua perairan yang berbeda cenderung memiliki parasit lebih beragam. Ikan salem, meskipun nilai prevalensi parasitnya cenderung naik tetapi keragaman spesies parasitnya rendah.

Nilai prevalensi pada ikan salem yang tergolong tinggi ini dapat berpotensi zoonosis.

Anisakis simplex dapat menginfeksi manusia melalui mekanisme memakan ikan *Scomber japonicus* yang kurang masak. Dalam tubuh manusia larva akan hidup dan umumnya tetap sebagai larva stadium ketiga, larva tersebut menembus jaringan mukosa usus, kasus infeksi umumnya tidak menunjukkan gejala tetapi larvanya terkadang bisa ditemukan ketika larva hidup keluar melalui muntah atau feses (Sugane et al., 1992). *Anisakis simplex* pada manusia dapat menyebabkan beberapa gejala antara lain rasa sakit pada perut bagian bawah, mual, muntah, demam, diare, dan adanya darah dalam feses. Untuk mencegahnya agar tidak mengkonsumsi ikan yang kurang matang, sebaiknya memakan ikan yang matang seperti hasil penggorengan karena minyak goreng memiliki titik didih 200°C (Miyazaki, 1991). Kasus *Anisakiasis* sering dijumpai di negara Jepang, pada tahun 2011 Jepang menyumbang 90% dari semua kasus *Anisakiasis*, hal ini disebabkan karena mayoritas masakan tradisional Jepang menggunakan ikan yang kurang matang (sushi dan sashimi). Di negara lain misalnya Italia, zoonosis *Anisakis simplex* juga ditemui di beberapa daerah pesisir, yang sebagian besar disebabkan oleh konsumsi ikan laut yang mentah atau makanan berupa sushi, sashimi, dll (Bucci et al., 2013).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cacing yang ditemukan pada saluran pencernaan ikan salem (*Scomber japonicus*) yang diambil di Pangkalan Pendarata Ikan Muara Angke, Jakarta Utara adalah larva stadium tiga *Anisakis simplex*. Prevalensi ikan salem (*Scomber japonicus*) yang diambil sebanyak 60 ekor dari Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara yang terinfeksi oleh cacing larva stadium tiga *Anisakis simplex* sebesar 70% (*Usually*).

Dengan ditemukannya cacing *Anisakis simplex* pada saluran pencernaan ikan salem (*Scomber japonicus*), maka diperlukan pengolahan yang baik dan benar sebelum ikan tersebut dikonsumsi, karena bersifat zoonosis.

Daftar Pustaka

- Aryani, R. 2012. Identifikasi dan Prevalensi Cacing pada Saluran Pencernaan Ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) di Desa Ngrajek Magelang Jawa Tengah. Skripsi. Budidaya Perairan. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Airlangga. Surabaya. 43 hal.
- Balai Karantina Ikan Batam. 2007. Laporan Pemantauan HPI/HPIK Tahun 2007.

- Balai Karantina Ikan Batam. Batam. 52 hal.
- Bucci, C., G. Serena., M. Ivonne., Fortunato., C. Carolina., I. Paola. 2013. *Anisakis*, just think about it in an emergency!. Int. J. Infect. Dis. 17(11): 1071-1072.
- Cisse, M., and D. Belghyti (2005). Helminth Parasites of Chub Mackerel *Scomber japonicus* (Houttuyn, 1782) from Mehdiya-Kenitra Harbour (Atlantic Coast of Morocco). J.Aqu. Sci., 20 (1): 63-67.
- Crone, P. R., K. T. Hill, J. D. McDaniel, and N. C. H. Lo. 2009. Pacific Mackerel (*Scomber japonicus*) Stock Assessment for USA Management in the 2009-10 Fishing Year. Pacific Fishery Management Council. Ambassador Place. USA. 197 p.
- Dinas Kelautan dan Perikanan. 2013. Laporan Hasil Tangkapan Beberapa Ikan di Jakarta Utara. Departemen Perikanan. 34 hal.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 2012. Penetapan Jenis-Jenis Hasil Perikanan yang dapat Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Departemen Perikanan. 15 hal.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 2013. Statistik Perikanan Indonesia 2012. Departemen Pertanian. Jakarta. 75 hal.
- Emelina, N. 2008. Cacing Parasitik pada Insang Ikan Kembung (*Decapterus* spp). Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 56 hal. Pertanian Bogor. Hal 42.
- Grabda, J. 1991. Marine Fish Parasitology. VHC and PWN-Polish Scientific Publishers, New York. hal. 5-27.
- Hariyadi, A.R. (2006). Pemetaan Infestasi Cacing Parasitik dan Resiko Zoonosis pada Ikan Laut di Perairan laut Indonesia Bagian Selatan. Tesis. Bogor: Fakultas Kedokteran Hewan. Institut
- Hernandez, C. J. J. and A.T. S Ortega, 2000. Synopsis of Biological Data on The Chub Mackerel (*Scomber japonicus* Houttuyn, 1782). FAO Fish. Synop. 157. 77 p.
- Kennedy, C. R. 1975. Ecological Animal Parasitology. Blackwell Scientific Publications. Oxford London. pp. 53-61.
- Klimpel, S., H. W. Palm, S. Ruckert and U. Piatkowski. 2004. The Life Cycle of *Anisakis simplex* in The Norwegian Deep (Northern North Sea). Parasitol Res. 94: 1-9.
- Kuhlmann, W.F. 2006. Preservation, Staining, and Mounting Parasite Specimen. 8 hal.
- Mahmoud, N.E., and A.M. Mahmoud, (2005). Parasitological and Histopathological Studies on *Anisakis simplex* Larvae Infection Among Some Egyptian Marine Fishes and Experimental Anisakiasis in Mice. Egy. Vet. Med. Sci. Parasit. J., 2 (1): 213-231.
- Miyazaki, I. 1991. An Illustrated Book of Helminthic Zoonosis. Tokyo International Medical Foundation of Japan. Japan. 56 p.
- Mohammed, A. A. 2007. Parasites of Some Imported Fish. Thesis. Veterinary Medical Sciences. Zagazig University. Egypt. 110 p.
- Olsen, O. W. 1974. Animal Parasites, Their Life Cycles and Ecology. Park Press Baltimore University. 562 p.
- Palm, H.W. 2008. Molecular Genotyping of *Anisakis*. Journal of Science and Technology. Vol. 3. 8 pp.
- Rakibuzzaman, M. 2011. Comparative Study of Endoparasitic Infestation in *Scomber Colias* Collected from Sewage Lagoon. Journal of Science and Technology. 6 (2) : 6-7.
- Rucket, S., S. Klimpel, S. Al-Quraishy, H. Mehlhron, and H.W. Palm. 2009. Transmission of Fish Parasites into Grouper Mariculture (*Serranidae: Epinephelus coioides* (Hamilton, 1882)) in Lampung Bay, Indonesia. Parasitol 104: 523-532.
- Sarjito dan Desrina. 2005. Analisa Infeksi Cacing Endoparasit pada Ikan Kakap Putih (*Lates calcarifer* Bloch) dari Perairan Pantai Demak. Laporan Kegiatan Hasil Penelitian Dosen Muda. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro. Semarang. 18 hal.
- Sugane, K., S.H. Sun, and T. Matsuura, (1992). Radiolabelling of The Excretory-Secretory and Somatic Antigens of *Anisakis simplex* Larvae. J. Helminth., 66 (4): 305-309.
- Williams, H., and A. Jones. 1994. Parasitic Worm of Fish. Taylor and Francis Ltd., London, United Kingdom.
- Williams, E.H., and L.B. Williams. 1996. Parasites of Offshore Big Game Fishes of Puerto Rico and The Western Atlantic. Departement of Marine Sciences and Departement of Biology University of Puerto Rico : Puerto Rico 320p.