

RINGKASAN

Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menunjukkan pemberian ASI di Indonesia saat ini memprihatinkan. Di Surabaya, Puskesmas Sidotopo Wetan merupakan wilayah dengan cakupan ASI terendah pada tahun 2012. Data ini menunjukkan masih tingginya pemberian MP ASI dini di wilayah tersebut. Keluarga memiliki 4 fungsi dukungan yang perlu dioptimalkan untuk mencegah praktek pemberian MP ASI dini. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel independen yaitu dukungan keluarga yang terdiri dari dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental, dukungan emosional dengan variabel dependen yaitu praktek pemberian MP ASI dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional* dengan populasi berjumlah 340 orang. 66 sampel diambil secara *proporsional random sampling* dan dianalisis menggunakan *Chi-Square Fisher's Exact*. Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarga tidak berhubungan dengan praktek pemberian MP ASI dini ($p=0,142$), namun bila dirinci dalam setiap aspek dukungan keluarga, dukungan informasional ($p<0,001$) dan dukungan penilaian ($p<0,001$) memiliki hubungan signifikan dengan praktek pemberian MP ASI dini sedangkan dukungan instrumental ($p=0,520$) dan dukungan emosional ($p=0,117$) tidak berhubungan dengan praktek pemberian MP ASI dini.