

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari berbagai pustaka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kontrasepsi oral merupakan tipe obat yang efek sampingnya berhubungan dengan dosisnya sehingga efek samping kontrasepsi oral dapat diprediksi dari kandungan dosisnya.
2. Efek samping pada rongga mulut akibat penggunaan kontrasepsi oral dosis tinggi adalah peradangan gingiva atau gingivitis yang dapat berkembang menjadi penyakit periodontal, peningkatan aliran GCF (*gingival crevicular fluid*), gingivitis hiperplastik, *oedematous gingivitis*, gingival hiperplasia, *gingival melanosis*, resiko *dry socket* atau *localized osteitis*, *alveolar osteitis* setelah ekstraksi gigi, tampak gambaran *radiopaque* rahang secara radiologis dan perubahan pola trabekular.
3. Gambaran HPA gingiva pada pengguna kontrasepsi oral dengan dosis tinggi yaitu peningkatan vaskularitas, kapiler meningkat dan menonjol, peningkatan fibroblast, tampak kolagen yang berlebihan, edema, epitel hiperplastik, infiltrasi jaringan ikat subepitel oleh eosinofil, neutrofil, limfosit, sel plasma, dan sel PMN.