


**PERBEDAAN DAYA HAMBAT PEMBENTUKAN PLAK
GIGI ANTARA PERMEN KARET YANG
MENGANDUNG BAKING SODA DAN TANPA
BAKING SODA**

(PENELITIAN KLINIS)

SKRIPSI



Oleh :


PUSPARANI
(029912770)

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERBEDAAN DAYA HAMBAT PEMBENTUKAN PLAK
GIGI ANTARA PERMEN KARET YANG
MENGANDUNG BAKING SODA DAN TANPA
BAKING SODA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
Pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga
Surabaya




Disusun Oleh :

PUSPARANI
(029912770)

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Poernomo Agoes Wibisono, drg.MS.Sp.Perio
NIP. 130 808 968


Agung Krismariono, drg.Sp.Perio
NIP. 132 148 511

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

KESIMPULAN

Tidak didapatkan adanya perbedaan yang bermakna dalam menghambat pembentukan plak gigi antara permen karet yang mengandung baking soda dengan yang tidak mengandung baking soda sampai dengan 4 jam setelah penggunaan.

SARAN

Konsentrasi baking soda dalam permen karet perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dalam menghambat pembentukan plak gigi.