

# PERBEDAAN KEDALAMAN POKET PERIODONTAL SEBELUM DAN SESUDAH KURETASE

## SKRIPSI

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



Oleh :

DIAN PRAMATA SARI  
020012878

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004

**PERBEDAAN KEDALAMAN POKET PERIODONTAL  
SEBELUM DAN SESUDAH KURETASE**

**SKRIPSI**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi  
Pada Fakultas Kedokteran Gigi  
Universitas Airlangga  
Surabaya**

Oleh :

**DIAN PRAMATA SARI**  
020012878

Disetujui oleh :

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chiquita", written over a set of diagonal lines.

**Chiquita Prahasanti, drg., Sp.Perio**  
NIP : 131 459 654

**Pembimbing II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Soekanto", written over a set of diagonal lines.

**Soekanto, drg., MS**  
NIP : 130 695 878

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadi pengurangan kedalaman poket pada sisi mesiobukal / mesiolabial dan mesiopalatal / mesiolingual tiga minggu setelah kuretase.
2. Pengurangan kedalaman poket menunjukkan adanya penyembuhan penyakit periodontal.
3. Pengurangan kedalaman poket pada sisi mesiobukal / mesiolabial lebih besar daripada mesiopalatal / mesiolingual.
4. Sisi lingual/palatal relatif lebih sulit dibersihkan dan jarang diperhatikan kebersihannya daripada sisi bukal/labial.

Dengan hasil penelitian tersebut disarankan perawatan yang efektif untuk eliminasi poket adalah *scaling* yang dilanjutkan dengan kuretase.