

**PERBEDAAN EFEKTIVITAS
OBAT KUMUR HEXETIDINE 0,1%
DIBANDING OBAT KUMUR POVIDONE IODINE 1%
TERHADAP BAKTERI PLAK SUPRAGINGIVA**

SKRIPSI

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



Oleh :

YUNITA PRASANTI
020012882

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERBEDAAN EFEKTIVITAS
OBAT KUMUR HEXETIDINE 0,1%
DIBANDING OBAT KUMUR POVIDONE IODINE 1%
TERHADAP BAKTERI FLAK SUPRAGINGIVA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga Surabaya**

Oleh :

**YUNITA PRASANTI
020012882**

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



**Erni Maduratna S, drg., Mkes. Sp. Perio
NIP : 132006225**

Dosen Pembimbing II



**Poernomo Agus W, drg., MS, Sp. Perio
NIP : 130808968**

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

BAB VI

KESIMPULAN & SARAN

VI.1 KESIMPULAN

Berdasar penelitian tentang daya hambat antara obat kumur yang mengandung hexetidine 0.1% dengan obat kumur yang mengandung povidone iodine 1% terhadap bakteri plak supragingiva secara laboratoris, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- obat kumur hexetidine 0.1% dan povidone iodine 1% sama – sama memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan bakteri plak supragingiva
- secara bakteriologis tidak ada perbedaan efektifitas yang bermakna antara obat kumur hexetidine 0.1% dan povidone iodine 1% terhadap bakteri plak supragingiva
- Waktu penggunaan obat kumur baik 30 detik maupun 60 detik tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna dalam menghambat pertumbuhan bakteri plak supragingiva

VI.2 SARAN

- Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai efektivitas obat kumur Hexetidine 0.1% dan Povidone iodine 1% terhadap kuman tertentu.