

ABSTRAK

Kanker payudara adalah keganasan yang terjadi pada kantung dan/atau saluran penghasil susu. Pemakaian kontrasepsi oral merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kanker payudara.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral kombinasi dengan kejadian kanker payudara di Surabaya. Desain penelitian ini adalah *case control*. Pengumpulan data menggunakan lembar *checklist* pada 64 responden kelompok kasus dan 64 responden kelompok kontrol yang telah disesuaikan dengan kriteria inklusi. Analisis data menggunakan *chi square test*.

Hasil penelitian menunjukkan penderita kanker payudara yang pernah menggunakan kontrasepsi oral kombinasi minimal 5 tahun adalah 20,3 % dan tidak pernah menggunakan kontrasepsi oral kombinasi minimal 5 tahun adalah 79,6 %. Uji statistik *chi square test* menunjukkan bahwa nilai p sebesar 0,144. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral kombinasi dengan kejadian kanker payudara di Surabaya.

Kode kunci : pemakaian kontrasepsi oral kombinasi, kanker payudara.