

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan praktek kerja lapangan yang dilakukan di UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Timur di Tuban, Dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Prevalensi tertinggi pada tahun 2017 terdapat di Kota Tuban yaitu sebesar 6,69%, sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Gresik yaitu sebesar 0%. Sedangkan pada tahun 2018 prevalensi tertinggi terjadi pada Kota Lamongan yaitu sebesar 9,42%, sedangkan prevalensi terendah terjadi di Kabupaten Ngawi yaitu sebesar 0,22%.
2. Jenis cacing yang menginfeksi paling tinggi pada tahun 2017 yaitu *Fasciola sp.* sebanyak 114 kasus dengan jumlah tertinggi terjadi di Kab. Magetan dengan jumlah 44 kasus .Sedangkan Jenis cacing yang menginfeksi paling tinggi pada tahun 2018 yaitu *Fasciola sp.* sebanyak 202 kasus dengan jumlah tertinggi terjadi di Kab. Magetan dan Kab. Pacitan dengan jumlah 34 kasus.

5.2 Saran

1. Pengambilan hijauan hendaknya tidak dilakukan terlalu pagi maupun sore, karena kemungkinan kontaminasi telur dan larva cacing pada pakan hijauan lebih tinggi.