

PENGARUH PEMBERIAN
PAKAN ALAMI DAN PAKAN
BUATAN TERHADAP
PERTUMBUHAN BENIH IKAN
BETUTU (*Oxyeleotris marmorata*
Bleeker)

by Widya Paramita


Submission date: 05-Dec-2018 08:34AM (UTC+0800)

Submission ID: 1050757938

File name: Jurnal_Ilmiyah_Perikanan_dan_Kelautan_Vol._1_No._1_april_2009.pdf (596.42K)

Word count: 4942

Character count: 28759



Selamat & Sukses
Atas terbitnya volume perdana
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
UNAIR

Your Trusted Partner to Success



CP PRIMA
Pabrik Pakan Udang & Ikan
 Jl. Raya Surabaya - Mojokerto Km 19, Sidoarjo. Telpun : (031) 7875265, 7886352, Fax : (031) 7882088
 E-mail : shrimpmarketing@cpp.co.id



Volume 1 No. 1, April 2009

ISSN 2085-5842

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Fokus Utama

- Pemberian Probiotik Pada Pengolahan Limbah Udag Yang Dimasak Dengan Tekanan Tinggi Terhadap Kandungan Protein Kasar Dan Serat Kasar
- Pengaruh Konsentrasi Kadmium Terhadap Perubahan Warna Dan Persentase Jenis Kelamin Jantan Anakan *Daphnia magna*
- Kondisi Terumbu Karang Di Kepulauan Seribu Dalam Kaitan Dengan Gradasi Kualitas Perairan
- Mekanisme Infeksi Vibrio Pada Reseptor Ikan Kerapu Tikus *Cromileptes altivelis*
- Pendugaan Status Trofik Dengan Pendekatan Kelimpahan Fitoplankton Dan Zooplankton Di Waduk Senguruh, Karangates, Lahor, Wilngi Raya Dan Wonorejo Jawa Timur
- Pengkayaan *Daphnia* spp. Dengan Viterna Terhadap Kelangsungan Hidup Dan Pertumbuhan Larva Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)
- Respon Daya Cerna Dan Respirasi Benih Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) Pasca Transportasi Dengan Menggunakan Daun Bandoan (*Algerium conyzoides*) Sebagai Bahan Antimetabolik
- Kerusakan Dan Jumlah Hemosit Udang Windu (*Penaeus monodon* Fab.) Yang Mengalami Zoothamniosis



Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Airlangga

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 1 Nomor 1, April 2009

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pemimpin Redaksi

Moch. Amin Alamsjah

Penyunting Pelaksana

Gunanti Mahasri
Laksmi Sulmartiwi
Endang Dewi Masitha
A. Taufik Mukti
A. Shofy Mubarak
Kustiawan Tri Pursetyo
Sapto Andriyono

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan diterbitkan dua kali per tahun oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair yang memuat hasil penelitian dan komunikasi singkat dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan (Akuakultur, Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan/Pascapanen, Teknologi Penangkapan Ikan, Ilmu Kelautan, Oceanografi, Agribisnis dan Penyuluhan Perikanan)

Alamat Berkala Ilmiah Perikanan :

Program Studi Budidaya Perairan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas Airlangga
Jl. Mulyorejo (Kampus C Unair)
Surabaya 60115
Telp./Fax. 031-5911451
E-mail :
sjfm_unair@yahoo.com
sjfm_unair@unair.ac.id
Website :
www.journal.unair.ac.id

Rekening :
No. Rekening : 033 - 01 - 11095 - 16 - 5
Atas Nama : A. Shofy Mubarak
Nama Bank : Bank Niaga
Cabang SBY-IBC
Dharmahusada

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik. Format jurnal penerbitan kali ini merupakan perubahan dari Jurnal Berkala Ilmiah Perikanan dengan tetap melakukan penerbitan 2 kali dalam setahun (bulan April dan November).

Pokok bahasan penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan menampilkan *headline* presentasi hasil penelitian pada bidang bio teknologi perikanan, genetika dan reproduksi nutrisi, penyakit dan kesehatan lingkungan. Secara umum, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan tetap menerima artikel hasil penelitian dan komunikasi singkat dalam bidang ilmu lainnya seperti pemanfaatan sumberdaya perairan, teknologi hasil perikanan, ilmu kelautan dan sosial ekonomi perikanan.

Pihak redaksi Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari sponsorship utama PT. Central Proteinaprima Tbk. dan semua rekan sejawat yang intens mendukung penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan lebih baik. Terakhir, kritik dan saran tetap kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Hormat kami,

Tim Redaksi
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 1 Nomor 1, April 2009

DAFTAR ISI

Pengaruh Induksi Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Terhadap Human Umbilical Vein Endothelial Cells (Huvecs) Culture Dwi Yuni Nur Hidayati	1 - 6
Pendugaan Status Trofik Dengan Pendekatan Kelimpahan Fitoplankton dan Zooplankton Di Waduk Sengguruh, Karangates, Lahor, Wlingi Raya dan Wonorejo Jawa Timur Asus Maizar Suryanto H. dan Herwati Umi S.	7 - 14
Mekanisme Infeksi <i>Vibrio</i> Pada Reseptor Ikan Kerapu Tikus <i>Cromileptes altivelis</i> Uun Yanuhar	15 - 20
Kerusakan dan Jumlah Hemosit Udang Windu (<i>Penaeus monodon</i> Fab.) Yang Mengalami Zoothamniosis Gunanti Maharani, Sunarti, Juni Triastuti dan Tutik Juniastuti	21 - 30
Pengaruh Suhu dan Kepadatan <i>Ephippia</i> Yang Berbeda Terhadap Penetasan <i>Ephippia Daphnia magna</i> Yulian Cindra Eka Pradana, Boedi Setya Rahardja dan Yudi Cahyoko	31 - 36
Pengaruh Penambahan Madu Dalam Pakan Induk Jantan Lobster Air Tawar <i>Red Claw (Cherax quadricarinatus)</i> Terhadap Rasio Jenis Kelamin Larva A. Taufiq Mukti, A. Shofy Mubarak dan Adde Ermawan	37 - 42
Pengaruh Konsentrasi Kadmium Terhadap Perubahanwarna dan Persentase Jenis Kelamin Jantan Anakan <i>Daphnia magna</i> Alfi Hermawati W. S., Rahayu Kusdarwati, Setyawati Sigit dan A. Shofy Mubarak	43 - 50
Pengaruh Pemberian Pakan Alami dan Pakan Buatan Terhadap Pertumbuhan Benih Ikan Betutu (<i>Oxyeleotris marmorata</i> Bleeker) Muhammad Arief, Irmaya Triasih dan Widya Paramita Lokapirnasari	51 - 58
Pengkayaan <i>Daphnia Spp.</i> Dengan Viterna Terhadap Kelangsungan Hidup dan Pertumbuhan Larva Ikan Lele Dumbo (<i>Clarias gariepinus</i>) Naila Budiati Wahyu Mufidah, Boedi Setya Rahardja dan Woro Hastuti Satyantini	59 - 66
Pemberian Dolomit Pada Kultur <i>Daphnia spp.</i> Sistem <i>Daily Feeding</i> Pada Populasi <i>Daphnia spp.</i> dan Kestabilan Kualitas Air A. Shofy Mubarak, Diah Trie Ridyaning Tias dan Laksmi Sulmartiwi	67 - 72
Pemberian Probiotik Pada Pengolahan Limbah Udang Yang Dimasak Dengan Tekanan Tinggi Terhadap Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar Agustono, Ika Agustini Handyani dan Mirni Lamid	73 - 78
Respon Daya Cerna dan Respirasi Benih Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) Pasca Transportasi Dengan Menggunakan Daun Bandotan (<i>Ageratum conyzoides</i>) Sebagai Bahan Antimetabolik Laksmi Sulmartini, Dewi Nurul Chotimah, Wahyu Tjahjaningsih, Thomas V. Widiyatno dan Juni Triastuti	79 - 86
Deteksi Pencemaran Bakteri <i>Salmonella Sp.</i> Pada Udang Putih (<i>Penaeus merguensis</i>) Segar Di Pasar Tradisional Kotamadya Surabaya Hasutji Endah Narumi, Zuhriansyah dan Imam Mustofa	87 - 92

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 1 Nomor 1, April 2009

DAFTAR ISI

Kondisi Terumbu Karang Di Kepulauan Seribu Dalam Kaitan Dengan Gradasi Kualitas Perairan Ruswahyuni dan Pujiono Wahyu Purnomo	93 - 102
Pengaruh Kombinasi Pupuk NPK dan TSP Terhadap Pertumbuhan, Kadar Air dan Klorofil a <i>Gracilaria verrucosa</i> Moch. Amin Alamsjah, Wahyu Tjahjaningsih dan Anugraheny Widaratna Pratiwi	103 - 116
Uji Toksisiti Asam α-Linolenik Rumpuk Laut <i>Ulva</i> sp. Terhadap <i>Chattonella marina</i> dan <i>Heterosigma akashiwo</i> Moch. Amin Alamsjah	117 - 120

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 1 Nomor 1, April 2009

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1. Ketentuan Umum
 - a. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan memuat tulisan ilmiah dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan, berupa hasil penelitian, artikel ulas balik (review/mini review) dan laporan kasus baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
 - b. Naskah/makalah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan. Apabila diterima untuk dimuat dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, maka tidak boleh diterbitkan dalam majalah atau media yang lain.
2. Standar Penulisan
 - a. Makalah diketik dengan jarak 2 spasi, kecuali Judul, Abstrak, Judul tabel dan tabel, Judul gambar, Daftar Pustaka, dan Lampiran diketik menurut ketentuan tersendiri.
 - b. Alinea baru dimulai 3 (tiga) ketukan ke dalam atau (*First line 0.3"*).
 - c. Huruf standar untuk penulisan adalah Times New Roman 12.
 - d. Memakai kertas HVS ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm).
 - e. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - f. Tabel/Ilustrasi/Gambar harus hitam putih, amat kontras atau *file scanning* (apabila sudah disetujui untuk dimuat).
3. Tata cara penulisan naskah/makalah ilmiah
 - a. Tebal seluruh makalah sejak awal sampai akhir maksimal 12 (dua belas) halaman.
 - b. Penulisan topik (Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metode dst.) tidak menggunakan huruf kapital (*setence*) tetapi menggunakan *Title Case* dan diletakkan di pinggir (sebelah kiri).
 - c. Sistematika penulisan makalah adalah Judul, Nama Penulis dan Identitas, Abstrak dengan Key words, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih (bila ada), Daftar Pustaka.
 - d. Judul harus pendek, spesifik, tidak boleh disingkat dan informatif, yang ditulis dalam bahasa Inggris.
 - e. Nama penulis di bawah judul, identitas dan instansi penulis harus jelas, tidak boleh disingkat dan ditulis di bawah nama penulis.
 - f. Abstrak maksimal terdiri dari 200 (dua ratus) kata, diketik 1 (satu) spasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
 - g. Kata kunci (*key words*) maksimum 5 (lima) kata setelah abstrak.
 - h. Materi dan Metode memuat peralatan/bahan yang digunakan terutama yang spesifik.
 - i. Daftar Pustaka disusun secara alfabetik tanpa nomor urut. Singkatan majalah/jurnal berdasarkan tata cara yang dipakai oleh masing-masing jurnal. Diketik 1 (satu) spasi dengan paragraf *hanging 0.3"* dan before 3.6 pt. Proporsi daftar pustaka, Jurnal/Majalah Ilmiah (60%), dan *Text Book* (40%). Berikut contoh penulisan daftar pustaka berturut-turut untuk *Text Book* dan Jurnal.
Roitt, I., J. Brostoff, and D. Male. 1996. *Immunology*. 4th Ed. Black Well Scientific Pub. Oxford.
Staropoli, I., J.M. Clement, M.P. Frenkiel, M. Hofnung and V. Deuble. 1996. Dengue-1 virus envelope glycoprotein gene expressed in recombinant baculovirus elicits virus neutralization antibody in mice and protects them from virus challenge. *Am.J. Trop. Med. Hygi*; 45: 159-167.
 - j. Tabel, Keterangan Gambar atau Penjelasan lain dalam Lampiran diketik 1 (satu) spasi, dengan huruf Times New Roman 12.
4. Pengiriman makalah dapat dilakukan setiap saat dalam bentuk cetakan (*print out*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Setelah ditelaah oleh Tim Editor Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, makalah yang telah direvisi penulis segera dikembalikan ke redaksi dalam bentuk cetakan 1 (satu) eksemplar dengan menyertakan makalah yang telah direvisi dan 1 (satu) disket 3.5" (Progam MS Word / IBM Compatible) serta dikirim via e-mail ke Dewan redaksi BIP ke alamat : **Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo (Kampus C Unair) Surabaya 60115, Telp. / Fax. 031-5911451; E-mail : sjfm_unair@yahoo.com; sjfm_unair@unair.ac.id; Website : www.journal.unair.ac.id**
5. Ketentuan akhir
Terhadap naskah/makalah yang dikirim, redaksi berhak untuk :
 - a. memuat naskah/makalah tanpa perubahan
 - b. memuat naskah/makalah dengan perubahan
 - c. menolak naskah/makalah
6. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi naskah/makalah.
7. Makalah yang telah dimuat dikenai biaya penerbitan dan biaya pengiriman.
8. Penulis/pelanggan dapat mengirimkan biaya pemuatan makalah/langganan lewat transfer ke Bank Niaga Cabang SBY-IBC Dharmahusada No Rek. 033 - 01 -11095 -16 -5 (A. Shofy Mubarak).
9. Semua keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat untuk keperluan itu.

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Volume 1 Nomor 1, April 2009

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi, penulis dan pembaca Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan memberikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pakar di bawah ini selaku mitra bestari Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan.

Prof. Dr. Sri Subekti, DEA., drh. (FKH, UNAIR)

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. (FPIK, IPB)

Prof. Dr. Ir. Feliatra, M.Sc. (FPIK, UNRI)

Dr. Ir. Murdjani, M.Sc. (BBPBAL Lampung)

Dr. Ir. Triyanto, M.Si. (Faperta, UGM)

Dr. Ir. Marsudi, M.Sc. (FPIK, UNIBRAW)

Dr. Ir. Agung Sudaryanto, M.Sc. (FPIK, UNDIP)

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN ALAMI DAN PAKAN BUATAN TERHADAP
PERTUMBUHAN BENIH IKAN BETUTU (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker)

THE INFLUENCE OF GIVING NATURAL FEED AND MAKE FEED TO GROWTH
FINGERLINGS OF BETUTU (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker)

Muhammad Arief¹, Irmaya Triasih¹ dan Widya Paramita Lokapirnasari²

¹ Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo – Surabaya 60115 Telp. 031-5911451

² Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo – Surabaya 60115 Telp. 031-5993016

Abstract

The growth of betutu classified slow, so do efforts in order that growth of betutu which protected optimal by choosing the exact food combination. This research is purpose to know the growth fingerlings of betutu. This research using complete random program giving 3 repeated by the way of treating P1 (food 100% pelet), P2 (food 100% *Daphnia* spp.), P3 (food 100% *Tubifex* sp.), P4 (food 100% *Anadara granosa*), P5 (food combination 50% pelet and 50% *Daphnia* spp.), P6 (food combination 50% pelet and 50% *Tubifex* sp.), P7 (food combination 50% *Anadara granosa* and 50% *Daphnia* spp.), P8 (food combination 50% *Anadara granosa* and 50% *Tubifex* sp.). Main test parameter checked on this research is growth (accretion weight), growth rate, specific growth rate, and absolute body length growth, while supporting test parameter is water quality. Data of growth analysis using ANAVA (varian analysis) and if there is the influence the way of treating so continued with Test of Multiple Gap Duncan by trusty degree 95%. The result of research show the growth (accretion weight), growth rate, specific growth rate and the best absolute body length growth on the way of treating P6 which not different with the way of treating P3 and P8.

Key words : growth (accretion weight), growth rate, specific growth rate, absolute body length growth.

Pendahuluan

Ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker) merupakan ikan konsumsi yang menjadi salah satu komoditas perikanan air tawar yang mulai dikenal pada awal tahun 1987. Ikan ini mempunyai potensi besar untuk dibudidayakan (Lingga, 1987 dalam Palupi, 1990). Daging ikan betutu yang rata-rata mengandung protein (9 - 22%), lemak (0,1 - 20%), mineral (1 - 3%), vitamin, lecithin, guanin dan sedikit mengandung kolesterol (Mulyono, 2001).

Ikan betutu selama ini lebih banyak diambil dari alam dan jarang sekali dibudidayakan. Kendala yang ditemui adalah pertumbuhan ikan betutu yang lambat. Induk ikan betutu akan memijah pada saat musim penghujan saja sehingga mengalami keterbatasan benih untuk dibudidayakan secara berkelanjutan (Komarudin, 2000).

Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal antara lain genetik, aktifitas, spesies, jenis kelamin, umur dan ukuran ikan, kondisi fisiologi; sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan tempat hidup ikan (Mukti

dkk, 2003). Pertumbuhan ikan betutu tergolong lambat, sehingga dilakukan upaya agar pertumbuhan ikan betutu yang dipelihara dapat optimal yaitu dengan pemilihan kombinasi pakan yang tepat.

Pakan merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan usaha perikanan dan ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor utama untuk menghasilkan produksi maksimal (Darmawiyanti, 2005). Syarat pakan yang baik adalah mempunyai nilai gizi yang tinggi, mudah diperoleh, mudah diolah, mudah dicerna, harga relatif murah, tidak mengandung racun. Jenis pakan disesuaikan dengan bukaan mulut ikan, dimana semakin kecil bukaan mulut ikan maka semakin kecil ukuran pakan yang diberikan, dan juga disesuaikan dengan umur ikan (Khairuman, 2003).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan alami dan pakan buatan yaitu kerang darah (*Anadara granosa*), cacing tubifex (*Tubifex* sp.), kutu air (*Daphnia* spp.) dan pelet serta

kombinasi pakan pelet dan kutu air, pelet dan cacing tubifex, kerang darah dan kutu air, kerang darah dan cacing tubifex terhadap pertumbuhan benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker). Untuk mengetahui jenis pakan manakah yang memberikan pertumbuhan optimal benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker).

Sedangkan manfaat yang diharapkan yaitu memberikan informasi ilmiah bagi ilmuwan, mahasiswa dan para pembudidaya mengenai budidaya benih ikan betutu, tentang penggunaan pakan alami dan pakan buatan yaitu kerang darah (*Anadara granosa*), cacing tubifex (*Tubifex sp.*), kutu air (*Daphnia spp.*) dan pelet serta kombinasi pakan pelet dan kutu air, pelet dan cacing tubifex, kerang darah dan kutu air, kerang darah dan cacing tubifex terhadap pertumbuhan benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker). Memberikan informasi ilmiah tentang penggunaan pakan alami dan pakan buatan yang baik terhadap pertumbuhan optimal benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Bleeker).

Materi dan Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 10 November 2007 sampai 06 Januari 2008 di Laboratorium Pendidikan Perikanan Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga. Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Pakan Ternak Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga.

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah bak plastik sebanyak 24 buah dengan volume 5 liter, waring, aerator dan selang aerator, timbangan digital dan penggaris. Pengukuran kualitas air digunakan kertas pH universal, termometer, amonia test dan O₂ test.

Benih ikan betutu dengan panjang tubuh 1 cm dan berat 0,1 g berasal dari pembudidaya di Yogyakarta, pakan ikan yaitu pelet, kutu air (*Daphnia spp.*), cacing tubifex (*Tubifex sp.*) dan kerang darah (*Anadara granosa*).

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 8 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan tersebut yaitu :

- P1 : Pakan 100% pelet
- P2 : Pakan 100% kutu air (*Daphnia spp.*)
- P3 : Pakan 100% cacing tubifex (*Tubifex sp.*)
- P4 : Pakan 100% kerang darah (*Anadara granosa*)
- P5 : Pakan kombinasi 50% pelet dan 50% kutu air (*Daphnia spp.*)
- P6 : Pakan kombinasi 50% pelet dan 50% cacing tubifex (*Tubifex sp.*)

P7 : Pakan kombinasi 50% kerang darah (*Anadara granosa*) dan 50% kutu air (*Daphnia spp.*)

P8 : Pakan kombinasi 50% kerang darah (*Anadara granosa*) dan 50% cacing tubifex (*Tubifex sp.*)

Parameter uji utama pada penelitian ini adalah pertumbuhan (pertambahan berat) benih ikan betutu.

Pertumbuhan (*Growth*)

$$(G) = W_t - W_o$$

Keterangan :

G = Pertumbuhan (g)

W_t = Berat rata-rata akhir (g)

W_o = Berat rata-rata awal (g)

Sumber : Hariati (1989)

Laju Pertumbuhan (*Growth Rate*)

$$(GR) = \frac{W_t - W_o}{t}$$

Keterangan :

GR = Laju pertumbuhan (g/hari)

W_t = Berat rata-rata akhir (g)

W_o = Berat rata-rata awal (g)

t = waktu (hari)

Sumber : Elliott and Hurley (1995)

Laju Pertumbuhan Spesifik (*Specific Growth Rate*)

$$(SGR) = \frac{(\ln W_t - \ln W_o)}{t} \times 100\%$$

Keterangan :

SGR = persentase berat rata-rata individu per hari (% Berat tubuh/hari)

W_t = berat rata-rata pada waktu ke-t (g)

W_o = berat rata-rata awal (g)

t = waktu (hari)

Sumber : Elliott and Hurley (1995)

Panjang Tubuh Mutlak

Pertumbuhan panjang tubuh mutlak benih ikan betutu dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan Effendie (1997), sebagai berikut :

Pertumbuhan panjang mutlak = T L₁ - T L₀

Keterangan :

TL₁ = panjang total pada akhir pemeliharaan (mm)

TL₀ = panjang total pada awal pemeliharaan (mm)

Sumber : Hariati (1989)

Parameter uji penunjang pada penelitian ini adalah kualitas air yaitu : suhu, pH, oksigen terlarut dan amoniak.

Hasil penelitian ini kemudian akan

dianalisis menggunakan analisis varian (Anova) untuk mengetahui nilai keragaman dan untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda diantara semua perlakuan maka dilakukan Uji Jarak Berganda *Duncan* untuk mengetahui perlakuan yang terbaik dengan derajat kepercayaan 95% (Kusriningrum, 2008).

Hasil dan Pembahasan

Pertumbuhan

Benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata*) yang diberi berbagai jenis pakan yaitu pelet, kutu air (*Daphnia* spp.), cacing tubifex (*Tubifex* sp.), kerang darah (*Anadara granosa*). Pertumbuhan berat tubuh selama 2 bulan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Anova menunjukkan adanya pengaruh nyata dari pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap pertumbuhan berat benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata*) ($p < 0,05$).

Sedangkan berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda *Duncan* menunjukkan bahwa pertambahan berat pada perlakuan P6 (50% pelet dan 50% cacing tubifex) tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P3 (100% cacing tubifex) dan P8 (50% kerang darah dan 50% cacing tubifex). Perlakuan P3 dan P8 tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P4 (100% kerang darah), P5 (50% pelet dan 50% *Daphnia* spp.), dan P7 (50% kerang darah dan 50% *Daphnia* spp.). Perlakuan P7 tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P3, P4, P5 dan P2 (100% *Daphnia* spp.). Perlakuan P1 (100% pelet) dengan rata-rata pertumbuhan berat tubuh yang terendah berbeda nyata ($p < 0,05$) dengan semua perlakuan.

Rata-rata Laju Pertumbuhan dan Laju Pertumbuhan Spesifik

Rata-rata laju pertumbuhan (*Growth Rate*) benih ikan betutu pada perlakuan berbagai

Tabel 1. Rata-rata pertumbuhan berat tubuh benih ikan betutu selama penelitian (g)

Perlakuan	Rata-rata ± SD
P1 100% Pelet	0.2700 ^d ± 0.02000
P2 100% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.3067 ^c ± 0.01528
P3 100% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.5567 ^{ab} ± 0.01155
P4 100% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>)	0.3800 ^b ± 0.02000
P5 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.3867 ^b ± 0.01528
P6 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.5767 ^a ± 0.00577
P7 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.3700 ^{bc} ± 0.02000
P8 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.5533 ^{ab} ± 0.00577

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan bahwa terdapat perbedaan ($p < 0,05$)

Tabel 2. Rata-rata laju pertumbuhan (*growth rate*) (g/hari)

Perlakuan	<i>Growth Rate</i>
	Rata-rata ± SD
P1 100% Pelet	0.002867 ^d ± 0.003512
P2 100% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.003467 ^c ± 0.0002309
P3 100% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.007867 ^{ab} ± 0.0001528
P4 100% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>)	0.004767 ^b ± 0.0003786
P5 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.004933 ^b ± 0.0003055
P6 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.008200 ^a ± 0.0000000
P7 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.004600 ^{bc} ± 0.0003606
P8 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.007933 ^a ± 0.0000577

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan bahwa terdapat perbedaan ($p < 0,05$)

Tabel 3. Rata-rata laju pertumbuhan spesifik (*Specific Growth Rate*) benih ikan betutu selama penelitian (% Berat tubuh/hari)

Perlakuan	<i>Specific Growth Rate</i>	
	Rata-rata ± SD	
P1 100% Pelet	1.60000 ^d	± 0.132525
P2 100% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	1.77733 ^c	± 0.063721
P3 100% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	2.79167 ^{ab}	± 0.077951
P4 100% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>)	2.16000 ^b	± 0.128992
P5 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	2.16000 ^b	± 0.070925
P6 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	2.88467 ^a	± 0.018475
P7 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	2.11267 ^{bc}	± 0.130631
P8 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	2.85467 ^a	± 0.072169

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan bahwa terdapat perbedaan ($p < 0,05$)

Tabel 4. Rata-rata panjang tubuh mutlak benih ikan betutu selama penelitian (mm)

Perlakuan	Rata-rata ± SD	
P1 100% Pelet	0.2200 ^d	± 0.1000
P2 100% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.2433 ^c	± 0.1155
P3 100% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.3333 ^a	± 0.0577
P4 100% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>)	0.2733 ^b	± 0.1528
P5 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.2733 ^b	± 0.1528
P6 Kombinasi 50% Pelet dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.3433 ^a	± 0.0577
P7 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Kutu air (<i>Daphnia</i> spp.)	0.2633 ^{bc}	± 0.1528
P8 Kombinasi 50% Kerang darah (<i>Anadara granosa</i>) dan 50% Cacing tubifex (<i>Tubifex</i> sp.)	0.3333 ^a	± 0.0577

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menyatakan bahwa terdapat perbedaan ($p < 0,05$)

jenis pakan terdapat pada Tabel 2.

Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Anova menunjukkan bahwa adanya pengaruh nyata dari pemberian pakan alami dan pakan buatan terhadap rata-rata laju pertumbuhan (*growth rate*) benih ikan betutu (*Oxyeletris marmorata*) ($p < 0,05$).

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda *Duncan* menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan terbaik terdapat pada perlakuan P6 (50% pelet dan 50% cacing tubifex) tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P8 (50% kerang darah dan 50% cacing tubifex) dan perlakuan P3 (100% cacing tubifex). Perlakuan P3 tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan P4 (100% kerang darah) dan P5 (50% pelet dan 50% *Daphnia* spp.). Perlakuan P4 dan P5 tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P3 dan P7 (50% kerang darah dan 50% *Daphnia* spp.). Perlakuan P7 tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P3, P4, P5 dan P2 (100% *Daphnia* spp.). Perlakuan P1 (100% pelet) dengan rata-rata laju pertumbuhan yang

terendah dan berbeda nyata ($p < 0,05$) dengan semua perlakuan.

Rata-rata laju pertumbuhan spesifik (*specific growth rate*) benih ikan betutu pada perlakuan berbagai jenis pakan terdapat pada Tabel 3.

Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Anova menunjukkan adanya pengaruh nyata dari pemberian pakan alami dan pakan buatan memberikan terhadap rata-rata laju pertumbuhan spesifik (*specific growth rate*) benih ikan betutu (*Oxyeletris marmorata*) ($p < 0,05$).

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda *Duncan* menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan spesifik terbaik terdapat pada perlakuan P6 (50% pelet dan 50% cacing tubifex) tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan perlakuan P8 (50% kerang darah dan 50% cacing tubifex) dan perlakuan P3 (100% cacing tubifex). Perlakuan P3 tidak berbeda nyata ($p > 0,05$) dengan P4 (100% kerang darah), P5 (50% pelet dan 50% *Daphnia* spp.) dan P6.

Perlakuan P7 (50% kerang darah dan 50% *Daphnia spp.*) tidak berbeda nyata ($p>0,05$) dengan perlakuan P3, P4, P5 dan P2 (100% *Daphnia spp.*). Perlakuan P1 (100% pelet) dengan rata-rata laju pertumbuhan spesifik yang terendah berbeda nyata ($p<0,05$) dengan semua perlakuan.

Rata-rata panjang tubuh mutlak benih ikan betutu

Rata-rata panjang tubuh mutlak benih ikan betutu pada perlakuan berbagai jenis pakan terdapat pada Tabel 4. Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Anova menunjukkan adanya pengaruh nyata dari pemberian pakan alami dan pakan buatan memberikan terhadap panjang tubuh mutlak benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata*) ($p<0,05$). Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda *Duncan* menunjukkan bahwa pemberian pakan pada perlakuan P6 (50% pelet dan 50% cacing tubifex), P3 (100% cacing tubifex), dan P8 (50% kerang darah dan 50% cacing tubifex) berpengaruh nyata ($p<0,05$) terhadap panjang tubuh mutlak. Perlakuan P4 (100% kerang darah) dan P5 (50% pelet dan 50% kutu air) tidak berbeda nyata ($p>0,05$) dengan perlakuan P7 (50% kerang darah dan 50% kutu air). Perlakuan P7 tidak berbeda nyata ($p>0,05$) dengan perlakuan P2. Perlakuan P2 (100% kutu air) berbeda nyata ($p<0,05$) dengan perlakuan P1. Perlakuan P1 (100% pelet) dengan rata-rata pertumbuhan panjang tubuh mutlak yang terendah dan berbeda nyata ($p<0,05$) dengan semua perlakuan.

Pada penelitian ini parameter utama yang diukur adalah pertumbuhan (pertambahan berat), laju pertumbuhan, laju pertumbuhan spesifik, dan pertumbuhan panjang tubuh mutlak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pakan alami dan pakan buatan berpengaruh nyata ($p<0,05$) terhadap pertumbuhan (pertambahan berat), laju pertumbuhan, laju pertumbuhan spesifik, pertumbuhan panjang tubuh mutlak benih ikan betutu. Pada perlakuan P6 (kombinasi pelet dan cacing tubifex) memberikan pengaruh yang lebih baik pada pertumbuhan, laju pertumbuhan, laju pertumbuhan spesifik dan pertumbuhan panjang tubuh mutlak benih ikan betutu dibanding perlakuan lain tetapi tidak berbeda nyata ($p>0,05$) dengan pertumbuhan pada perlakuan P3 (cacing tubifex) dan P8 (kombinasi kerang darah dan cacing tubifex). Ketiga perlakuan tersebut (P6, P3, P8) sama-sama menggunakan pakan alami berupa cacing tubifex yang banyak digunakan untuk pakan

benih ikan betutu. Cacing tubifex memiliki kandungan protein sebanyak 48,53%, lemak sebanyak 22,38%, serat sebanyak 0,78%, karbohidrat sebanyak 7,9678% dan memiliki energi akhir sebesar 706,74% kcal/g. Menurut Khairuman (2005) dan Mudjiman (2000) bahwa kandungan protein pakan untuk sebagian besar ikan sebanyak 20-36% dari berat pakan, kandungan lemak sebanyak 4-18% dari berat pakan. Berdasarkan hal tersebut diatas cacing tubifex mengandung nilai nutrisi yang sesuai untuk benih ikan betutu. Cacing tubifex juga mempunyai kelebihan yaitu mudah ditangkap oleh benih ikan betutu. Benih ikan betutu bersifat karnivora sehingga membutuhkan kandungan protein yang tinggi untuk pembentukan jaringan organ tubuh, dan perbaikan sel. Ikan karnivora mendapatkan karbohidrat dari sintesis karbohidrat yang berasal dari protein dan lemak (Khairuman dan Khairul, 2005).

Pada perlakuan P6 yang merupakan kombinasi pakan pelet dan cacing tubifex, memiliki kandungan protein sebanyak 38,97%, lemak sebanyak 12,49%, serat sebanyak 1,555%, karbohidrat sebanyak 7,9765% dan memiliki energi akhir sebesar 1886,045% kcal/g. Adanya penambahan energi memberikan respon terhadap pertumbuhan yang berbeda dengan perlakuan pakan cacing tubifex (P3). Hal ini membuktikan bahwa adanya penambahan energi dapat meningkatkan pertumbuhan. Sumber energi yang paling mudah dan paling cepat dalam penyediaan energi apabila dibutuhkan adalah dari karbohidrat (Kusman, 2003). Almsier (2002) berpendapat bahwa karbohidrat yang cukup akan mencegah penggunaan protein untuk sumber energi (sebagai penghemat energi). Bila kandungan karbohidrat dalam pakan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi pada ikan adalah spesies, aktifitas fisiologis, suhu, aliran air, ukuran tubuh, berat tubuh, umur, jumlah pakan. Adapun faktor lainnya adalah kepadatan ikan, kandungan oksigen terlarut, penumpukan feses dan sisa pakan, penanganan kurang baik dan penggunaan pakan kualitas rendah (Hariati, 1989).

Sesuai hasil penelitian Wilson *dalam* Stickney dan Novell (1997); bahwa pakan dengan kandungan karbohidrat sebanyak 2,5-10% dari berat pakan menghasilkan peningkatan pertambahan berat yang nyata namun bila kandungan karbohidrat ditingkatkan

menjadi 15-20% dari berat pakan maka penambahan berat akan menurun. Para ahli pakan menganjurkan untuk mengkombinasi pakan alami dengan pakan buatan agar tercipta keseimbangan asam amino di dalam tubuh benih ikan betutu (Afrianto dan Liviawaty, 2005).

Pada perlakuan P8 yang merupakan kombinasi pakan kerang darah dan cacing tubifex, kombinasi pakan tersebut memiliki kandungan protein sebanyak 51,255%, lemak sebanyak 15,735%, serat sebanyak 0,575%, karbohidrat sebanyak 7,9675% dan memiliki energi akhir sebesar 804,12% kcal/g. Perlakuan P8 ini mengandung protein yang tinggi dalam pakan tetapi pertumbuhan, laju pertumbuhan, laju pertumbuhan spesifik dan pertumbuhan panjang tubuh mutlak yang dihasilkan masih rendah dibanding dengan perlakuan P6.

Ketiga perlakuan tersebut (P6, P3, P8) memiliki kandungan protein tinggi di atas kebutuhan benih ikan pada umumnya termasuk benih ikan betutu. Menurut Cowey dan Walton dalam Halver (1989) bahwa protein yang berlebih dalam pakan akan dibuang melalui amoniak, glukosa, lemak, CO₂, dan disimpan dalam bentuk ATP. Perbedaan perlakuan P8 (kombinasi pakan kerang darah dan cacing tubifex) dibanding dengan perlakuan P3 (pakan cacing tubifex) dan P6 (kombinasi pakan pelet dan cacing tubifex) terletak pada selisih jumlah energi dan menunjukkan adanya perbedaan pada pertumbuhan.

Kesimpulan

Pemberian pakan alami dan pakan buatan berpengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Blecker). Jenis pakan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan optimal benih ikan betutu (*Oxyeleotris marmorata* Blecker) adalah kombinasi nutrisi pakan 50% pelet dan 50% cacing tubifex, dengan pertumbuhan sebesar 2,88467% berat tubuh/hari yang memiliki kandungan nutrisi pakan protein kasar = 38,97%, lemak kasar = 12,49%, serat kasar = 1,555% dan karbohidrat = 7,9765% serta memiliki energi akhir = 1886,045% kcal/g.

Selanjutnya diperlukan penelitian lebih lanjut pemberian berbagai jenis pakan pelet dengan atraktan berbeda, pemberian pakan dengan kombinasi nutrisi dari cacing tubifex, penelitian untuk mengetahui pertumbuhan benih ikan betutu skala masal di kolam, serta pengaruh cahaya terhadap aktifitas pakan dan pertumbuhan benih ikan betutu.

Daftar Pustaka

- Afrianto, E dan E. Liviawaty. Pakan Ikan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta. Hal 26-65
- Ahmad, M. 1999. Makanan Ikan. Jakarta. Penerbit Swadaya Anggota IKAPI. Hal 101
- Alhusin, S. 2002. Aplikasi Statistik dengan SPSS. 10 for Windows. J dan J Leaning. Yogyakarta. Hal 123-133
- Almatsier, S. 2005. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 132-155
- Black, Kenneth D. dan A. D. Pickering. 1998. Biology of Farmed Fish. CRC Press. USA. p
- Buwono. 2000. Kebutuhan Asam Amino Essensial dalam Ransum Pakan Ikan. Kanisius. Yogyakarta. Hal 24-39
- Effendie, M.I. 1997. Biologi Perikanan. Yayasan Pustaka Nusantara. Yogyakarta. Hal 73-78:92-100
- Elliot, J. M and M. A. Hurley. 1995. Functional Ecology. Volume IX. British Ecological Society. British. p. 625-627
- Fitriani, A. 2002. Peran Pakan Alami (*Daphnia sp* dan *Tubifex sp*) terhadap SR (Kelangsungan Hidup) dan pertumbuhan larva Ikan Baung (*Mystis nemurus*) di Balai Budidaya Air Tawar Sukabumi. Jawa Barat. Tugas Akhir. Budidaya Perairan. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga. Hal 4-8:30-33
- Hadie, W dan Hadie, L. 2002. Udang Galah GI Marco. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Halver, J.E. 1972. *Fish Nutrition*. Academic Press. Inc. 713 p
- Hariati, A.M. Maret 1989. Pakan Ikan NUFFIC/UNIBRAW/LUW/FISH Fisheries Project. Universitas Brawijaya. Malang. Hal 1-13
- Iskandar. 2003. Budidaya Lobster Air Tawar. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Khairuman dan K. Amri. 2003. Membuat Pakan Ikan Konsumsi. Agromedia Pustaka. Jakarta. Hal 17
- Khofifah, B. 2003. Pemberian Pakan Buatan (Fripak dan Flake) terhadap tingkat Kelulusan Hidup dan Pertumbuhan Larva Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii* de Man) di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara Jawa Tengah. Tugas Akhir. D3 Budidaya Perairan. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Airlangga. Hal 48-50

- Komarudin, U. 2000. Betutu. Penebar Swadaya. Jakarta. Hal 1-13
- Kurniawan, F. 2007. Pengaruh Pemberian Jenis Pakan Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Sintasan Ikan Black Ghost (*Apteronotus Abifrons*). Skripsi. Perikanan. Fakultas Peternakan dan Perikanan. Universitas Muhammadiyah. Malang. Hal 6-15

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN ALAMI DAN PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH IKAN BETUTU (*Oxyleotris marmorata* Bleeker)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
