

# JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN



## *Fokus Utama*

Aplikasi Teknologi Asap Cair Dalam Pengolahan dan Pengawetan Produk Perikanan di Pulau Mandangin

Pakan Alternatif dari Limbah Sayuran untuk Ikan Nila Hitam (*Oreochromis niloticus*)

Efektivitas Vaksinasi *Crude* dan *Soluble Protein* Spora *Myxobolus koi* Terhadap Tingkat Kerusakan Usus Ikan Koi (*Cyprinus carpio* Koi)

Peningkatan Nilai Nutrisi *Pollard* Melalui Fermentasi Ragi Tempe Sebagai Bahan Pakan Buatan Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

GIS Application to Determine Critical Condition and Rehabilitation Model of Mangrove Ecosystem in Southern Coast of Pamekasan Region Madura

Pengaruh Alga Merah (*Kappaphycus alvarezii*) Terhadap Mutu Ikan Kembung (*Rastrelliger* sp.)

Identifikasi dan Prevalensi Cacing pada Saluran Pencernaan Ikan Salem (*Scomber japonicus*) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara

Studi Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Forskall) di Tambak Sekitar Perairan Sungai Buntung, Kabupaten Sidoarjo



## SUSUNAN DEWAN REDAKSI

**Pemimpin Redaksi**  
Moch. Amin Alamsjah

### Penyunting Pelaksana

Gunanti Mahasri  
Laksmi Sulmartiwi  
Endang Dewi Masitha  
A. Taufik Mukti  
A. Shofy Mubarak  
Kustiawan Tri Pursetyo  
Sapto Andriyono  
Anita Erna Faricha

## JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan diterbitkan dua kali per tahun oleh Fakultas Perikanan dan Kelautan Unair yang memuat hasil penelitian dan komunikasi singkat dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan (Akuakultur, Manajemen Sumberdaya Perairan, Teknologi Hasil Perikanan/Pascapanen, Teknologi Penangkapan Ikan, Ilmu Kelautan, Oceanografi, Agribisnis dan Penyuluhan Perikanan)

### Alamat Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan :

Fakultas Perikanan dan Kelautan  
Universitas Airlangga  
Jl. Mulyorejo (Kampus C Unair)  
Surabaya 60115  
Telp. 031 - 5911451  
Fax. 031 - 5965741  
E-mail :  
sjfm\_unair@yahoo.com  
sjfm\_unair@unair.ac.id  
Website :  
www.journal.unair.ac.id

### Rekening :

No. Rekening : 141 - 00 - 0980121 - 8  
Atas Nama : Laksmi Sulmartiwi  
Bank : Bank Mandiri  
Cabang Surabaya - Unair

## KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan Volume 7 Nomor 1 Tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Format jurnal penerbitan kali ini merupakan perubahan dari Jurnal Berkala Ilmiah Perikanan dengan tetap melakukan penerbitan 2 kali dalam setahun (bulan April dan November).

Pokok bahasan penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan menampilkan *headline* presentasi hasil penelitian pada bidang bioteknologi perikanan, genetika dan reproduksi nutrisi, penyakit dan kesehatan lingkungan. Secara umum, Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan tetap menerima artikel hasil penelitian dan komunikasi singkat dalam bidang ilmu lainnya seperti pemanfaatan sumberdaya perairan, teknologi hasil perikanan, ilmu kelautan dan sosial ekonomi perikanan.

Pihak Redaksi Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua rekan sejawat yang intens mendukung penerbitan Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan menjadi lebih baik. Terakhir, kritik dan saran tetap kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Hormat kami,

Tim Redaksi  
Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan



## DAFTAR ISI

<b>Aplikasi Teknologi Asap Cair Dalam Pengolahan dan Pengawetan Produk Perikanan di Pulau Mandangin</b> Sapto Andriyono, Wahyu Thajaningsih, Agustono, Endang Dewi Masithah, Kustiawan Tri Pursetyo, Annur Ahadi Abdillah dan Heru Pramono	1 - 6
<b>IbM Bagi Petambak Udang Tradisional di Desa Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, yang Mengalami Gagal Panen Secara Terus Menerus</b> Sudarno, Gunanti Mahasri dan Kismiyati	7 - 15
<b>Peningkatan Hasil Panen Udang pada Budidaya Udang Tradisional di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk Mengurangi Waktu Panen Menggunakan Metode Best Management Practice (BMP)</b> Muhammad Arief, Gunanti Mahasri dan Akhmad Taufiq Mukti	17 - 23
<b>Isolasi dan Identifikasi <i>Vibrio</i> sp. pada Produk Seafood Tradisional Area Timur Kota Surabaya</b> Heru Pramono, Hafizh M. Noor, Siti Sahatul Fatimah, Nur Aida Harahap and Alief Ayu Selia	25 - 29
<b>Perbandingan Morfologi Kerang Darah di Perairan Kenjeran dan Perairan Sedati</b> Kustiawan Tri Pursetyo, Wahyu Tjahjaningsih dan Heru Pramono	31 - 33
<b>Pakan Alternatif dari Limbah Sayuran untuk Ikan Nila Hitam (<i>Oreochromis niloticus</i>)</b> Aisya Maulyna Santoso dan Abdul Manan	35 - 37
<b>Deteksi Koi Herpesvirus (KHV) pada Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) yang Diinfeksi Secara Buatan</b> Muhammad Sungging Pradana, Suwarno dan Hari Suprpto	39 - 45
<b>Pigmen Rumput Laut Merah (<i>Acanthophora spicifera</i>) Sebagai Alternatif Pewarna Alami pada Produk Sosis Ikan Lele Dumbo (<i>Clarias gariepinus</i>)</b> Yiyik Windah Yulianti, Moch. Amin Alamsjah dan Riesta P.H.	47 - 53
<b>Efektivitas Vaksinasi <i>Crude</i> dan <i>Soluble Protein Spora Myxobolus koi</i> Terhadap Tingkat Kerusakan Usus Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio</i> Koi)</b> Rachma Woro Anggarani, Gunanti Mahasri dan Lucia Tri Suwanti	55 - 60
<b>Prevalensi dan Tingkat Kelulushidupan Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) yang Diuji Tantang Dengan Protein Spora Utuh <i>Myxobolus koi</i> di Tambak</b> Nedi, Gunanti Mahasri dan Mufasirin	61 - 66
<b>Peningkatan Nilai Nutrisi <i>Pollard</i> Melalui Fermentasi Ragi Tempe Sebagai Bahan Pakan Buatan Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)</b> Miftakhul Munir, Romziah Sidik dan Gunanti Mahasri	67 - 70
<b>Analisis Respons Imun Ikan Koi (<i>Cyprinus carpio</i> koi) yang Divaksin Dengan <i>Whole Protein Spora Myxobolus koi</i> Sebagai Kandidat Vaksin <i>Myxobolus</i></b> Mohamad Yusuf, Gunanti Mahasri dan Mufasirin	71 - 78
<b>GIS Application to Determine Critical Condition and Rehabilitation Model of Mangrove Ecosystem in Southern Coast of Pamekasan Region Madura</b> Zainul Hidayah	79 - 86

## DAFTAR ISI

<b>Pengaruh Alga Merah (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) Terhadap Mutu Ikan Kembung (<i>Rastrelliger</i> sp.)</b> Ayu Lana Nafisyah, Wahyu Tjahjaningsih, Rahayu Kusdarwati dan Annur Ahadi Abdillah	<b>87 - 93</b>
<b>Pengaruh Penambahan <i>Crude Fish Oil</i> (CFO) pada Pakan Udang Vaname (<i>Litopenaeus vannamei</i>) Terhadap Kandungan Kolesterol dan Retensi Lemak Daging</b> Agustono, Widya Paramitha Lokapimasari dan Azharur Riyadh	<b>95 - 99</b>
<b>Pengaruh Ekstrak Alga Merah (<i>Kappaphycus alvarezii</i>) Terhadap Jumlah Total Bakteri dan Nilai Organoleptik Ikan Kembung (<i>Rastrelliger</i> sp.)</b> Dyo Maliki Hakim, Wahyu Tjahjaningsih, Sudarno dan Annur Ahadi Abdillah	<b>101 - 107</b>
<b>Identifikasi dan Prevalensi Cacing pada Saluran Pencernaan Ikan Salem (<i>Scomber japonicus</i>) di Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta Utara</b> Rengga Eko Pradipta, Sri Subekti dan Kismiyati	<b>109 - 114</b>
<b>Studi Bioakumulasi Timbal (Pb) pada Ikan Bandeng (<i>Chanos chanos</i> Forskall) di Tambak Sekitar Perairan Sungai Buntung, Kabupaten Sidoarjo</b> Rr. Juni Triastuti, Singgih Aditama dan Boedi Setya Rahardja	<b>115 - 120</b>



## PETUNJUK PENULISAN NASKAH

1. Ketentuan Umum
  - a. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan memuat tulisan ilmiah dalam bidang ilmu perikanan dan kelautan, berupa hasil penelitian, artikel ulasan balik (review/mini review) dan laporan kasus baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
  - b. Naskah/makalah harus orisinal dan belum pernah diterbitkan. Apabila diterima untuk dimuat dalam Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, maka tidak boleh diterbitkan dalam majalah atau media yang lain.
2. Standar Penulisan
  - a. Makalah diketik dengan jarak 2 spasi, kecuali Judul, Abstrak, Judul tabel, Judul gambar, Daftar pustaka, dan Lampiran diketik menurut ketentuan tersendiri.
  - b. Alinea baru dimulai 3 (tiga) ketukan ke dalam atau (*first line 0.3"*).
  - c. Huruf standar untuk penulisan adalah Times New Roman 12.
  - d. Memakai kertas HVS ukuran A4 (21,0 x 29,7 cm).
  - e. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
  - f. Tabel/Illustrasi/Gambar harus hitam putih, amat kontras atau *file scanning* (apabila sudah disetujui untuk dimuat).
3. Tata cara penulisan naskah/makalah ilmiah
  - a. Tebal seluruh makalah sejak awal sampai akhir maksimal 12 (dua belas) halaman.
  - b. Penulisan topik (Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Metode dst.) **tidak** menggunakan huruf kapital (*sentence*) tetapi menggunakan *Title Case* dan diletakkan di pinggir (sebelah kiri).
  - c. Sistematika penulisan makalah adalah Judul, Nama Penulis dan Identitas, Abstrak dengan Key words, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima Kasih (bila ada), Daftar Pustaka.
  - d. Judul harus pendek, spesifik, tidak boleh disingkat dan informatif, yang ditulis dalam bahasa Inggris.
  - e. Nama penulis di bawah judul, identitas dan instansi penulis harus jelas, tidak boleh disingkat dan ditulis di bawah nama penulis.
  - f. Abstrak maksimal terdiri dari 200 (dua ratus) kata, diketik 1 (satu) spasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris.
  - g. Kata kunci (*Key words*) maksimum 5 (lima) kata setelah abstrak.
  - h. Materi dan Metode memuat peralatan/bahan yang digunakan terutama yang spesifik.
  - i. Daftar Pustaka disusun secara alfabetik tanpa nomor urut. Singkatan majalah/jurnal berdasarkan tata cara yang dipakai oleh masing-masing jurnal. Diketik 1 (satu) spasi dengan paragraf hanging 0.3" dan before 3.6 pt. Proporsi daftar pustaka, Jurnal/Majalah Ilmiah (60%), dan *Text Book* (40%). Berikut contoh penulisan daftar pustaka berturut-turut untuk *Text Book* dan Jurnal.  
Roitt, I., J. Brostoff, and D. Male. 1996. *Immunology*. 4<sup>th</sup> Ed. Black Well Scientific Pub. Oxford.  
Staropoli, I., J. M. Clement, M. P. Frenkiel, M. Hofnung and V. Deuble. 1996. Dengue-1 virus envelope glycoprotein gene expressed in recombinant baculovirus elicits virus neutralization antibody in mice and protects them from virus challenge. *Am.J. Trop. Med. Hygi*; 45: 159-167.
  - j. Tabel, Keterangan Gambar atau Penjelasan lain dalam Lampiran diketik 1 (satu) spasi, dengan huruf Times New Roman 12.
4. Pengiriman makalah dapat dilakukan setiap saat dalam bentuk cetakan (*print out*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Setelah ditelaah oleh Tim Editor Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, makalah yang telah direvisi penulis segera dikembalikan ke redaksi dalam bentuk cetakan 1 (satu) eksemplar dengan menyertakan makalah yang telah direvisi dikirim via e-mail ke Dewan redaksi Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan ke alamat: **Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Jl. Mulyorejo (Kampus C Unair) Surabaya 60115, Telp./Fax. 031-5911451; E-mail : sjfm\_unair@yahoo.com; sjfm\_unair@unair.ac.id; Website: www.journal.unair.ac.id**
5. Ketentuan akhir terhadap naskah/makalah yang dikirim, redaksi berhak untuk :
  - a. memuat naskah/makalah tanpa perubahan
  - b. memuat naskah/makalah dengan perubahan
  - c. menolak naskah/makalah
6. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi naskah/makalah.
7. Makalah yang telah dimuat dikenai biaya penerbitan dan biaya pengiriman.
8. Penulis/pelanggan dapat mengirimkan biaya pemuatan makalah /langganan lewat transfer ke Bank Mandiri Cabang Surabaya - Unair No Rek. 141 - 00 - 0980121 - 8 (Laksmi Sulmartiwi).
9. Semua keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat untuk keperluan itu.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi, penulis dan pembaca Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan memberikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pakar di bawah ini selaku mitra bestari Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan.

Prof. Dr. Sri Subekti, DEA., drh. (FKH, UNAIR)  
Prof. Dr. Sri Agus Soedjarwo, Ph.D., drh (FKH, UNAIR)  
Prof. Dr. Ir. Marsudi, M.Sc.(FPIK, UNIBRAW)  
Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc. (FPIK, IPB)  
Prof. Dr. Ir. Feliatra, M.Sc. (FPIK, UNRI)  
Prof. Dr. Sakri Ibrahim (FSAM, UMT, Malaysia)  
Dr. Muhammad Yunus, M.Sc., drh (FKH, UNAIR)  
Dr. Widjiati, M.Si., drh (FKH, UNAIR)  
Dr. Ir. Murdjani, M.Sc. (BBPBAL Lampung)  
Dr. Ir. Triyanto, M.Si. (Faperta, UGM)  
Dr. Ir. Agung Sudaryanto, M.Sc. (FPIK, UNDIP)

**PENGARUH PENAMBAHAN *Crude Fish Oil* (CFO) PADA PAKAN UDANG VANAME (*Litopenaeus vannamei*) TERHADAP KANDUNGAN KOLESTEROL DAN RETENSI LEMAK DAGING**

**INFLUENCE OF ADDITION *Crude Fish Oil* (CFO) IN WHITE SHRIMP (*Litopenaeus vannamei*) FEED TO CHOLESTEROL CONTENT AND FAT RETENTION IN MEAT**

**Agustono, Widya Paramitha Lokapirnasari dan Azharur Riyadh**

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga  
Kampus C Mulyorejo - Surabaya, 60115 Telp. 031-5911451

**Abstract**

White shrimp are aquatic organisms consumed by many people and a source of animal protein and fat needed by humans. Shrimp also require fat as a source of energy and metabolic processes to maximize growth. White shrimp meat contains high cholesterol so that it becomes an obstacle to consume white shrimp and high cholesterol in feed can affect the growth of shrimp. This problem can be solved by adding *Crude Fish Oil* (CFO) which contain high omega-3 fatty acids in white shrimp feed to decrease cholesterol content and source of dietary fat to increase fat retention in meat. The research problem is whether the addition of CFO in white shrimp feed effect on the decrease cholesterol content and increase of fat retention in meat. This research aims to determine the effect of CFO in white shrimp feed to decrease cholesterol and increase of fat retention in meat.

The method used is experimental method with Completely Randomized Design (CRD) as the experimental design. The treatment used is different percentage CFO addition to white shrimp feed, ie P<sub>0</sub> (0%), P<sub>1</sub> (2%), P<sub>2</sub> (4%), P<sub>3</sub> (6%) and P<sub>4</sub> (8%) each treatment is repeated 4 times. Analysis of the data using Analysis of Varians (ANOVA) and to determine the best treatment performed Duncan's Multiple Range Test.

Results showed that the addition of CFO in feed give significant effect ( $p < 0.05$ ) to decrease the cholesterol content in meat. The best average decrease of cholesterol content obtained at P<sub>3</sub> (135.22 mg/100 g) and P<sub>4</sub> (133.51 mg/100 g). Addition of CFO in feed did not give significant effect ( $p > 0.05$ ) to increase fat retention in meat.

**Keywords :** crude fish oil, white shrimp, cholesterol, fat retention

---

**Pendahuluan**

Udang vaname memiliki manfaat sebagai sumber protein hewani, akan tetapi memiliki kelemahan yaitu memiliki kandungan kolesterol pada daging. Udang dianggap sebagai produk dengan kandungan kolesterol tinggi, karena mengandung lebih dari 150 mg kolesterol/100 gram porsi yang dimakan (Ciaparra *et al.*, 2005). Kandungan kolesterol yang berlebih pada pakan udang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan udang. Pakan dengan kandungan 5% kolesterol menekan pertumbuhan juvenil *P. indicus* (Change and Raj, 1997).

Udang membutuhkan nutrisi pada pakan dalam bentuk lemak untuk memenuhi kebutuhan energi dan proses metabolisme. Lemak adalah sumber energi utama dan asam lemak esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan (NRC, 1993). Lemak yang telah diserap akan disimpan di dalam jaringan lemak yang disebut sebagai

retensi lemak. Retensi lemak menggambarkan kemampuan ikan menyimpan dan memanfaatkan lemak pakan (Agustono dkk., 2011). Nilai retensi lemak pada daging dapat dijadikan sebagai indikator terpenuhinya kebutuhan lemak pada pakan yang telah diserap untuk memenuhi kebutuhan metabolisme pada udang vaname.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lokapirnasari (2013) menunjukkan terjadinya penurunan kadar kolesterol pada serum broiler dari 162 mg/dl (kontrol atau 0% minyak ikan) menjadi 134.00 mg/dl pada penambahan minyak ikan sebesar 2%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa asam lemak omega-3 berpengaruh terhadap kandungan kolesterol pada serum broiler melalui penambahan minyak ikan pada ransum pakan. Asam lemak tidak jenuh khususnya asam lemak omega-3 dapat menghambat sintesa *Very Low Density Lipoprotein* (VLDL) dan sebagai

akibatnya produksi *Low Density Lipoprotein* (LDL) pun berkurang (Patawi, 1996).

Minyak ikan merupakan sumber lemak hewani dan mengandung asam lemak omega-3 dalam jumlah yang banyak. Kandungan lemak dan asam lemak omega-3 pada minyak ikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan nilai retensi lemak dan menurunkan kandungan kolesterol pada daging melalui penambahan minyak ikan kasar atau *Crude Fish Oil* (CFO) pada ransum pakan udang. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh Lokapirnasari (2013) *Crude Fish Oil* (CFO) memiliki kandungan lemak kasar sebesar 55,8791%, asam lemak omega-3 yang tinggi yaitu *Eicosapentaenoic Acid* (EPA) sebesar 10,7173% dan *Docosahexaenoic Acid* (DHA) sebesar 7,0108%.

Rumusan Masalah

Apakah penambahan *Crude Fish Oil* (CFO) pada pakan berpengaruh terhadap penurunan kandungan kolesterol dan peningkatan retensi lemak daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*)?

Tujuan

Mengetahui pengaruh penambahan *Crude Fish Oil* (CFO) pada pakan terhadap penurunan kandungan kolesterol dan peningkatan retensi lemak daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*).

Manfaat

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat diketahui pengaruh penggunaan *Crude Fish Oil* (CFO) terhadap kandungan kolesterol dan nilai retensi lemak pada daging udang vaname dengan pemberian dosis yang berbeda. Menghasilkan udang vaname ukuran konsumsi dengan pertumbuhan yang baik dan memiliki kandungan kolesterol yang rendah untuk meningkatkan konsumsi udang masyarakat dan menjadi nilai tambah udang vaname Indonesia pada pasar ekspor udang .

## Materi dan Metode

Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga pada bulan Maret sampai Mei 2014. Analisis kolesterol dan proksimat lemak dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang dan di Laboratorium Pakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Materi Penelitian

Peralatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 20 buah akuarium, spektrofotometer, labu soxhlet, labu penyari,

pendingin refflux, oven, exicator, timbangan analitik, *cruss tang*, kertas saring, aerator, 20 buah batu aerasi, selang aerasi, termometer, *DO test kit*, kertas lakmus, amonia *test kit*, refraktometer, *beaker glass*, sentrifuse.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) dengan berat rata-rata 5 gram/ekor sebanyak 200 ekor, minyak ikan kasar atau *Crude Fish Oil* (CFO), tepung ikan, dedak padi, bungkil kedelai, tapioka, tepung jagung, premix, air tawar, air laut, klorin, alkohol 96%, *petroleum benzene*, alkohol, etanol, klorofom.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode percobaan dan rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebab dalam penelitian ini hanya memiliki satu sumber keragaman yaitu *Crude Fish Oil* (CFO). Penelitian ini menggunakan 5 macam perlakuan dengan 4 ulangan pada setiap perlakuan. Analisis data yang digunakan yaitu *Analysis of Varian* (ANOVA) dan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan digunakan Uji Jarak Berganda Duncan.

## Hasil dan Pembahasan

Kolesterol

Analisis dan penghitungan kandungan kolesterol pada daging udang vaname dari hasil perlakuan penambahan *Crude Fish Oil* (CFO) pada pakan dilakukan dengan alat spektrofotometer Hasil penghitungan *Analysis of Varian* (ANOVA) menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda nyata ( $p < 0,05$ ) terhadap penurunan kandungan kolesterol daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*). Hasil Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa pada perlakuan  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  dan  $P_3$  memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuan percobaan. Hasil penurunan kandungan kolesterol terendah didapat pada perlakuan  $P_3$  dan  $P_4$  akan tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata pada kedua perlakuan tersebut.

Perlakuan	Kandungan Kolesterol mg/100 g $\pm$ SD.
P0	188,26 <sup>a</sup> $\pm$ 2,918
P1	171,65 <sup>b</sup> $\pm$ 7,201
P2	149,48 <sup>c</sup> $\pm$ 5,165
P3	135,22 <sup>d</sup> $\pm$ 3,175
P4	133,51 <sup>d</sup> $\pm$ 3,184

Tabel 1. Rata-rata Kandungan Kolesterol pada Daging Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)



Keterangan: *Superscript* yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ( $p < 0,05$ ).

Pakan perlakuan yang tidak ditambahkan *Crude Fish Oil* (CFO 0%) atau P<sub>0</sub> memiliki kandungan kolesterol pada daging tertinggi yaitu sebesar 188,26 mg/100 g. P<sub>1</sub> (CFO 2%) sebesar 171,65 mg/100 g dan P<sub>2</sub> (CFO 4%) sebesar 149,48 mg/100 g. Kandungan kolesterol terbaik didapat pada perlakuan P<sub>3</sub> (CFO 6%) dan P<sub>4</sub> (CFO 8%) secara berurutan memiliki kandungan kolesterol sebesar 135,22 mg/100 g dan sebesar 133,51 mg/100 g.

Kandungan kolesterol pada daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) menunjukkan adanya perbedaan sesuai dengan peningkatan persentase penambahan *Crude Fish Oil* pada pakan. Komposisi daging udang sangat bervariasi tergantung pada jenis, tingkat umur, musim, habitat dan pakan udang tersebut (Zaitsev *et al.* 1969 dalam Pattawi 1996). Penyebab terjadinya perubahan kandungan kolesterol dapat terjadi akibat adanya proses penyerapan nutrisi pakan oleh udang. Sel mikrofilia pada hepatopankreas menunjukkan fungsi sebagai tempat penyerapan makanan (Ceccaldi, 1989).

Penurunan kolesterol terendah pada daging udang vaname terdapat pada perlakuan P<sub>3</sub> (CFO 6%) dan P<sub>4</sub> (CFO 8%). *Crude Fish Oil* (CFO) adalah minyak ikan yang didapatkan dari hasil ekstraksi dan belum dilakukan proses pemurnian. *Crude Fish Oil* (CFO) memiliki kandungan lemak kasar sebesar 55,8791%, asam lemak omega-3 yang tinggi yaitu *Eicosapentaenoic Acid* (EPA) sebesar 10,7173% dan *Docosahexaenoic Acid* (DHA) sebesar 7,0108% (Lokapirnasari, 2013). Kandungan asam lemak omega-3 (EPA dan DHA) yang tinggi pada CFO menyebabkan penurunan kolesterol daging udang vaname yang ditambahkan CFO pada pakan sebanyak 6% dan 8%. *n-3 Polyunsaturated Fatty Acids* (PUFAs) dari minyak ikan memiliki sifat yang sama dengan PUFAs nabati atau lebih bersifat hipolipidemik (Kinsella *et al.*, 1990).

Hasil perlakuan penambahan *crude fish oil* pada pakan dapat menurunkan kandungan kolesterol hingga mencapai 133,51 mg/100 g pada perlakuan P<sub>4</sub> (CFO 8%). Penambahan CFO pada pakan udang vaname sebanyak 6% dan 8% dalam penelitian ini terbukti dapat menurunkan kandungan kolesterol pada daging udang vaname, nilai kolesterol udang vaname hasil perlakuan penambahan CFO lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan kolesterol

pada daging udang atau pada kerang abalon dan cumi-cumi. Kandungan kolesterol pada daging udang dapat mencapai lebih dari 150 mg/100 g porsi yang dimakan (Ciaparra *et al.*, 2005; Dayal, 2012). Kerang abalon (*Haliotis cracherodi*) sebesar 160 mg/% porsi yang dimakan dan cumi-cumi (*Loligo opalescens*) sebesar 339 mg/% porsi yang dimakan (Krzynowek and Murphy, 1987).

Proses penurunan kolesterol pada daging udang vaname oleh CFO dapat terjadi melalui proses penghambatan sintesis *Very Low Density Lipoprotein* (VLDL) dan *Low Density Lipoprotein* (LDL). Omega-3 dapat menurunkan kadar lipida (kolesterol) dalam serum darah, yaitu dengan jalan menghambat pembentukan protein dan trigliserida dalam VLDL atau LDL sehingga VLDL atau LDL dan kolesterol serum darah menjadi rendah (Manurung, 2009). Omega-3 dapat menghambat sintesa VLDL sebagai akibatnya produksi LDL juga berkurang (Pattawi, 1996).

Menurunnya kandungan kolesterol daging udang melalui penambahan CFO pada penelitian ini juga dapat terjadi melalui proses mekanisme peningkatan aktivitas metabolisme kolesterol dalam tubuh udang vaname. Mekanisme penurunan kolesterol total dan LDL terjadi melalui peningkatan pengambilan partikel LDL dari proses sirkulasi oleh liver (Rustan and Drevon, 2005). *High Density Lipoprotein* (HDL) membawa kolesterol yang sudah tidak digunakan oleh sel menuju liver untuk diperbaiki atau diekskresikan (Colpo, 2005).

**Retensi Lemak**

Analisis proksimat lemak pada daging udang vaname dari hasil perlakuan penambahan *Crude Fish Oil* (CFO) pada pakan dilakukan dengan metode soxhlet. Hasil penghitungan *Analysis of Varian* (ANOVA) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang berbeda nyata ( $p > 0,05$ ) terhadap peningkatan retensi lemak daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*).

Tabel 2. Rata-rata Retensi Lemak pada Daging Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*)

Perlakuan	Retensi Lemak	
	Data Asli % ± SD.	Transformasi $\sqrt{y+0,5}$ % ± SD.
P0	1,23±0,93	1,32±0,35
P1	1,20±0,105	1,30±0,041
P2	1,18±0,020	1,30±0,007
P3	1,16±0,015	1,29± 0,006
P4	1,11±0,019	1,27±0,008

Persentase retensi lemak yang rendah didapatkan pada perlakuan P<sub>0</sub> (CFO 0%) yaitu sebesar 1,23%. P<sub>1</sub> (CFO 2%) sebesar 1,2% dan P<sub>2</sub> (CFO 4%) sebesar 1,18%. Perlakuan P<sub>3</sub> (CFO 6%) sebesar 1,16 dan P<sub>4</sub> (CFO 8%) memiliki persentase sebesar 1,11%.

Penghitungan nilai retensi lemak menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dari hasil penambahan *crude fish oil* (CFO) pada pakan perlakuan percobaan. Perubahan nilai retensi lemak terjadi sesuai dengan peningkatan penambahan jumlah CFO yang ditambahkan pada pakan. Lipid yang terdapat pada pakan akan dicerna dan diserap pada organ pencernaan dan ditransport menuju sel untuk disimpan atau digunakan (Plascencia *et al.*, 2000).

Analisis proksimat menunjukkan kadar lemak yang dapat disimpan pada daging udang vaname hasil perlakuan P<sub>0</sub> (CFO 0%) sampai P<sub>4</sub> (CFO 8%) secara berurutan yaitu sebesar 0,647-0,547%. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Pattawi (1996) yang menyatakan kadar lemak udang windu yang dipelihara secara intensif sebesar 0,43-0,50%. Udang hanya memiliki kemampuan yang kecil untuk menyimpan lemak (Bureau *et al*, 2000).

Rendahnya kandungan lemak pada daging udang vaname percobaan (P<sub>4</sub> atau CFO 8%) dapat dijadikan kesimpulan bahwa, lemak yang telah diserap dari proses pencernaan digunakan oleh udang percobaan sebagai sumber energi dan proses metabolisme lain. Lipid yang tersimpan ditransportasikan pada beberapa organ dan jaringan selama waktu tertentu seperti pada stadia *premolt* (Priya *et al*, 2013). Lemak dari pakan digunakan untuk energi dan memaksimalkan protein untuk proses pertumbuhan (Boonyaratpalin, 1996).

Hasil percobaan menunjukkan adanya penurunan persentase retensi lemak seiring dengan peningkatan kandungan lemak pakan yakni sebesar 1,23% pada perlakuan P<sub>0</sub> (CFO 0%) dan 1,11% pada perlakuan P<sub>4</sub> (CFO 8%), hal ini menunjukkan bahwa lemak pada pakan dapat diserap dan digunakan sebagai sumber energi serta proses metabolisme tubuh udang vaname selama perlakuan percobaan. Du *et al.* (2005) menyatakan penurunan retensi lemak yang signifikan dengan peningkatan level lemak pakan, menunjukkan peningkatan proporsi lemak yang digunakan sebagai energi. Pakan yang mengandung lemak menjadi sumber asam lemak esensial, phospholipid, sterol dan karotenoid yang digunakan untuk pertumbuhan, *survival* dan metabolisme (Felix and Velasques, 2002).

## Kesimpulan

Penambahan *Crude Fish Oil* (CFO) sebesar 6% dan 8% pada pakan dapat menurunkan kandungan kolesterol pada daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) yaitu sebesar 135,22 mg/100 g dan 133,51 mg/100 g. Penambahan *Crude Fish Oil* (CFO) pada pakan tidak dapat meningkatkan nilai retensi lemak pada daging udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) hasil perlakuan.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh tingkat penurunan kolesterol terhadap tingkat pertumbuhan atau *Survival Rate* (SR) ataupun penelitian sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas udang vaname (*Litopenaeus vannamei*) untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap udang.

## Daftar Pustaka

- Agustono., H. Setyono, T. Nurhajati, M. Lamid, M. A. Al-Arief, W. P. Lokapirnasari. 2011. Petunjuk Praktikum Nutrisi Ikan. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Boonyaratpalin, M. 1996. Nutritional Requirements of Commercially Important Shrimp in the Tropics. Proceedings of the National Seminar-Workshop on Fish Nutrition and Feeds. SEAFDEC Aquaculture Department, Iloilo, Philippines.
- Bureau, D. P., P. A. Azevedo, M. T. Salazar, and G. Cuzon. 2000. Pattern and Cost of Growth and Nutrient Deposition in Fish and Shrimp: Potential Implications and Applications. Avances en Nutrición Acuicola V. Memorias del V Simposium Internacional de Nutrición Acuicola. 19-22 Noviembre. Mérida, Yucatán, Mexico.
- Ceccaldi, H. J. 1989. Anatomy and Physiology of Digestive Tract of Crustaceans Decapods Reared in Aquaculture. Advances In Tropical Aquaculture Tahiti. February 20 - March 4, Aquacop.
- Change, M. S. and R. P. Raj. 1997. Cholesterol Requirement of Juvenile Indian White Prawn *Penaeus indicus*. J. Aqua. Trop., 12:227-237.
- Cheng, Z. J. And B. W. Hardy. 2004. Protein And Lipid Sources Affect Cholesterol Concentrations Of Juvenile Pacific White Shrimp, *Litopenaeus vannamei* (Boone). J. Anim. Sci., 82:1136-1145.

- Ciapara, I. H., A.R. T. Guillen, L. N. Orozco, K.G. M. Robinson and M.C. E. Valle. 2005. Production Of a Low-Cholesterol Shrimp Using Supercritical Extraction. *Journal of Food Process Engineering.*, 28:526–538
- Colpo, A. 2005. LDL Cholesterol : “Bad” Cholesterol, or Bad Science?. *Journal of American Physicians and Surgeons.*, 10(3):83-89.
- Dayal, J. S., A. G. Poniah and K. Ambasankar. 2012. Shrimp as Health Food-Advisory Fact and Sheet. Central Institute Of Brackish Water Aquaculture (Indian Council of Agriculture Research). <http://www.ciba.res.in>. 10/09/2013.
- Du, Z. Y., Y. J. Liu, L. X. Tian, J. T. Wang, Y. Wang, and G. Y. Liang. 2005. Effect of Dietary Lipid Level on Growth, Feed Utilization and Body Composition by Juvenile Grass Carp (*Ctenopharyngodon idella*). *Aquaculture Nutrition* 11; 139-146.
- Felix, M. L. G. and M. P. Velazquez, 2002. Current Status of Lipid Nutrition of Pacific White Shrimp, *Litopenaeus vannamei*. *Avances en Nutrición Acuicola VI. Memorias del VI Simposium Internacional de Nutrición Acuicola. 3 al 6 de Septiembre del 2002. Cancún, Quintana Roo, México.*
- Kinsella, J. E., B. Lokesh and R. A. Stone. 1990. Dietary n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Amelic Cardiovascular Disease: Possible Mechanism. *Am. J. Clin. Nutr.*, 52:1-28.
- Krzynowek, J. And J. Murphy. 1987. Proximate Composition, Energy, Fatty Acid, Sodium, and Cholesterol Content of Finfish, Shellfish and their Product. NOAA Technical Report NMFS 55.
- Lokapirnasari, W. P. 2013. Potensi Inokulan Selulolitik *Enterobacter cloacae* dan Minyak Ikan untuk Meningkatkan Kualitas Pakan serta Implikasinya terhadap Penampilan Produksi dan Kualitas Daging Broiler. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Lucas, J. S. and P. C. Southgate. 2003. *Aquaculture Farming Aquatic Animal and Plants*. Blackwell Publishing Company. Oxford. UK.
- Manurung, D. M. 2009. Komposisi Kimia, Asam Lemak dan Kolesterol Udang Ronggeng (*Harpisquilla raphidea*) Akibat Perebusan. Skripsi. Departemen Teknologi Hasil Perairan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- National Research Council. 1993. *Nutrient Requirement of Fish*. National Academy Press. Wahington, D. C.
- Patawi, A. 1996. Pengaruh Habitat Terhadap kandungan Asam Lemak Omega-3 dan Kolesterol pada Udang Windu (*Penaeus monodon* Fab). Skripsi. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Fakultas Perikanan. Institut Pertanian Bogor.
- Plascencia, G. Y., F. V. Albores, and I. H. Ciaparra. 2000. Penaeid Shrimp Hemolymph Lipoproteins. *Aquaculture* 191:177-189.
- Poedjiadi, A. 1994. *Dasar-Dasar Biokimia*. UI-Press. Salemba. Jakarta.
- Priya, E. R., K. L. J. Kala, S. Ravichandran, and M. Chandran. 2013. Variation of Lipid Concentration in Some Edible Crabs. *Journal of Fish and Marine Sciences* 5 (1): 110-112.
- Rustan, A. C. And C. A. Drevon. 2005. *Fatty Acids: Structures and Properties*. Encyclopedia of Life Sciences. John Willey and Sons, Ltd.