

KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR PADA DAUN KACANG TANAH (*Arachis hypogaea*) YANG DIFERMENTASI DENGAN BAKTERI *Enterobacter cloacae* WPL 111 SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF IKAN

Submission date: 05-Dec-2018 08:58AM (UTC+0800) *by* Widya Paramita

Submission ID: 1050772204

File name: rnal_Ilmiyah_Perikanan_Kelautan,_Vol._7_No._2._Nopember_2015.pdf (167.92K)

Word count: 3070

Character count: 18491

Volume 7 No. 2, November 2015

ISSN 2085-5842

JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN



Fokus Utama

Pemeriksaan *Viral Nervous Necrosis* (VNN) pada Ikan dengan Metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR)

Pengaruh Perasan Biji Pepaya (*Carica papaya*) Terhadap Kerusakan Telur *Anguilla japonica*

Analisis Finansial Pembesaran Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) pada Tambak Tradisional dengan Sistem Monokultur dan Polikultur di Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur

Pengaruh Larutan *Fixer* Terhadap Kualitas Pewarnaan Biopigmen Rumput Laut *Eucheuma* sp. Sebagai Pengganti Pewarna Sintetis pada Tekstil

Pengaruh Penambahan Perasan Paprika Merah (*Capsicum annum*) dalam Pakan Terhadap Tingkat Kecerahan Warna Ikan Koi (*Cyprinus carpio* L.)

Substitusi Tepung Ikan dengan Tepung Limbah Ikan Hiu (*Carcharias* sp.) Terhadap Pertumbuhan, Efisiensi Pakan dan *Survival Rate* Ikan Lele Dumbo (*Clarias* sp.)

Pengaruh Pemberian Probiotik Plus Herbal pada Pakan Komersil Terhadap Retensi Protein dan Retensi Lemak Ikan Nila Merah (*Oreochromis niloticus*)

Pengaruh Pemberian Ekstrak *Sargassum* sp. dengan Pelarut Metanol pada Pakan Terhadap Jumlah Eritrosit dan Differential Leukosit Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)



Fakultas Perikanan dan Kelautan

Universitas Airlangga



Table of Contents

No.	Title	Page
1	PAPAYA LEAF POWDER POTENTIAL TO IMPROVE EFFICIENCY UTILIZATION OF FEED, PROTEIN EFFICIENCY RATIO AND RELATIVE GROWTH RATE IN TILAPIA (<i>Oreochromis niloticus</i>) FISH FARMING	121 - 124
2	CHARACTERIZATION OF EDIBLE FILM FROM PROPAGULES MANGROVE LINDUR (<i>Bruguiera gymnorrhiza</i>) STARCH WITH ADDITION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE (CMC) AS PLASTICIZER	125 - 132
3	POTENTIAL OF <i>Bacillus licheniformis</i> AND <i>Streptomyces olivaceoviridis</i> AS INHIBITING THE GROWTH OF FUNGUS <i>Saprolegnia</i> sp, CAUSE SAPROLEGNIASIS ON FISH BY USING IN VITRO	133 - 140
4	THE COMPARISON OF VISCOSITY, FLASH POINT AND FREEZE POINT BIODIESEL OF SEAGRASS (<i>Eucheuma denticulatum</i>), SARDINELLA OIL (<i>Sardinella longiceps</i>) AND COMMERCIAL BIODIESEL	141 - 148
5	Viral nervous necrosis (VNN) EXAMINATION AT FISH BY Polymerase Chain Reaction (PCR) METHOD	149 - 152
6	THE BASIC HISTOLOGY TECHNIQUE OF GOURAMY FISH (<i>Osphronemus gourami</i>)	153 - 158
7	THE INFLUENCE OF PAPAYA SEEDS (<i>Carica papaya</i>) TOWARD THE DAMAGE <i>Argulus japonicus</i> 's EGGS	159 - 164
8	CONTENT OF CRUDE PROTEIN AND CRUDE FIBER IN PEANUT LEAVES (<i>Arachis hypogaea</i>) WHICH IS FERMENTED BY <i>Enterobacter cloacae</i> WPL 111 AS ALTERNATIVE FISH FEED STUFF	165 - 168
9	FINANCIAL ANALYSIS OF FISH ENLARGEMENT MILKFISH (<i>CHANOS CHANOS</i>) IN POND WITH TRADITIONAL FARMING AND MONOCULTURE POLYCULTURE SYSTEM IN MULYOJEJO, SURABAYA, EAST JAVA	169 - 176
10	CHEMICAL SILAGE SUBSTITUTION OF SWANGGI SURIMI SOLID WASTE (<i>Priacanthus macracanthus</i>) OF FISH MEAL TOWARD ENERGY RETENTION AND TIPLAPIA SEEDS (<i>Oreochromis niloticus</i>) FEED CONVERSION RATE	177 - 182
11	THE INFLUENCE OF FIXER FOR THE QUALITY OF COLORING BIOPIGMENT <i>Eucheuma</i> sp. As a SUBSTITUTE FOR SYNTHETIC DYES IN TEXTILES	183 - 188
12	THE INFLUENCE OF ADDITIONAL RED PEPPER (<i>Capsicum annuum</i>) JUICE IN FISH FEED TO KOI FISH'S (<i>Cyprinus carpio</i> L.) COLOR BRIGHTNESS LEVEL	189 - 194
13	EFFECT OF NESTING SITE DEPTH OF GREEN TURTLE (<i>Chelonia mydas</i>) ON THE INCUBATION PERIOD AND HATCHING SUCCESS PERCENTAGE IN SUKAMADE BEACH, MERU BETIRI NATIONAL PARK, BANYUWANGI IN EAST JAVA	195 - 198
14	SUBSTITUTION OF FISH MILL WITH SHARK WASTE MILL (<i>Carcharhinus</i> sp) on GROWTH, FEED EFFICIENCY AND FISH SURVIVAL RATE of AFRICAN CATFISH (<i>Clarias</i> sp.)	199 - 206
15	THE EFFECT OF ADDITION PROBIOTIC PLUS HERBAL ON COMMERCIAL FEED TO PROTEIN RETENTION AND FAT RETENTION RED TILAPIA FISH (<i>Oreochromis niloticus</i>)	207 - 212
16	EFFECT OF EXTRACT <i>Sargassum</i> sp. WITH METHANOL SOLVENT IN FEED ON ERYTHROCYTES AND DIFFERENTIAL LEUCOCYTES OF AFRICAN CATFISH (<i>Clarias gariepinus</i>)	213 - 218
17	HEMATOLOGIC CHANGES COMET GOLDFISH (<i>Carassius auratus auratus</i>) AS	219 - 224

No.	Title	Page
	A RESULT OF INFESTATION <i>Argulus japonicus</i> MALES AND <i>Argulus japonicus</i> FEMALES	
18	HAEMATOLOGY AND HISTOPATOLOGY OF GILLS, INTESTINE AND BRAIN KOI FISH (<i>Cyprinus carpio koi</i>) <i>Myxobolus koi</i> ORALLY INFECTED	225 - 234

CONTENT OF CRUDE PROTEIN AND CRUDE FIBER IN PEANUT LEAVES (*Arachis hypogaea*) WHICH IS FERMENTED BY *Enterobacter cloacae* WPL 111 AS ALTERNATIVE FISH FEED STUFF

KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR PADA DAUN KACANG TANAH (*Arachis hypogaea*) YANG DIFERMENTASI DENGAN BAKTERI *Enterobacter cloacae* WPL 111 SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF IKAN

1. Karlina Hardianing Pangestu --> Mahasiswa Fakultas Perairan dan Kelautan / X
2. Agustono --> Dosen Fakultas Perairan dan Kelautan / X
3. Widya Paramita Lokapirnasari --> Dosen Fakultas Perairan dan Kelautan / X

5 Abstract

Feed is an element that really support the activities of aquaculture, there for the feed that is available must be adequate and meet the needs of the fish. Efforts to reduce feed costs, some farmers use alternative feed ingredients as a substitute for feed ingredients. Peanut leaves in the form of flour can be used as fish feed in pellet form. Peanut is potential biological resources to be used as feed to the waste produce sufficient forage nutritional value. Peanut leaves nutrition consist of, the dry matter 96,2754%, 29,7397% crude fiber, 17,2475% crude protein (Unit Inspection Services Consulting and Training of Faculty of Veterinary Medical Laboratory Airlangga University, 2014). This research been used Completely Randomized Design (CRD) method with five treatments and four replications. The treatment used were control (P0), the provision of *Enterobacter cloacae* WPL 111 5% (P1), 10% (P2), 15% (P3) and 20% (P4) with each repeated four times. Parameters observed were content of crude protein and crude fiber after fermentation for seven days in anaerob facultative. Data about the contain of crude protein and crude fiber obtained from this studied were analyzed with analysis of variants to determine the effect of treatment. Different between treatments were tested with Duncan;s multiple range test (DMRT). These results indicate that administration *Enterobacter cloacae* WPL 111 10% gave significant effect of the increase in crude protein content in the fermented leaves peanut and administration *Enterobacter cloacae* WPL 111 5% gave significant effect of the decrease in crude fiber content in the fermented leaves peanut. The suggested dosage to reduce the content of crude fiber and increase the crude protein content in the fermented leaves peanut is 10%.

Keyword : Peanut, leaves, *Enterobacter*, *cloacae*, WPL, 111, crude, protein, crude, fiber,

Daftar Pustaka :

1. H. Handajani ; W. Wahju, (2010). Nutrisi Ikan. X : UMM Press
2. Kusrieningrum, (2010). Perancangan Percobaan. X : Airlangga University Press
3. S. Sumarsih, (2009). Diktat Kuliah Mikrobiolog Dasar. X : UPN press

2
KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR PADA DAUN KACANG TANAH (*Arachis hypogaea*) YANG DIFERMENTASI DENGAN BAKTERI *Enterobacter cloacae* WPL 111 SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF IKAN

CONTENT OF CRUDE PROTEIN AND CRUDE FIBER IN PEANUT LEAVES (*Arachis hypogaea*) WHICH IS FERMENTED BY *Enterobacter cloacae* WPL 111 AS ALTERNATIVE FISH FEED STUFF

Karlina Hardianing Pangestu, Agustono dan Widya Paramita Lokapirnasari

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga
Kampus C Mulyorejo - Surabaya, 60115 Telp. 031-5911451

5
Abstract

Feed is an element that really support the activities of aquaculture, there for the feed that is available must be adequate and meet the needs of the fish. Efforts to reduce feed costs, some farmers use alternative feed ingredients as a substitute for feed ingredients. Peanut leaves in the form of flour can be used as fish feed in pellet form. Peanut is potential biological resources to be used as feed to the waste produce sufficient forage nutritional value. Peanut leaves nutrition consist of, the dry matter 96,2754%, 29,7397% crude fiber, 17,2475% crude protein (Unit Inspection Services Consulting and Training of Faculty of Veterinary Medical Laboratory Airlangga University, 2014). This research been used Completely Randomized Design (CRD) method with five treatments and four replications. The treatment used were control (P0), the provision of *Enterobacter cloacae* WPL 111 5% (P1), 10% (P2), 15% (P3) and 20% (P4) with each repeated four times. Parameters observed were content of crude protein and crude fiber after fermentation for seven days in anaerob facultative. Data about the contain of crude protein and crude fiber obtained from this studied were analyzed with analysis of variants to determine the effect of treatment. Different between treatments were tested with Duncan's multiple range test (DMRT). These results indicate that administration *Enterobacter cloacae* WPL 111 10% gave significant effect of the increase in crude protein content in the fermented leaves peanut and administration *Enterobacter cloacae* WPL 111 5% gave significant effect of the decrease in crude fiber content in the fermented leaves peanut. The suggested dosage to reduce the content of crude fiber and increase the crude protein content in the fermented leaves peanut is 10%.

Keywords : Peanut leaves, *Enterobacter cloacae* WPL 111, crude protein, crude fiber

Pendahuluan

0 Pakan berperan sangat penting pada usaha budidaya perikanan, sehingga pakan yang tersedia harus memenuhi kebutuhan nutrisi ikan tersebut. Pakan memberikan kontribusi terbesar yaitu mencapai 60 sampai 70% dari total biaya produksi (Handajani, 2008). Salah satu upaya untuk mengurangi biaya pakan yaitu dengan pemanfaatan bahan baku pakan alternatif. Bahan pakan alternatif ikan pada umumnya berasal dari berbagai limbah yang kandungan nutrisinya masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ikan. Limbah dari pertanian umumnya mempunyai kandungan protein yang rendah tetapi kandungan seratnya tinggi (Rokhmani, 2008).

Bahan pakan alternatif yang dapat dimanfaatkan adalah daun kacang tanah. Daun kacang tanah dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ikan karena kemudahan dalam memperoleh, mengelola dan tidak termasuk

bahan makanan manusia. Kandungan nutrisi limbah daun kacang tanah yaitu berat kering 96,2754%, serat kasar 29,7397%, protein kasar 17,2475% (Unit Layanan Pemeriksaan Laboratoris Konsultasi dan Penelitian FKH UA, 2014).

Fermentasi merupakan kemajuan bioteknologi dengan memanfaatkan mikroba dan merupakan cara alternatif optimalisasi daur ulang limbah pertanian (Muis dkk, 2008). Fermentasi dapat dilakukan dengan menggunakan mikroba, baik mikroba proteolitik maupun mikroba selulolitik (Hidayat dkk., 2006). Tujuan fermentasi adalah meningkatkan kadar protein, menurunkan serat kasar, dan meningkatkan pencernaan bahan pakan yang mengandung ligno-selulosa (Soundstol dan Coxworth, 1984 yang dikutip oleh Sovia, 2002).

Serat kasar yang tinggi menjadi faktor pembatas pemanfaatan bahan-bahan hasil samping agroindustri. Kandungan selulosa pada

serat kasar merupakan komponen utama penyusun dinding sel yang merupakan polimer glukosa yang dapat dipecah melalui hidrolisis asam dan enzimatis (Murni *et al.*, 2008). Keberadaan lignin dan hemiselulosa merupakan penghambat utama dalam hidrolisis selulosa. Hasil fermentasi diharapkan terjadi peningkatan terhadap kualitas bahan pakan yang akan digunakan sebagai campuran pakan ikan dan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan (Widiastuti, 2007).

Pada penelitian ini digunakan bakteri selulolitik *Enterobacter cloacae* WPL 111. Bakteri selulolitik menghasilkan enzim selulase yang akan menghidrolisis selulosa menjadi selobiosa dan glukosa. Bakteri selulolitik menghasilkan enzim selulase yang dapat menghidrolisis selulosa menjadi karbohidrat terlarut yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh ternak sebagai sumber energi.

Materi dan Metode

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini telah dilakukan di Departemen Peternakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya pada bulan Agustus 2014.

Peralatan Penelitian

1 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantong plastik ukuran 0,5 kg, spuit, gelas ukur, timbangan digital, pisau, mesin penggiling pakan, pH paper, oven, nampan plastik dan sendok.

2 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah daun kacang tanah. Bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi merupakan bakteri selulolitik yaitu *Enterobacter cloacae* WPL 111 yang didapatkan dari Departemen Peternakan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga dengan kepadatan 2,22 Skala Mc Farland (6.66×10^8 CFU/ml). Bahan penunjang lain dalam penelitian ini adalah tetes tebu dan akuades steril.

12 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen untuk mengetahui kandungan protein kasar dan serat kasar pada daun kacang tanah yang difermentasi dengan *Enterobacter cloacae* WPL 111 dengan dosis yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan.

Prosedur Kerja

a. Pembuatan Tepung Daun Kacang Tanah

Daun kacang tanah dipisahkan antara batang dan daunnya, selanjutnya daun kacang tanah dikeringkan dalam oven dengan suhu 60°C selama 24 jam. Daun yang sudah kering digiling dengan ukuran 1 mm sehingga menjadi tepung. Tepung daun kacang tanah yang sudah kering dibagi dalam kantong plastik masing-masing sebanyak 50 gram.

b. Pencampuran Tepung Daun Kacang Tanah dengan Enterobacter

Tepung daun kacang tanah yang telah ditimbang sebanyak 50 gram dimasukkan dalam baki untuk dicampur dengan larutan fermentor. Pembuatan fermentor yaitu dengan mencampurkan aquades dan tetes tebu dengan dosis 3% dari jumlah tepung daun kacang tanah sampai merata, kemudian ditambahkan *Enterobacter* sesuai dengan dosis yang ditentukan pada perlakuan.

c. Proses Fermentasi

Tepung daun kacang tanah yang telah dicampur secara homogen dengan larutan fermentor dimasukkan dalam kantong plastik dan diikat. Proses fermentasi dilakukan pada suhu 34-37°C dan dalam suasana anaerob selama tujuh hari. Setelah proses fermentasi selesai, hasil tepung daun kacang tanah fermentasi tersebut diangin-anginkan kemudian dianalisis proksimat untuk mengetahui kandungan serat kasar dan protein kasar.

Parameter Pengamatan

17 Parameter utama yang diamati dalam penelitian ini adalah nilai kandungan protein kasar dan serat kasar. Nilai kandungan tersebut diketahui dengan melakukan analisis proksimat.

1 Analisis Data

Data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan *Analysis of Variant* (ANOVA) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan yang diberikan. Jika terdapat pengaruh maka dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$ untuk mengetahui perlakuan mana yang memberikan hasil tertinggi dan terendah (Kusriningrum, 2010).

Hasil dan Pembahasa

a. Protein Kasar

Kandungan protein kasar tertinggi adalah pada perlakuan P3 dimana P3 merupakan perlakuan penambahan *Enterobacter* 15%, sedangkan perlakuan terendah yaitu P0 dimana

P0 merupakan kontrol tanpa penambahan *Enterobacter*.

Tabel 1. Kandungan protein kasar berdasarkan bahan kering 100% pada daun kacang tanah yang difermentasi dengan bakteri selulolitik *Enterobacter cloacae* WPL 111.

Perlakuan	Protein kasar (%) ± SD
P0 (0%)	17,2500a ± 0,5000
P1 (5%)	19,7500b ± 0,5000
P2 (10%)	22,0000c ± 0,8165
P3 (15%)	22,2500c ± 0,9574
P4 (20%)	21,7500c ± 0,5000

Keterangan
a,b,c : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($p < 0,05$)

b. Serat Kasar

Berdasarkan uji jarak berganda Duncan (*Duncan's Multiple Range Test*) didapatkan hasil kandungan serat kasar dari ke lima perlakuan diketahui P0 (0%) memiliki kandungan serat kasar tinggi yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3 (15%) namun berbeda nyata dengan P1 (5%), P2 (10%) dan P4 (20%). Kandungan serat kasar yang rendah yaitu P1 dengan penambahan *Enterobacter* 5% tidak berbeda nyata dengan penambahan *Enterobacter* 20% (P4).

Tabel 2. Kandungan serat kasar berdasarkan bahan kering 100% pada daun kacang tanah yang difermentasi dengan bakteri selulolitik *Enterobacter cloacae* WPL 111.

Perlakuan	Serat Kasar (%) ± SD
P0 (0%)	32,0000c ± 0,0000
P1 (5%)	29,0000a ± 1,1547
P2 (10%)	30,7500b ± 0,9574
P3 (15%)	31,0000bc ± 0,0000
P4 (20%)	30,0000ab ± 0,8165

Keterangan
a,b,c : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata ($p < 0,05$)

Berdasarkan hasil penelitian fermentasi daun kacang tanah dengan *Enterobacter cloacae* WPL 111 selama 7 hari menunjukkan

bahwa penambahan *Enterobacter cloacae* WPL 111 pada setiap perlakuan menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap peningkatan kandungan protein kasar daun kacang tanah jika dibandingkan dengan dosis penambahan *Enterobacter cloacae* WPL 111 0% (P0) sebagai kontrol. Kandungan protein kasar yang tinggi terdapat pada dosis 15% (P3) dengan nilai 22,2500% yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan pemberian dosis 10% (P2) dan pemberian dosis 20% (P4).

Apabila dilihat dari efisiensi penggunaan *Enterobacter cloacae* WPL 111 yang tepat adalah dosis 10% (P2), mengingat bahwa dosis 10% (P2) telah mampu meningkatkan kandungan protein kasar menjadi 22,0000% dengan memberikan nilai protein kasar yang tidak berbeda nyata dengan pemberian dosis yang lebih tinggi yaitu 15% (P3) yang dapat meningkatkan kandungan protein kasar menjadi 22,2500% dan pemberian dosis 20% (P4) yang dapat meningkatkan kandungan protein kasar menjadi 21,7500%.

Perkembangan dari mikroba tergantung pada karbon yang tersedia, dengan meningkatnya jumlah mikroba tersebut maka terjadi kompetisi diantara mikroba untuk mendapatkan karbon, sehingga ketersediaan karbon menjadi faktor pembatas (Rifqiyah, 2005 dalam Rachmasari, 2011). Pada perlakuan P2 (10%) mendapatkan hasil protein kasar yang tinggi dan dikatakan sebagai dosis yang efisien karena pada dosis ini mikroba dapat memperoleh sumber nutrisi dengan cukup dibandingkan dengan perlakuan P3 (15%) dan P4 (20%) yang tidak berbeda nyata dengan P2 (10%) karena dengan meningkatnya jumlah mikroba dapat terjadi kompetisi diantara mikroba untuk mendapatkan nutrisi.

Bakteri *Enterobacter cloacae* WPL 111 merupakan mikroba yang merupakan protein sel tunggal yang dalam tubuhnya mengandung nitrogen. Jumlah koloni mikroba yang bertambah selama proses fermentasi secara tidak langsung dapat meningkatkan kandungan protein kasar dari suatu bahan karena mikroba merupakan sumber protein sel tunggal (Wuryantoro, 2006 dalam Priskila, 2007). Menurut Sumarsih (2009) protein sel tunggal merupakan istilah yang digunakan untuk protein kasar murni yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau banyak yang sederhana seperti bakteri, khamir, jamur, ganggang dan protozoa. Mikroba menghasilkan enzim, *Enterobacter cloacae* WPL 111 menghasilkan enzim selulase yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kandungan protein kasar pada daun kacang tanah karena

enzim merupakan protein.

Berdasarkan hasil penelitian fermentasi daun kacang tanah dengan *Enterobacter cloacae* WPL 111 menunjukkan bahwa penambahan *Enterobacter cloacae* WPL 111 dengan dosis 5% (P1) memberikan hasil penurunan serat kasar yang baik yaitu 29,0000% namun tidak berbeda nyata dengan dosis 20% (P4) yaitu 30,0000%.

Bakteri yang digunakan dalam fermentasi ini adalah *Enterobacter cloacae* WPL 111 dengan kepadatan 2,22 Skala Mc Farland (6.66×10^8 CFU/ml). Penurunan serat kasar pada penelitian ini disebabkan oleh *Enterobacter cloacae* WPL 111 yang merupakan bakteri selulolitik yang dapat memproduksi enzim selulase. Enzim selulase merupakan enzim kompleks yang terdiri dari endoselulose dan eksoselulose. Enzim ini akan memecah selulosa menjadi selobiosa. Enzim yang mendegradasi selulosa yaitu endoglukanase / karboksil metal sululase (endo - 1,4 - β - glukukanase), eksoglukanase / selobiohidrolase (ekso - 1,4 - β - glikanase) dan selobiase (β - glukosidase) (Hardjo dkk., 1989; Schlege; dan Schmidt, 1994). Endoglukanase memecah unit gukosil dari selulo-oligosakarida/selulodekstrin. Eksoglukanase memecah unit gukosil dari selulo-oligosakarida dengan melepaskan selobiosa, kemudian selobiase menghidrolisis selobiosa dan oligosakarida menjadi glukosa (Hardjo dkk., 1989).

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : pemberian *Enterobacter cloacae* WPL 111 dapat meningkatkan kandungan protein kasar pada daun kacang tanah yang difermentasi dengan dosis optimal 10%. Pemberian *Enterobacter cloacae* WPL 111 dapat menurunkan kandungan serat kasar pada daun kacang tanah yang difermentasi dengan dosis optimal 5%. Dosis yang disarankan untuk menurunkan kandungan serat kasar dan meningkatkan kandungan protein kasar pada daun kacang tanah yang difermentasi adalah 10%. Melakukan penelitian lebih lanjut dengan lama waktu fermentasi yang berbeda untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap peningkatan kandungan protein kasar dan penurunan serat kasar pada fermentasi daun kacang tanah. Melakukan penelitian lebih lanjut yang mengarah kepada aplikasi langsung terhadap terapan pemanfaatan daun kacang tanah fermentasi pada ikan herbivore untuk melihat kualitas pakan secara kimiawi, fisika dan biologis yang di dalamnya meliputi

kecernaan pakan dan pertumbuhan.

Daftar Pustaka

- Handajani, H dan W. Wahyu. 2010. Nutrisi Ikan. UMM Press. Malang. hal 57-78.
- Hardjo, S., N.S. Indrasari., dan T . Bantacut. 1989. Biokonversi: Pemanfaatan Limbah Industri Pertanian. Pusat Antar Universitas. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hidayat, N.,M.Padaga dan S. Suhartini. 2006. Mikrobiologi Industri. Andi Offset. Yogyakarta. hal 15-31.
- Kusriningrum. 2010. Perancangan Percobaan. Airlangga University Press. Surabaya. hal 172.
- Muis, A., C. Khairani., Sukarjo dan Y.P. Rahardja. 2008. Petunjuk Teknis Teknologi Pendukung Pengembangan Agribisnis Si Desa PAMI. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Sulawesi Tengah. Hal 44.
- Murni, R., Suparjo., Akmal dan B.L. Ginting. 2008. Buku Ajar Teknologi Pemanfaatan Limbah Untuk Pakan. Laboratorium Makanan Ternak Fakultas Peternakan. Universitas Jambi. hal 28.
- Priskila, F. 2007. Pengaruh penggunaan Kambucha Terhadap Protein Kasar dan Serat Kasar pada Fermentasi Daun Talas. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rokhmani, S. 2008. Peningkatan Nilai Gizi Bahan dari Limbah Pertanian Melalui Fermentasi Lokakarya Nasional Potensi dan Peluang Pengembangan Usaha Agribisnis Kelinci. Balai Penelitian Ternak. Bogor. hal 15.
- Schlegel, H.G. dan K. Scuhmidt. 1994. Mikrobiologi Umum. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. hal 468-505.
- Sumarsih, S. 2009. Diktat Kuliah Mikrobiologi Dasar. UPN press. Yogyakarta.
- Widiastuti, R.R. 2007. Formulasi Pakan Buatan dengan Teknologi Fermentasi pada Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis niloticus* Linn). Jurusan SITH-ITB. Bandung. hal 19.

KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR PADA DAUN KACANG TANAH (*Arachis hypogaea*) YANG DIFERMENTASI DENGAN BAKTERI *Enterobacter cloacae* WPL 111 SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF IKAN

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unair.ac.id

Internet Source

5%

2

docplayer.info

Internet Source

5%

3

ejournal.unsri.ac.id

Internet Source

2%

4

docobook.com

Internet Source

2%

5

www.adpublications.org

Internet Source

2%

6

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

7

www.jim.unsyiah.ac.id

Internet Source

1%

8

staff.undip.ac.id

Internet Source

1%

9	www.daengaswar.com Internet Source	1%
10	www.pjbs.org Internet Source	1%
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
12	es.scribd.com Internet Source	1%
13	media.neliti.com Internet Source	1%
14	unhas.ac.id Internet Source	1%
15	www.unhas.ac.id Internet Source	<1%
16	uhudabdullah.blogspot.com Internet Source	<1%
17	semirata2016.fp.unimal.ac.id Internet Source	<1%
18	D J Prihadi, A Shofiyullah, Y Dhahiyat. "Marine tourism and the locations of protected turtles on Sukamade Beach, Meru Betiri National Park, East Java", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018 Publication	<1%

19

tripuspawidawati.blogspot.com

Internet Source

<1%

20

Edi Wibowo, Suryono, Tri Saputra. "Effect of Giving Dry Shrimp with Different Concentration on the Growth of Green Turtle Baby [*Chelonia Mydas* (Linnaeus, 1758)] in Sukamade Coastal Areas Meru Betiri National Park, Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia", *Aquatic Procedia*, 2016

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

KANDUNGAN PROTEIN KASAR DAN SERAT KASAR PADA DAUN KACANG TANAH (*Arachis hypogaea*) YANG DIFERMENTASI DENGAN BAKTERI *Enterobacter cloacae* WPL 111 SEBAGAI BAHAN PAKAN ALTERNATIF IKAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
