

**PROFIL PASIEN GANGGUAN KEJIWAAN KRONIS YANG PERNAH
MEMILIKI IDE BUNUH DIRI DAN TIDAK PERNAH MEMILIKI IDE BUNUH
DIRI DI POLI Jiwa RSUD Dr. SOETOMO**

Abstrak

Latar Belakang : Faktor risiko timbulnya ide bunuh diri bahkan melakukan bunuh diri antara lain memiliki riwayat gangguan kejiwaan, riwayat keluarga yang pernah melakukan bunuh diri ataupun depresi, dan pernah melakukan percobaan bunuh diri.

Tujuan : Untuk mengetahui profil dari pasien gangguan kejiwaan kronis yang pernah memiliki ide bunuh diri maupun yang tidak pernah memiliki ide bunuh diri, serta mengidentifikasi intensitas ide dan adanya percobaan bunuh diri pada subjek yang pernah memiliki ide bunuh diri. selain itu, untuk mengetahui adanya perilaku yang membahayakan diri pada subjek yang tidak pernah memiliki ide bunuh diri.

Metode : Penelitian deskriptif observasional yang datanya diambil melalui wawancara dengan kuesioner C- SSRS dan beberapa wawancara tambahan kepada pasien gangguan kejiwaan kronis di poli jiwa RSUD Dr. Soetomo

Hasil : Subjek penelitian yang pernah memiliki ide bunuh diri sebanyak 11 orang dengan diagnosis 8 orang skizofrenia dan 2 orang dengan bipolar, rata- rata lama sakitnya 16, 55 tahun, GAF Scale saat timbulnya ide pada 40- 31 hingga 60- 51, GAF Scale ini mengalami perbaikan saat ini pada rentang 60- 51 hingga 80- 71. Kelompok usia terbanyak saat timbulnya ide yaitu remaja akhir dan dewasa, banyak yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga berpenghasilan rendah maupun tidak berpenghasilan, serta pendidikan rendah. Subjek penelitian yang tidak pernah memiliki ide bunuh diri berjumlah 23, 2 diantaranya dengan diagnosis depresi, rata- rata lama sakit 12, 04 tahun, kelompok usia berimbang antara perempuan dan laki- laki, beberapa bekerja sebagai pedagang dan swasta, memiliki penghasilan 2,5- 6 juta, dan beberapa dengan pendidikan hingga kuliah

Simpulan : Ide bunuh diri ditemukan lebih banyak pada subjek penelitian dengan umur muda, lama sakit lebih lama, GAF Scale rendah, perempuan, tidak bekerja dan tidak berpenghasilan, serta dengan tingkat pendidikan relative rendah

Kata kunci : Bunuh diri, Ide bunuh diri, Gangguan kejiwaan kronis

**PROFIL PASIEN GANGGUAN KEJIWAAN KRONIS YANG PERNAH
MEMILIKI IDE BUNUH DIRI DAN TIDAK PERNAH MEMILIKI IDE BUNUH
DIRI DI POLI JIWA RSUD Dr. SOETOMO**

Abstract

Background : Risk factor for suicide ideation or suicide are history of mental illness, family's history with suicide or depression, and had suicide attempts

Aim : To know about patients with mental illness's profiles that had suicide ideation and never had suicide ideation. To identify idea's intensity and history of suicide attempts at subject that had suicide ideation. To know there are non suicidal self harm at someone that never had suicide ideation

Method : Interview with C- SSRS quisioner and some additional interview to chronic mental illness patients at poli jiwa RSUD Dr. Soetomo

Result : Total subjects that had suicide ideation is 11, 8 with skizofrenia and 2 with bipolar, mean age of illness's onset is 16, 55 years, GAF Scale when suicide ideation appears at range 40- 31 until 60- 51, This GAF Scale get better today in range 60- 51 until 80- 71, mostly in age's group teenage and adult when suicide ideation appears, mostly women. Many of them are unemployed, have lower income, even didn't have income, and also non college graduated. Total subject that never had suicidal ideation is 23, 2 of them with depression, mean age of illness's onset is 12, 04 years, balance between women and men, some of them are seller and work in private sector, with income in range 2, 5- 6 million, and few of them are college graduated.

Conclusion : Suicide ideation mostly found at subject with yonger age, longer age of illness's onset, lower GAF Scale, women, unemployed, lower income, and lower education

Keyword : Suicide, Suicide ideation, chronis mental illness