

CONSTANT MURLEY SCORE  
ON PATIENTS POST  
SUPRASPINATUS  
RECONSTRUCTION WITH  
MEMBRANE AMNION  
COMPOSITE AND FAT TISSUE  
ALLOGENIC MESENCHYMAL  
STEM CELL AUGMENTATION

**Submission date:** 17-Oct-2019 11:54AM (UTC+0800)  
*by* Heri Suroto

**Submission ID:** 1194494436

**File name:** 12.\_Constant\_murley.pdf (777.13K)

**Word count:** 2588

**Character count:** 15595

## CONSTANT MURLEY SCORE ON PATIENTS POST SUPRASPINATUS RECONSTRUCTION WITH MEMBRANE AMNION COMPOSITE AND FAT TISSUE ALLOGENIC MESENCHYMAL STEM CELL AUGMENTATION

Heri Suroto<sup>1</sup>, Bayu Antara Hadi<sup>2\*</sup>, Goklas Ridwan Ricardo Gultom<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Staff of Orthopaedic and Traumatology Department, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Dr Soetomo General Hospital, Surabaya

<sup>2</sup>Resident of Orthopaedic and Traumatology Department, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Dr Soetomo General Hospital, Surabaya

\*Corresponding Author: Bayu Antara Hadi, Resident of Orthopaedic and Traumatology Department, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8, Surabaya

E-mail: bayuantarahadi@gmail.com

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Robekan *rotator cuff* merupakan hal tersering terjadi pada kasus non trauma ekstremitas atas kelompok usia lebih dari 50 tahun. Angka kejadian saat ini belum dapat menggambarkan. Pendekatan terbaru untuk penyembuhan *rotator cuff syndrome* melalui regenerasi tendon seperti injeksi lokal *mesenkimal stem cell* dan faktor pertumbuhan atau rekayasa jaringan telah dikembangkan.

**Metode Penelitian:** Studi komparasi retrospektif dari 15 pasien postreparasi supraspinatus selama lebih 4 bulan di RSUD Dr Soetomo. Pasien dibagi menjadi kelompok reparasi supraspinatus dan kelompok reparasi dengan diaugmentasi komposit *amnion membrane* dan sel punca mesenkimal alogenik. Hasilnya dievaluasi menggunakan *constant murley score*.

**Hasil:** Rerata nilai nyeri pasien reparasi supraspinatus yang diaugmentasi membran amnion dan sel punca mesenkimal dan yang tanpa augmentasi adalah 15 dan 13,7 ( $p=0,036$ ). Rerata nilai aktivitas harian yang diaugmentasi dan yang tanpa augmentasi adalah 20 dan 17 ( $p=0,037$ ). Rerata nilai gerakan fleksi yang diaugmentasi dan yang tanpa augmentasi adalah 10 dan 8,6 ( $p=0,114$ ). Rerata nilai lateral elevasi yang diaugmentasi dan yang tanpa augmentasi adalah 10 dan 8,6 ( $p=0,114$ ). Rerata nilai eksternal rotasi yang diaugmentasi dan yang tanpa augmentasi adalah 9,6 dan 7,2 ( $p=0,004$ ). Rerata nilai internal rotasi yang diaugmentasi dan tanpa augmentasi adalah 9,2 dan 7,2 ( $p=0,012$ ).

**Kesimpulan:** *Pain score*, *ADL score*, *external rotation score*, dan *internal rotation score* pada *constant murley score* dalam pada kelompok dengan penambahan *amniotic membrane* dan *mesenchymal stem cell* secara signifikan lebih baik daripada kelompok dengan supraspinatus *repair* saja, namun tidak signifikan pada *flexion score* dan *lateral elevation score*.

**Kata Kunci:** reparasi supraspinatus, sel punca mesenkimal, membran amnion

### ABSTRACT

**Background:** Rotator cuff tears are the most common cases in nontrauma upper extremities in group patient more than 50 years old. Incidence on rotator cuff can't show the real population. New Approaches healing *rotator cuff syndrome* is tendon regeneration like mesenchymal stem cell injection and growth factor or tissue engineering that has been developed.

**Methods:** Retrospective comparison study of 15 postsupraspinatus reparation patients who has been treated for more than 4 months at the Dr. Soetomo general hospital. Patients is divided into group undergone supraspinatus reparation and patient supraspinatus reparation with augmented by membrane amnion composite and mesenchymal stem cell. Its' functional results were evaluated using constant murley score.

**Results:** Pain score average on supraspinatus reparation patients which augmented by membrane amnion and mesenchymal stem cell and those without augmentation is 15 and 13.7 ( $p=0.036$ ). Daily activity score average on patients with and without augmentation are 20 and 17 ( $p=0.037$ ). Flexion score average on patients with and without augmentation are 10 and 8.6 ( $p=0.114$ ). External rotation score average on patients with and without augmentation are 9.6 and 7.2 ( $p=0.004$ ). Internal rotation score average on patients with and without augmentation are 9.2 and 7.2 ( $p=0.012$ ).

**Conclusion:** The constant murley score pain score, ADL score, external rotation score, and internal rotation score in the group with the addition of amniotic membrane and mesenchymal stem cells were significantly better than the group with supraspinatus repair only, but not significantly on the flexion score and lateral elevation score components.

**Keywords:** supraspinatus reparation, mesenchymal stem cell, membrane amnion

## PENDAHULUAN

Cedera *rotator cuff* adalah kelainan patologis yang ditandai dengan robekan sebagian dan/atau total pada kelompok otot dan tendon di sendi bahu, tepatnya sendi glenohumeral. Prevalensi Cedera *rotator cuff* meningkat dengan bertambahnya usia. Sebanyak 4% pasien merupakan kelompok berusia <40 tahun dan bersifat asimtomatik dan 54% pasien berusia  $\geq 60$  tahun. Cedera otot *rotator cuff* dapat terjadi karena cedera traumatis. Cedera ini bersifat kronik dan progresif. Gejala klinisnya berupa nyeri dan berkurangnya gerakan sendi bahu serta gejala awal osteoarthritis. Prosedur pembedahan memungkinkan adanya lesi ulangan sekitar 50%. Hal tersebut disebabkan kerusakan tendon supraspinatus (SP) di tempat insersinya yang sulit untuk dikembalikan.<sup>1-4</sup>

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang dapat meningkatkan proses penyembuhan. Percepatan penyembuhan dapat dicapai dengan pemberian injeksi lokal *mesenchymal stem*

*cells* (MSCs). Kemudian dilakukan evaluasi menggunakan skor *Constant Murley*, sebagai skor penilaian fungsional untuk mengetahui efektivitas penambahan *mesenchymal stem cell*. Kami berpendapat bahwa pemberian *stem cell* ini dapat memberikan hasil fungsional yang lebih baik.<sup>5-7</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kohort retrospektif. Sampel penelitian adalah pasien *ruptur supraspinatus* yang telah dilakukan operasi di RSUD Dr. Soetomo. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dengan dan tanpa pemberian *amnion membrane* (AM) dan *Allogenic MSC of fat tissue*. Penilaian skor *Constant Murley* dilakukan setelah 4 bulan terapi di RSUD Dr. Soetomo pada pasien kontrol poli maupun kunjungan rumah pasien (*home visite*). Penilaian skor *Constant Murley* meliputi nyeri, aktivitas harian, dan gerakan bahu: fleksi, lateral elevasi, eksternal rotasi, internal rotasi.<sup>8-10</sup>

Pada penelitian ini didapatkan distribusi data tidak normal pada masing-masing variabel ( $p < 0,005$ ) sehingga uji non parametrik yang digunakan adalah *Mann-Whitney*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 15 sampel, 5 sampel diberikan *amnion membrane* dan *mesenchymal stem cell of fat* dan 10 sampel yang hanya dilakukan operasi *supraspinatus reparation* saja. Pasien berjenis kelamin laki-laki 4 orang (26,7%) dan berjenis kelamin perempuan 11 orang (73,3%) dengan rerata umur  $51,13 \pm 7,17$  tahun seperti yang tertera pada Tabel 1.

Hasil analisis pada rata-rata nilai *flexion score*, *ADL score*, *internal rotation score*, dan *external rotation score* pada pasien yang menjalani *supraspinatus reparation* dengan penambahan *amniotic membrane* dan *mesenchymal stem cell* mempunyai nilai rata-rata yang lebih baik secara signifikan dibandingkan pasien yang tanpa diberikan penambahan *stem cell*. ( $p_{\text{pain}} = 0,037$ ;  $p_{\text{adl}} = 0,034$ ;  $p_{\text{internal rotation}} = 0,002$ ;  $p_{\text{external rotation}} = 0,011$ )

Pada penelitian ini didapatkan distribusi data tidak normal pada masing-masing variabel ( $p < 0,005$ ), sehingga peneliti menggunakan uji non parametrik, *Mann-Whitney*.

**Tabel 1.** Karakteristik pasien yang menjalani operasi

Karakteristik	Jumlah (%)
<b>Jenis Kelamin</b>	
Laki-laki	4 (26,7%)
Perempuan	75 (73,3%)
<b>Usia (tahun)</b>	
Usia maksimum (tahun)	61
Usia minimum (tahun)	36
<b>Follow up (bulan)</b>	$58,87 \pm 37,61$
Follow up maksimum (bulan)	140
Follow up minimum (bulan)	140

Pada kelompok *supraspinatus reparation* yang ditambahkan *amnion membrane* dan *mesenchymal stem cell* mempunyai hasil *Pain score* dengan rata-rata 15,00; *ADL score* dengan rata-rata 20,00 tampak pada Tabel 4; *Flexion score* dengan rata-rata 10,00 tampak pada Tabel 5; *Lateral elevation score* dengan rata-rata 10,00 tampak pada Tabel 6; *External rotation score* dengan rata-rata 9,60 tampak pada Tabel 7; *Internal rotation score* dengan rata-rata 9,20 tampak pada Tabel 8. Pada kelompok *Supraspinatus reparation* saja mempunyai hasil *Pain score* dengan rata-rata 13,80 tampak pada Tabel 3; *ADL score* dengan rata-rata 17,40 seperti tampak pada Tabel 4; *Flexion score* dengan rata-rata

9,00 tampak pada tabel tabel 5; *Lateral elevation score* dengan rata-rata 8,60 tampak pada Tabel 6; *External rotation score* dengan rata-rata 7,60 tampak pada tabel 7; *Internal rotation score* dengan rata-rata 7,60 tampak pada Tabel 8. Hasil *score* rata-rata dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Rata-rata Hasil pemeriksaan Evaluasi *Constant Murley Score* pada dua kelompok

<i>Constant Murley Score</i>	SR + AM + MSC	SR
<i>Pain Score</i>	15,00	13,80
<i>ADL Score</i>	20,00	17,40
<i>Flexion Score</i>	10,00	9,00
<i>Lateral Elevation Score</i>	10,00	8,60
<i>External Rotation Score</i>	9,60	7,60
<i>Internal Rotation Score</i>	9,20	7,60

Setiap hasil evaluasi menggunakan uji *Mann-Whitney*. Pada *Pain score*, terdapat perbedaan nilai *Pain score* yang signifikan secara statistik antara kelompok *supraspinatus reparation* yang diberikan *amnion membrane* dan *mesenchymal stem cell* dibandingkan kelompok yang dilakukan *Supraspinatus reparation* saja ( $p=0,037$ ).

**Tabel 3.** Uji Hipotesis *Pain score*

	Median	Nilai p
Kelompok SR+AM+MSC (n=5)	15,00 (15,00–15,00)	0,037
Kelompok SR (n=10)	14,00 (11,00–15,00)	

\*Uji *Mann-Whitney*; Ranking rerata SR+AM+MSC 11,00; Ranking rerata SR 6,50

Pada *ADL score*, terdapat perbedaan nilai *ADL score* yang signifikan secara statistik antara kelompok *Supraspinatus reparation* yang diberikan membran amnion dan *mesenchymal stem cell* dibandingkan kelompok yang dilakukan *Supraspinatus reparation* saja ( $p=0,034$ ) seperti yang terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Uji Hipotesis *ADL score*

	Median (Minimum-Maksimum)	Nilai P
Kelompok SR+AM+MSC (n=5)	20,00 (20,00–20,00)	0,034
Kelompok SR (n=10)	17,00 (9,00–20,00)	

\*Uji *Mann-Whitney*; Ranking rerata SR+AM+MSC 11,00; Ranking rerata SR 6,50

*Flexion score* tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok *Supraspinatus reparation* yang diberikan *Amnion Membrane* dan *Mesenchymal Stem Cell* dibandingkan

kelompok yang dilakukan *Supraspinatus reparation* saja ( $p=0,301$ ).

**Tabel 5.** Uji hipotesis *flexion score*

	Median	Nilai p
Kelompok SR+AM+MSC (n=5)	10,00 (10,00–10,00)	0,301
Kelompok SR (n=10)	9,00 (2,00-10,00)	

\*Uji *Mann-Whitney*; Ranking rerata SR+AM+MSC 9,00; Ranking rerata SR 7,50

Data *Lateral Elevation Score* menggunakan *Shapiro-Wilk* menunjukkan data tidak terdistribusi normal ( $p<0,05$ ). Kemudian pengujian dilanjutkan dengan menggunakan uji *Mann-Whitney*.

Pada *Lateral Elevation score*, tidak terdapat perbedaan nilai *Lateral Elevation score* yang signifikan secara statistik antara kelompok *Supraspinatus reparation* yang diberikan *Amnion Membrane* dan *Mesenchymal Stem Cell* dibandingkan kelompok yang dilakukan *Supraspinatus reparation* saja ( $p=0,114$ ).

**Tabel 6.** Uji hipotesis *Lateral Elevation score*

	Median	Nilai p
Kelompok SR+AM+MSC (n=5)	10,00 (10,00–10,00)	0,114
Kelompok SR (n=10)	10,00 (2,00-10,00)	

\*Uji *Mann-Whitney*; Ranking rerata SR+AM+MSC 10,00; Ranking rerata SR 7,00

Data *External Rotation Score* yang tersaji kemudian diuji distribusinya menggunakan *Shapiro-Wilk*. Hasilnya menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal ( $p<0,05$ ). Kemudian dievaluasi setiap hasilnya menggunakan *Mann-Whitney*.

Pada *External Rotation score*, terdapat perbedaan nilai *External Rotation score* yang signifikan secara statistik antara kelompok *Supraspinatus reparation* yang diberikan *Amnion Membrane* dan *Mesenchymal Stem Cell* dibandingkan kelompok yang dilakukan *Supraspinatus reparation* saja ( $p=0,002$ ).

**Tabel 7.** Uji hipotesis *External Rotation score*

	Median	Nilai p
Kelompok SR+AM+MSC (n=5)	10,00 (8,00–10,00)	0,002
Kelompok SR (n=10)	8,00 (4,00-8,00)	

\*Uji *Mann-Whitney*; Ranking rerata SR+AM+MSC 12,10; Ranking rerata SR 5,95

Data *Internal Rotation Score* yang tersaji diuji distribusi normal menggunakan *Shapiro-Wilk* menunjukkan data tidak terdistribusi normal. ( $p=<0,05$ ) Uji hipotesis dilakukan pada setiap hasil evaluasi menggunakan uji *Mann-Whitney*.

Pada *Internal Rotation score*, terdapat perbedaan nilai *Internal Rotation score* yang signifikan secara statistik antara kelompok *Supraspinatus reparation* yang diberikan *Amnion Membrane* dan *Mesenchymal Stem Cell* dibandingkan kelompok yang dilakukan *Supraspinatus reparation* saja. (p=0,011)

**Tabel 8.** Uji hipotesis *Internal Rotation score*

	Median (Minimum- Maksimum)	Nilai p
Kelompok SR+AM+MSC C (n=5)	10,00 (8,00– 10,00)	0,011
Kelompok SR (n=10)	8,00 (4,00- 8,00)	

\*Uji *Mann-Whitney*; Ranking rerata SR+AM+MSC 11,20; Ranking rerata SR 6,40

*Mesenchymal stem cells* (MSC) dapat berdiferensiasi menjadi jaringan mesodermal yang berbeda dan memiliki parakrin yang kuat, anti-inflamasi, imunoregulatori dan potensi angiogenik. Terapi sel induk merupakan terapi yang berpotensi efektif untuk meningkatkan penyembuhan *rotator cuff*. Hasil penggunaan MSC autologus dari hewan terbukti memiliki sifat penyembuhan yang lebih baik, meningkatkan jumlah pembentukan fibrokartilago dan meningkatkan orientasi serat fibrokartilago

dengan respon imunologi yang lebih sedikit dan mengurangi infiltrasi limfosit.<sup>5,11-13</sup>

Menurut Yamamoto *et al*, masalah utama kegagalan dalam perbaikan *rotator cuff* disebabkan oleh factor biologis, karena zona transisi *fibro-cartilaginous* yang rumit dan sangat khusus antara *rotator cuff* dan tulang tidak beregenerasi setelah perbaikan. Tendon standar untuk teknik perbaikan tulang hanya mencapai jaringan parut fibrovaskuler yang memiliki sifat mekanik yang relatif buruk.<sup>14,15</sup> Fokus penelitian terbaru sekarang telah berubah kepada perbaikan lingkungan biologis di sekitar sel tersebut. *Stem cell* telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan proses penyembuhan biologis berdasarkan pengaruhnya dalam angiogenesis dan pola inflamasi.<sup>13,16</sup>

Sesuai dengan laporan Ellera Gomes *et al* yang menerbitkan karya mereka pada 14 pasien dengan robekan *rotator cuff* lengkap yang diperbaiki dengan cara *transosseous* melalui sayatan mini yang menambah jahitan dengan sel-sel induk mononuklear dari aspirasi sumsum tulang iliaka.<sup>17-18</sup>

Isaac juga menambahkan terapi *stem cell* lanjutan dan terapi gen merupakan pilihan yang paling layak untuk meningkatkan penyembuhan *rotator cuff*. Pengetahuan yang lebih baik tentang fase molekuler embriogenesis entesis serta

cedera dan pola penyembuhan telah memungkinkan untuk mengidentifikasi faktor pertumbuhan dan protein yang ditargetkan.<sup>12,19</sup>

Hal ini juga didukung pada penelitian Oh *et al* yang melaporkan pada model *rotator cuff* menggunakan AMSC menghasilkan peningkatan kapasitas regenerasi dan percepatan dari penyembuhan setelah infiltrasi dari jaringan *stem cell* lemak pada otot.<sup>20</sup>

Hasil rata-rata menunjukkan adanya hasil yang lebih baik pada kelompok dengan penambahan *amniotic membrane* dan *mesenchymal stem cell* dibanding pada kelompok *supraspinatus reparation* saja. Terdapat 2 evaluasi tidak signifikan pada *flexion score* dan *lateral elevation* ( $p_{\text{flexion}} = 0,301$ ;  $p_{\text{lateral elevation}} = 0,114$ ) yang dapat disebabkan karena kurangnya jumlah sampel dan tidak adanya kontrol pada penelitian ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Pain score*, *ADL score*, *external rotation score*, dan *internal rotation score* pada kelompok dengan penambahan *amniotic membrane* dan *mesenchymal stem cell* secara signifikan lebih baik daripada kelompok dengan penambahan tersebut.
2. *Flexion score* dan *lateral elevation score* pada kelompok dengan penambahan

*amniotic membrane* dan *mesenchymal stem cell* tidak secara signifikan lebih baik daripada kelompok dengan penambahan tersebut.

3. Pendekatan rekayasa jaringan pada reparasi *supraspinatus* akan meningkatkan pemulihan fungsional. Augmentasi menggunakan membran amnion komposit dan sel induk *mesogenymal allogenic* pada reparasi *supraspinatus* telah menghasilkan hasil fungsional yang lebih baik.
4. Pada penelitian ini didapatkan distribusi data tidak normal pada masing-masing variabel ( $p < 0,005$ ). Peneliti telah mencoba memperbesar jumlah sample dan mengurangi nilai ekstrim namun terkendala keterbatasan data sehingga uji non parametrik yang digunakan adalah *Mann-Whitney*. Kelemahan data non parametrik adalah penelitian ini tidak mewakili data di populasi atau tidak mewakili keadaan di populasi.

Saran dari penelitian ini sebaiknya menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih banyak dan kohort prospektif atau eksperimental dengan randomisasi.

## REFERENSI

1. Bianchi S, Martinoli C. *Ultrasound of The Musculoskeletal System: Shoulder*. 2007; Springer-Verlag 190e331.
2. M Precerutti, E Garioni, L Madonia, F Draghi. *US Anatomy of the Shoulder*:

# CONSTANT MURLEY SCORE ON PATIENTS POST SUPRASPINATUS RECONSTRUCTION WITH MEMBRANE AMNION COMPOSITE AND FAT TISSUE ALLOGENIC MESENCHYMAL STEM CELL AUGMENTATION

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.unair.ac.id">journal.unair.ac.id</a> Internet Source	8%
2	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://belangmono.blogspot.com">belangmono.blogspot.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1%
6	Concepcion del-Olmo, Pilar de-Diego, Paloma Morillas, Miguel Garcia-Navlet. "Ultrasound-guided pain interventions in shoulder region", Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management, 2013 Publication	<1%

7	Grovle, L., A. J. Haugen, B. Natvig, J. I. Brox, and M. Grotle. "AB0666 The prognosis of self-reported paresthesia and weakness in disc-related sciatica", <i>Annals of the Rheumatic Diseases</i> , 2013. Publication	<1%
8	<a href="http://garuda.ristekdikti.go.id">garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://jurnal.unsyiah.ac.id">jurnal.unsyiah.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1%
14	Pariyana Pariyana, Iche Andriyani Liberty, Bahrin Indawan Kasim, Achmad Ridwan. "Perbedaan perkembangan kualitas hidup penderita Tb paru menggunakan instrumen indonesianwhoqol-breffquestionareterhadap fase pengobatan tuberculosis", <i>Jurnal Kedokteran dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah</i>	<1%

# Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, 2018

Publication

---

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# CONSTANT MURLEY SCORE ON PATIENTS POST SUPRASPINATUS RECONSTRUCTION WITH MEMBRANE AMNION COMPOSITE AND FAT TISSUE ALLOGENIC MESENCHYMAL STEM CELL AUGMENTATION

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---