

ABSTRAK

**DETERMINAN PENGGUNAAN PELAYANAN KESEHATAN
MATERNITAS PADA IBU USIA 15-24 TAHUN DI INDONESIA**

Oleh : Mabda Novalia Istafa

Latar Belakang: Kesehatan ibu masih menjadi perhatian di negara berkembang terutama di Indonesia. Menurut SDKI 2017 usia ideal hamil adalah lebih dari 25 tahun, namun ibu usia 15-24 tahun yang hamil dan melahirkan di negara berkembang masih belum menggunakan pelayanan kesehatan maternitas secara maksimal. **Tujuan:** Menganalisis determinan penggunaan pelayanan kesehatan maternitas pada ibu usia 15-24 tahun di Indonesia. **Metode:** penelitian ini menggunakan pendekatan Cross-Sectional. Sebanyak 2,541 ibu usia 15-24 tahun yang melahirkan dalam waktu lima tahun terakhir terpilih menjadi responden. Variabel independen terdiri dari sosio-demografi ibu dan suami (usia, pekerjaan, pendidikan), faktor rumah tangga (jumlah anak & indeks kekayaan), akses ke pelayanan kesehatan dan faktor wilayah. Instrumen yang digunakan adalah data dari SDKI 2017, Sedangkan analisis menggunakan uji Chi-Square dan Binary Logistic Regression menggunakan aplikasi STATA versi 14.2 dalam uji analisis untuk menentukan determinan penggunaan pelayanan kesehatan maternitas. **Hasil:** prevalensi penggunaan pelayanan ANC adalah 91.17%, INC adalah 80.06% dan PNC adalah 69.19%, dari ketiga penggunaan pelayanan kesehatan tersebut variabel yang paling berpengaruh adalah indeks kekayaan. **Kesimpulan:** penggunaan pelayanan kesehatan maternitas pada ibu usia 15-24 tahun di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor usia ibu, selisih usia suami dan ibu, pekerjaan suami, jumlah anak, indeks kekayaan, akses ke pelayanan kesehatan dan faktor wilayah. Penelitian ini merekomendasikan upaya promotif terhadap pentingnya penggunaan pelayanan kesehatan maternitas, selain itu kebijakan dalam upaya pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perlu lebih diperhatikan.

Kata kunci : determinan, penggunaan pelayanan maternitas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

ABSTRACT

**DETERMINANTS OF UTILIZATION OF MATERNAL HEALTHCARE
AMONG ADOLESCENT GIRL AND YOUNG WOMEN IN INDONESIA**

By : Mabda Novalia Istafa

Background: Maternal health is still a concern in developing countries especially in Indonesia. According to Indonesian Demographic & Health Surveys (IDHS) 2017 the ideal age of pregnancy is more than 25 years, but mothers aged 15-24 years that pregnant and giving birth in the developing world still have not used the health care services to the maximum, The aim of this study was analyzing the determinant of the use of maternal health services in mothers aged 15-24 years in Indonesia. **Method:** The study used a Cross-Sectional approach. A total of 2.541 mothers aged 15-24 years old who gave birth in five years had been elected as respondents. Independent variables consist of socio-demographics of mothers and husbands (age, occupation, education), household factors (number of children & Wealth index), access to health services and regional factors. The instruments used are data from questionnaire, while analysis had been done using the chi-square test and binary logistic regression used STATA application version 14. **Results:** The prevalence of the use of ANC service was 91.17%, INC service was 80.06%, and PNC was 69.19%, the most influential variable was wealth index. **Conclusion:** The use of health care services in mothers aged 15-24 years in Indonesia is influenced by several factors of maternal age, the difference in the age of husbands and mothers, the work of husbands, the number of children, the index of wealth, access to health services and regional factors. This research recommends the promotive effort to the importance of the use of maternal health services, in addition, policies in effort to finance health services need to be considered more.

Keywords : Determinants, maternal utilization, Indonesian Demographic and Health Surveys